

Клетка - ограниченная активной мембраной, упорядочения структурированная система биополимеров, участвует в метаболических процентах.




Компартменты- обособленная область клетки, отделённая мембранный. Необходимы для выполнения различных функций

Гиалоплазма- полкозернистая двух- разовая часть цитоплазме

Плазматическая мембрана



Фосфоглицеролипиды




Стеариновая к-та

Олеиновая к-та


Движение



вокруг своей оси



латеральная диверсия



Фаза - фаза движения


Сфинголениды- сложные липиды, в основе которых лежит аминоспирит сфингазин.

Стероиды структурно комплементарны фосфолипидам. "Затычки" между фосфолилидами.


Транспорт веществ

Интегральные белки пронизывают мембрану. Периферические нет.


Гликокаликс - углеводная периферическая зона клеток.
Мембранные рафты-особые динамичный микродомены кл.мембраны.



Акваториины- поры, обр. белками, переносящих молекулы воды.



Na+ / K+ канал




← Вторично-активный транспорт

Цитоскелет

•Определяет форму клетки

• Внутриклеточный транспорт

Микрофиламенты состоят из g- актина



Микротрубочки состоят из А-тубулина и В-тубулина

Микротрубочки перемещают везикулы и обеспечивают деление клетки.