

Notes for My Paper

0.1 矩阵的三则运算性质

$$A + B = B + A$$

$$(A + B) + C = A + (B + C)$$

$$(AB)C = A(BC)$$

$$(k + l)A = kA + lA$$

$$k(A + B) = kA + kB$$

$$A(B + C) = AB + AC$$

0.2 矩阵转置的性质

$$(A^T)^T = A$$

$$(kA)^T = kA^T$$

$$(AB)^T = B^T A^T$$

$$(A^{-1})^T = ((A)^T)^{-1}$$

$$(A^T)^m = (A^m)^T$$

0.3 伴随矩阵的性质

$$(A^T)^* = (A^*)^T$$

$$(kA)^* = k^{n-1} A^*$$

$$(AB)^* = B^*A^*$$

0.4 逆矩阵的性质

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

$$(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A$$

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

$$(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$$

$$A_{m \times n}, B_{n \times n} :$$

$$\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}$$

0.5 矩阵秩的性质

$$r(A) = r(A^T) = r(A^T A) = r(AA^T)$$

设 A, B 都是同型矩阵, 则 $r(A \pm B) \leq r(A) + r(B)$

设 A, B 分别为 $m \times n, n \times s$ 矩阵, 且 $AB = O$, 则 $r(A) + r(B) \leq n$

0.6 证明向量组 $\alpha_1 \dots \alpha_n$ 线性相关的充分必要条件是向量组中至少有一个向量被其余向量线性表示

1. " \Rightarrow ": 存在不全为 0 的 k_1, k_2, \dots, k_n 使得 $k_1\alpha_1 + \dots + k_n\alpha_n = 0$

设 $k_1 \neq 0$, $\alpha_1 = -\frac{k_2}{k_1}\alpha_2 - \dots - \frac{k_n}{k_1}\alpha_n$

$$2. \text{ "}\Leftarrow\text{" } l_1\alpha_1 + \dots + l_{k-1}\alpha_{k-1} + l_{k+1}\alpha_{k+1} + \dots + l_n\alpha_n$$

$$\Rightarrow l_1\alpha_1 + \dots + l_{k-1}\alpha_{k-1} + (-1)\alpha_k + l_{k+1}\alpha_{k+1} + \dots + l_n\alpha_n = 0$$

所以 $\alpha_1 \dots \alpha_n$ 线性相关

0.7 证明 $\alpha\beta$ 线性相关 $\Leftrightarrow \alpha\beta$ 成比例

证明: " \Rightarrow " \exists 不全为 0 的 $k_1 k_2$, 使得

$$k_1\alpha + k_2\beta = 0$$

设 $k_2 \neq 0 \Rightarrow \beta = -\frac{k_1}{k_2}\alpha \Rightarrow \alpha\beta$ 对应成比例

" \Leftarrow " 设 $\beta = l\alpha \Rightarrow l\alpha + (-1)\beta = 0$

$\Rightarrow \alpha\beta$ 线性相关

0.8 向量组相关性与线性表示的性质

2. 设 $\alpha_1 \dots \alpha_n$ 线性无关

(1) 若 $\alpha_1 \dots \alpha_n, \beta$ 线性相关, 则向量 β 可以由 $\alpha_1 \dots \alpha_n$ 唯一线性表示

" \Rightarrow " \exists 不全为 0 的 $k_1 \dots k_n, k_0$ 使

$$k_1\alpha_1 + \dots + k_n\alpha_n + k_0\beta = 0$$

若 $k_0 = 0 \Rightarrow k_1\alpha_1 + \dots + k_n\alpha_n = 0$

$$k_0 \neq 0 \Rightarrow \beta = -\frac{k_0}{k_1}\alpha_1 - \dots - \frac{k_n}{k_0}\alpha_n$$

证明唯一性: 令 $\beta = l_1\alpha_1 + \dots + l_n\alpha_n$

$$\beta = t_1\alpha_1 + \dots + t_n\alpha_n$$

$$\Rightarrow (l_1 - t_1)\alpha_1 + \dots + (l_n - t_n)\alpha_n = 0$$

因为 $\alpha_1 \dots \alpha_n$ 线性无关, 所以 $l_1 = t_1, \dots, l_n = t_n$, 证毕

(2) $\alpha_1 \dots \alpha_n, b$ 线性无关 \Leftrightarrow 向量 b 不可以由 $\alpha_1 \dots \alpha_n$ 线性表示

用反证法证明。

3. 全组线性无关 \Rightarrow 部分组线性无关

4. 部分组相关 \Rightarrow 全组线性相关

5. $\alpha_1 \dots \alpha_n$ 为 n 个 n 维向量

$\alpha_1 \dots \alpha_n$ 线性无关的充分必要条件是 $|\alpha_1, \dots, \alpha_n| \neq 0$

用下面的结论

$A = (\alpha_1 \dots \alpha_n)$, $\alpha_1 \dots \alpha_n$ 线性无关 $\Leftrightarrow \alpha_1 \dots \alpha_n$ 的秩 $= n \Leftrightarrow r(A) = n \Leftrightarrow |A| \neq 0$

$\alpha_1 \dots \alpha_n$ 线性相关 $\Leftrightarrow |\alpha_1 \dots \alpha_n| = 0$

证: 令 $A = (\alpha_1 \dots \alpha_n)$.

$\alpha_1 \dots \alpha_n$ 线性相关 $\Leftrightarrow \alpha_1 \dots \alpha_n$ 的秩 $< n \Leftrightarrow r(A) = n \Leftrightarrow |A| = 0$

6. 设 $\alpha_1 \dots \alpha_n$ 为 n 个 m 维向量, 若 $m < n$, 则向量组 $\alpha_1 \dots \alpha_n$ 一定线性相关
说明: 口诀向量组左右长上下短一点线性相关

向量的维数代表了方程的个数

向量的个数代表了未知数的个数

方程数少了，有自由变量，一定有非零解，则一定线性相关

证明: 令 $A_{m \times n} = (\alpha_1 \dots \alpha_n) \Rightarrow r(A) \leq m < n$

因为 $\alpha_1 \dots \alpha_n$ 线性相关 $\Leftrightarrow \alpha_1 \dots \alpha_n$ 的秩 $< n \Leftrightarrow r(A) < n$

而 $r(A) \leq m < n$. 所以 $\alpha_1 \dots \alpha_n$ 线性相关

0.9 汤家凤行列式强化提高

$$1. D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 7 & 7 & 7 & 3 & 3 \\ 3 & 2 & 4 & 5 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 2 & 2 \\ 4 & 6 & 5 & 2 & 3 \end{vmatrix}, \text{ 则 } A_{31} + A_{32} + A_{33} =$$

$$A_{31} + A_{32} + A_{33} = 1 \cdot A_{31} + 1 \cdot A_{32} + 1 \cdot A_{33} + 0 \cdot A_{34} + 0 \cdot A_{35} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 7 & 7 & 7 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & 2 & 2 \\ 4 & 6 & 5 & 2 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \\ 4 & 6 & 5 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

2. 已知

$$|\mathbf{E} - \mathbf{A}| = |\mathbf{E} - 2\mathbf{A}| = |\mathbf{E} - 3\mathbf{A}| = 0 \quad (1)$$

求 $|\mathbf{B}^{-1} + 2\mathbf{E}|$

解: 因为 $|\mathbf{E} - \mathbf{A}| = |\mathbf{E} - 2\mathbf{A}| = |\mathbf{E} - 3\mathbf{A}| = 0$ 所以 \mathbf{A} 的特征值为 $\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1$