


第二章 气团与锋

章节概述 本章主要教授锋或锋面附近的气象要素场的特征、锋生公式的物理意义及定性分析应用、气压倾向方程、地面锋线与高空锋区、高空等压面的上高度场三度空间的配置、用密度一级不连续面模拟锋时，锋的坡度公式推导及讨论和锋生锋消的动力学特点。



全球气团分布情况

2.1 气团

2.1.1 基本概念与性质

2.1.1.1 基本内容

概念 **Air mass** 从地表广大区域来看，存在着水平方向上**物理性质(温度、湿度、稳定度等)比较均匀**(各种要素梯度很小)的大块空气，这种性质比较均匀的大块空气叫做气团。

性质

- ① 水平范围常可达**几百到几千公里**
- ② 垂直范围可达**几公里到十几公里**(限制在对流层)
- ③ 水平温度差异小，**一百公里范围内的温度差为1℃**，最多不超过2℃
- ④ 垂直方向上温度随高度递减，与对流层一致。

2.1.1.2 气团形成与变性

形成条件 **性质均匀**(海洋\陆地)的**广阔**的地球表面**下沉辐散，稳定的环流**。(地表上方的空气要获得地表面的物理属性，需要时间较长，可以保证气团在该区域稳定存在) 与基本属性对应

方式 各种尺度的**湍流**、系统性**垂直运动**、蒸发、凝结和辐射等**物理过程**

气团变性 气团的**物理属性逐渐发生变化** 例如冷高压南下受到下垫面影响变暖

不同气团变性的快慢是不同的，变性快慢和它所经下垫面性质与气团性质差异的大小有关。

- ① **冷气团移到暖的地区变性较快**。因为冷气团低层变暖，**趋于不稳定，乱流对流**容易发展，能很快地将低层的热量传到上层大气。
- ② **暖气团移到冷的地区则变冷较慢**。因为低层变冷**趋于稳定**，乱流和对流不易发展，其冷却过程主要靠**辐射作用**进行。
- ③ **大陆移入海洋的气团容易取得蒸发水汽而变湿**(常见于山东半岛，有暴雪)，而从海洋移到大陆的气团，则要通过**凝结及降水过程**才能变干，所以气团的变干过程比较缓慢。

2.1.2 气团分类

2.1.2.1 地理分类

北极气团Ac/Am Arctic 即冰洋气团，分布于极圈内 70°-90°。有大陆性或海洋性两类，性质为**气温低、水汽少、气层非常稳定**，冬季入侵大陆时会带来暴风雪天气 南极为大陆气团，北极为冰洋气团

极地气团 Polar 分布于**中高纬度西风带 40°N- 70°N**

大陆性Pc continental 低温干燥，天气晴朗，气团低层有**逆温层**，气层稳定，冬季多霜、雾

海洋性Pm maritime 夏季同 Pc 相近、**冬季比 Pc 气温高，湿度大**，可能出现云和降水

热带气团 Tropical 分布于**副热带地区，20°N- 40°N**

大陆性Tc continental 高温干燥、晴朗少云，低层**不稳定**

海洋性Tm maritime 低层温暖、潮湿，且**不稳定**，中层常有逆温层

赤道气团E Equatorial 分布于赤道 20°N 以南，**湿热不稳定**，天气闷热，多雷暴

2.1.2.2 热力分类

冷气团 当气团**向着比它暖的下垫面**移动时称为冷气团

暖气团 当气团**向着比它冷的下垫面**移动时称为暖气团

从高纬陆地来一般都是冷气团，称干冷气团

从低纬海洋来的称为暖湿气团

2.1.3 我国境内的气团活动与天气

概述 我国境内的气团多为**变性气团**

冬半年 主要影响：**极地大陆气团**、**热带海洋气团**(太平洋、南海)、**北极气团**。

① **大陆西伯利亚气团** (干冷天气下的反气旋) 与**热带海洋气团**相遇时在气团交界处**形成阴雨天气**，如冬季**华南地区的阴雨**。**热带海洋气团**可影响到华南、华东和云南等地，形成**温热、湿润**的天气。

② **北极气团 Ac** 南下侵入我国可造成**气温剧烈下降的强寒潮天气**。

夏半年 主要影响：**西伯利亚气团**、**热带海洋气团**(太平洋、南海)、**热带大陆气团**(干燥中亚)、**赤道气团**

① **西伯利亚气团**与南方海洋气团在我国大陆相遇并**由南向北推进**，造成我国**雨带的推移**。如右图，梅雨、秋雨

西伯利亚气团在长城以北和西北活动，与热带海洋气团一起造成我国**盛夏南北方降水**


② 来自印度洋的**赤道气团(季风气团)**可造成**长江流域以南地区大量降水**，而**热带大陆气团**也可影响我国西部地区，出现严重的干旱和酷暑。

春季 主要影响：**西伯利亚气团**、**热带海洋气团** **春如四季**

此时西伯利亚气团和热带海洋气团两者势力相当，**互有进退**，是**锋系及气旋活动最盛的时期**。

秋季 主要影响：**变性西伯利亚气团**主导、**热带海洋气团**

变性的西伯利亚气团占主要地位，热带海洋气团退居东南海上，我国东部地区在单一气团控制下，出现全年最宜人的**秋高气爽**的天气。



2.2 锋的概念与锋面的坡度

概述 **锋面和气旋**是中纬度最典型的两类天气系统，中纬度许多天气现象与锋面和气旋有关。

2.2.1 锋的概念

锋区 密度不同的两个气团之间的过渡区，在天气图上表现为**温度水平梯度大而窄的区域**，**随高度向冷区倾斜**，是一个**等温线的密集带**。即冷暖气团相遇时的**狭窄倾斜过渡带**。

上界：锋区与暖气团的交界面 **下界**：锋区与冷气团之间的交界面

锋区宽度 上界和下界的水平距离称为锋的宽度。在近地面层中锋面**宽约数公里**，在**高层可达 200-400 公里**。可见其宽度与其水平长度数百~数千公里相比是很小的，所以人们常把锋区近似地看成一个面，即锋面。

锋面 **Weather front** **热力学场和风场具有显著变化的狭窄倾斜带**定义为锋面。其具有较大的**水平温度梯度**、**静力稳定度**、**绝对涡度**、**垂直风切变**等特征。

天气图上比例尺很小，锋面的宽度无法表示，从而把它看作空间的一个面。

锋线 锋面与地面的交线。习惯上把锋面和锋线统称为**锋**。

空间结构 锋区的**水平尺度**为**几十公里到几百公里**，一般上宽下窄，在天气图上只是一条线。



沿锋面的尺度一般为**1000~2000 公里** (锋面长度)

锋面实际上并不像示意图一样具有规则的几何形态。

沿锋面一维，属于中- α 尺度 (200~2000 公里)

沿跨锋面一维，属于中- β 尺度 (20~200 公里)

锋面在垂直方向上厚度属于中- γ 尺度 (1~2 公里，浅层系统)



锋面空间结构示意图

2.2.2 锋的分类

2.2.2.1 按伸展高度分类


对流层锋 地面-对流层顶的所有锋

地面锋

低层锋-700hPa 以下 主要指锋面垂直方向的伸展位置主要位于**大气低层**。地面锋一般认为是在水平面气压图上的一个强的**水平温度梯度带**。它经常与**降水相关联**，可造成局地的强烈天气，同时可以为更小尺度的天气系统的不稳定发展提供一个背景场。

高空锋

500hPa 以上，不接触地面 主要指位于对流层上层的锋面，它与**急流和急流轴**相伴随。它对从中纬度气旋到对流尺度的天气系统中的**强迫垂直运动**起着十分重要的动力作用。另外，对流层与平流层之间的**物质和能量等垂直输送**起着重要作用。



2.2.2.2 按地理类型分类

冰洋锋


冰洋气团和极地气团之间的界面，处于高纬地区，**势力较弱，位置变化不大**。

极锋

极地气团和热带气团之间的界面，**冷暖交换强烈，位置变化大，对中纬地区影响很大**

副热带锋

赤道气流和信风气流之间的界面，由于两种气流之间的温差小，以**气流辐合为主**，可称为**辐合线**。有位置的季节变化，夏季移至北半球，冬季移至南半球。多出现在海上，**是热带风暴的源地**



主要气团、对流层顶、锋面、急流和低层风系特征的关系

虚线表示气团和锋的位置随季节摆动



2.2.2.3 按锋移动的主次地位分类

冷锋


锋面在移动过程中，**冷气团起主导作用**，推动锋面向暖气团一侧运动。暖气团被迫抬升，**锋面坡度较大，天气在冷锋后**

暖锋


锋面在移动过程中，**暖气团起主导作用**，推动锋面向冷气团一侧运动。暖气团沿冷气团向上滑升，**锋面坡度较小，天气在暖锋前**



冷锋及其云系



暖锋及其云系



准静止锋

冷暖气团势力相当，锋面很少移动的锋 (**6 小时移动小于 1 个纬度**，24 小时移动在 2 个纬度之内)

锢囚锋


由**冷锋赶上暖锋**或是**两条冷锋相遇叠并**形成的锋，把**暖空气抬到高空**而形成的新锋面。

即**两个冷气团之间形成的锋面**。其形成原因有：锋面受山脉阻挡形成的**地形锢囚**、**两条冷锋迎面相遇形成的锢囚**、**冷锋追上暖锋形成的锢囚**。在我国东北、华北地区活动频繁，以春季最多。

冷式锢囚锋：冷锋后的冷空气团比暖锋前的冷空气团**冷**，**暖舌位于地面锢囚锋后方**。

暖式锢囚锋：冷锋后的冷空气团比暖锋前的冷空气团**暖**，**暖舌位于地面锢囚锋前方**。


中性锢囚锋：冷锋后的冷空气团与暖锋前的冷空气团的温差较小，**暖舌各高度上位置不变**。



冷式锢囚锋

暖式锢囚锋

中性锢囚锋



锢囚锋的形成