

바코드를 붙여주세요



국민건강영양조사 제7기

- 안검사 조사표 -

[만5-18세]

이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.

1. 설문

※ 만 5-13세: 보호자 응답
※ 만 14-18세: 본인 응답

- 가장 최근에 안과검사를 받은 때는 언제입니까?
☐①한달이내 ☐②한달이상 1년 이내 ☐③1년 이상 3년 이내 ☐④3년 이상 되었음 ☐⑤한번도 받은 적 없음
- 귀하의 직계가족(부모, 또는 조부모, 형제 자매, 자녀) 중 안과 질환을 앓은 사람이 있습니까? ※복수응답가능
☐①예 ⇨ ☐①녹내장 ☐②백내장 ☐③사시 ☐④안검하수
☐②아니오 ☐⑤망막 ☐⑥기타 안과질환
- 과거에 안과 수술을 받은 적이 있습니까? ※복수응답가능
☐①예 ⇨ ☐①녹내장 ☐②백내장 ☐③사시 ☐④안검하수
☐②아니오 ☐⑤망막 ☐⑥굴절수술(라식,라섹,엑시머등) ☐⑦기타 안과질환
- 지난 1년간 평균적인 하루의 근거리작업시간(컴퓨터 작업, 책읽기 등)은 얼마입니까?
☐①하루 1시간이하 ☐②1~2시간 ☐③3시간 ☐④4시간 이상

자동굴절검사 결과지 부착란

2. 시력

시력검사 불가능	☐ ① 양 안 ☐ ② 우 안 ☐ ③ 좌 안
시력검사 불가능 원인	☐ ① 검사거부 ☐ ② 숫자모름 ☐ ③ 무안구증 혹은 안구적출술후 상태
부모의 근시여부	☐ ①예 ⇨ ☐ ① 부 ☐ ② 모 ☐ ③ 모두(부, 모) ☐ ②아니오 ☐ ③ 모름

구 분	우 안	좌 안
1.시력	측정방법 ☐ ① 나안시력 ☐ ② 평소안경 혹은 렌즈에 의한 교정시력 ☐ ③ 굴절수술후의 교정시력 ☐ 1.0 ☐ 0.8 ☐ 0.63 ☐ 0.5 ☐ 0.4 ☐ 0.32 ☐ 0.25 ☐ 0.2 ☐ 0.16 ☐ 0.125 ☐ 0.1 ☐ 0.025 ☐ 안전수지 ☐ 안전수동 ☐ 광각유 ☐ 광각무	측정방법 ☐ ① 나안시력 ☐ ② 평소안경 혹은 렌즈에 의한 교정시력 ☐ ③ 굴절수술후의 교정시력 ☐ 1.0 ☐ 0.8 ☐ 0.63 ☐ 0.5 ☐ 0.4 ☐ 0.32 ☐ 0.25 ☐ 0.2 ☐ 0.16 ☐ 0.125 ☐ 0.1 ☐ 0.025 ☐ 안전수지 ☐ 안전수동 ☐ 광각유 ☐ 광각무
자동굴절검사 불가능	☐ ① 양 안 ☐ ② 우 안 ☐ ③ 좌 안	사유
2.자동굴절검사치	() Dsph -() Dcyl x () A°	() Dsph -() Dcyl x () A°
3.자동굴절검사값에 의한 교정시력 (1.의 시력이 0.8 미만인 경우)	☐ 1.0 ☐ 0.8 ☐ 0.63 ☐ 0.5 ☐ 0.4 ☐ 0.32 ☐ 0.25 ☐ 0.2 ☐ 0.16 ☐ 0.125 ☐ 0.1 ☐ 0.025 ☐ 안전수지 ☐ 안전수동 ☐ 광각유 ☐ 광각무	☐ 1.0 ☐ 0.8 ☐ 0.63 ☐ 0.5 ☐ 0.4 ☐ 0.32 ☐ 0.25 ☐ 0.2 ☐ 0.16 ☐ 0.125 ☐ 0.1 ☐ 0.025 ☐ 안전수지 ☐ 안전수동 ☐ 광각유 ☐ 광각무
4.(자동굴절검사값+핀홀)에 의한 교정시력 (3.의 교정시력이 0.8 미만인 경우 시행)	☐ 1.0 ☐ 0.8 ☐ 0.63 ☐ 0.5 ☐ 0.4 ☐ 0.32 ☐ 0.25 ☐ 0.2 ☐ 0.16 ☐ 0.125 ☐ 0.1 ☐ 0.025 ☐ 안전수지 ☐ 안전수동 ☐ 광각유 ☐ 광각무	☐ 1.0 ☐ 0.8 ☐ 0.63 ☐ 0.5 ☐ 0.4 ☐ 0.32 ☐ 0.25 ☐ 0.2 ☐ 0.16 ☐ 0.125 ☐ 0.1 ☐ 0.025 ☐ 안전수지 ☐ 안전수동 ☐ 광각유 ☐ 광각무