



國防科學技術大學  
National University of Defense Technology

# 高等数学（一）综合练习

## 练习三：函数极限与连续函数

理学院 朱健民教授



# 高等数学（一）综合练习——函数极限与连续函数

## 主要内容

1. 函数极限的概念与性质；
2. 函数极限的四则运算与复合运算；
3. 极限存在定理与两个重要极限；
4. 无穷小比较与函数极限计算；
5. 连续函数的概念；
6. 间断点及其类型；
7. 初等函数的连续性；
8. 有界闭区间上连续函数性质及应用.



# 高等数学（一）综合练习——函数极限与连续函数

## 例题讲解

1. 由极限定义证明： $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{2x-1} = 1.$

2. 由极限定义证明： $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{x^2} = \frac{1}{x_0^2} (x_0 \neq 0).$

3. 证明：若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ ，且 $f(x) > 0$ ，则 $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt{f(x)} = \sqrt{A}.$

4. 设 $f(x)$ 是定义在 $0 < |x| < \delta$ 上的正值函数，且 $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) + \frac{1}{f(x)}] = 2$ ，  
证明： $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1.$



# 高等数学（一）综合练习——函数极限与连续函数

5. 求下列极限值：

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^2}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{2x+3}{2x} \right)^x$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin 7\pi x}{\sin 2\pi x}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left( \cos \frac{1}{x} - \cos \frac{3}{x} \right)$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left( \frac{\pi}{\cos x} - 2x \tan x \right)$$

$$(6) \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right)^n$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{2}{\pi} \arctan x \right)^x$$

$$(8) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x - 2\sin x}{x^3}$$





# 高等数学（一）综合练习——函数极限与连续函数

6. 设  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$  , 证明 :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[xf(x)]}{x} = a$ .

7. 设  $a, b$  为正常数 , 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{a^x + b^x}{2} \right)^{1/x}$  .

8. 设  $f(x) = \sum_{k=1}^n a_k \sin kx$  , 且  $|f(x)| \leq |\sin x|$  , 证明 :  $|\sum_{k=1}^n k a_k| \leq 1$  .

9. 设函数  $f(x)$  在  $x = 0$  处连续 , 且对每一个  $x \in \mathbb{R}$  成立  $f(x) = f(2x)$  , 证明  $f(x)$  为常值函数.

10. 求函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - x}{\sin \pi x}, & x < 0, \\ \ln(1 + x) + \sin \frac{1}{x^2 - 1}, & x \geq 0 \end{cases}$  的间断点 , 并指出其类型.



# 高等数学（一）综合练习——函数极限与连续函数

11. 设  $f, g$  是  $\mathbb{R}$  上的连续函数，在所有有理点  $x$  上有  $f(x) = g(x)$ ，证明：  
 $f \equiv g$ .

12. 设  $a_1, a_2, a_3$  均为正常数， $b_1 < b_2 < b_3$ ，证明方程

$$\frac{a_1}{x - b_1} + \frac{a_2}{x - b_2} + \frac{a_3}{x - b_3} = 0$$

在区间  $(b_1, b_2)$  和  $(b_2, b_3)$  内各有一个根.

13. 证明奇次多项式方程至少存在一个实根.

14. 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续， $x_i \in [a, b], t_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n), \sum_{i=1}^n t_i = 1$ ，  
证明至少存在一点  $\xi \in [a, b]$  使  $f(\xi) = \sum_{i=1}^n t_i f(x_i)$ .