

# fish-vs-eco

---

## 1. fish to eco

- Bence2003论文:  $p_{\text{寄生}} * p_{\text{攻击后死亡}} = p_{\text{死亡}}$

## 2. eco to fish

- Lake Michigan: 幼年种群密度和juvenile（可以吸鱼的时期）的种群密度之间的关系（可以用来反推存活率）

## 3. database

- commercial: 五大湖捕捞量（可以作为种群相对密度的数据）
- erie: 仅lake erie的捕捞量（可以作为lake erie生态系统中种群相对密度的数据）
- LakeErieFish: 五大湖中之一的鱼抽样数据（可以做lake erie生态系统中鱼的体重和游泳距离的数据）
  - Length
  - weight
  - water quality
- 五大湖七鳃鳗入侵防治时间线

## 4. Task 1

- t1b.xlsx: 对density-%M的线性拟合，相关系数为0.5452,  $p = 0.0668 < 0.1$ , 说明在90%的置信水平上拒绝原假设，幼虫密度与雄性占比有显著的相关性

## 5. pictures

- life cycle of fish: 鳗鱼的生命周期图
- problem overview: 第一天腾讯会议的图

# 总模型

---

## 用线性回归拟合性别比和幼体密度函数

---

- 通过引用文献，说明性别比和成年体密度无明显联系
- 密度不要用等级，用真实密度（只有等级的值用该等级平均密度代替）
- 计算拟合优度
- 证明两个数据线性相关，计算皮尔逊相关系数
- 检验皮尔逊相关系数是否显著：夏皮洛-威尔克检验（可直接用spss计算，具体算出在 $p=?$ 下可拒绝原假设）
- 把皮尔逊相关系数和夏皮洛-威尔克检验的公式写上，显得高端
- 数据见[数据文档](#)

## 从幼体密度推算成体密度

---

### [参考文档](#)

- **假设**: 幼鱼期: 4年, 吸血(成年)期2年, 引用 [Minnesota DNR](#)
- **假设**: 幼鱼每年存活率为0.627, 引用文献《Survival and metamorphosis of larval sea lamprey (Petromyzon marinus) residing in Lakes Michigan and Huron near river mouths》
- **假设**: 环境处在稳态, 每年的出生数量一样

- 密度等于单位体积（面积）的数量，因此下面都计算单位面积数量

$N^{larval}$  : 当前时刻单位体积幼鱼数量

$D^{larval} = 4$ 年 : 幼虫时期的时长 (*duration*) , 单位: 年

$P_y$  :  $y$ 年前出生的幼鱼, 存活到现在并且没有变态的概率 (计算公式见下文)

$B$  : 每年出生的幼鱼数量 (未知数, 我们要解出 $B$ )

$$\begin{aligned} N^{larval} &= \sum_{y=0}^{D^{larval}} P_y B \\ &= \left[ \sum_{y=0}^{D^{larval}} P_y \right] B \end{aligned}$$

注: 从今年, 到4年前出生的所有未成年鱼, 在今年都可能还未成年, 在5年前出生的幼鱼, 我们认为它要么死了, 要么成年了

$P_y$  :  $y$ 年前出生的幼鱼, 存活到现在且没有变态的概率

$y$  : 时间段, 当 $y = 0$ 时, 不考虑死亡率、变态率,  $P_y = 1$

$S^{larval} = 0.627$  : 幼鱼每年存活率

$m_i$  : 幼鱼在第 $i$ 年变态为成年鱼的概率 (计算公式见下文)

$$P_y = \prod_{i=1}^y S^{larval} (1 - m_i)$$

- 假设:  $\beta_0 = -23.886$ 、 $\beta_1 = 0.186$

$m_i$  : 幼鱼在第 $i$ 年变态为成年鱼的概率

$\beta_0 = -23.886$

$\beta_1 = 0.186$

$\bar{l}$  : 鱼长度区间的中点 (我们用平均/中位数长度代替 (计算公式见下文))


$\Delta l_i$  :  $i$ 年前的鱼预期的长度变化量 (计算公式见下文)

$$m_i = \frac{\exp[\beta_0 + \beta_1(\bar{l} + \Delta l_i)]}{1.0 + \exp[\beta_0 + \beta_1(\bar{l} + \Delta l_i)]}$$

注:

- $\beta_0$ 、 $\beta_1$ 引用 《Survival and metamorphosis of larval sea lamprey (*Petromyzon marinus*) residing in Lakes Michigan and Huron near river mouths》  **$\beta_0$  and  $\beta_1$  are parameters characterizing the length at which metamorphosis occurs**

- m: 使用了逻辑斯蒂回归模型, 引用<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0380133013001846>



假设:  $L_{\infty} = 159mm$

假设:  $d = 0.515$ 年 (188天)

$\Delta l_i$ :  $i$ 年前的鱼预期的长度变化量

$L_{\infty} = 159$ : 渐进长度

$\bar{l} = L_{\infty}/2 = 79.5mm$ : 鱼长度区间的中点


$d = 0.515$ : 对特定溪流的成长季时长 (*growingseasonduration*)

$$\Delta l_i = (L_{\infty} - \bar{l})[1.0 - \exp(-i \times d)]$$

注:

- $L_{\infty} 159mm$ 引用三篇论文
  - <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0380133008715880>
  - <https://benthamopen.com/ABSTRACT/TOFISHSJ-2-59>
  - <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0380133013001846>
- $\Delta l_i$ 的计算引用
  - von Bertalanffy growth equation
  - 《Survival and metamorphosis of larval sea lamprey (*Petromyzon marinus*) residing in Lakes Michigan and Huron near river mouths》

- $d = 188$ 天引用: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0380133003704845>



将算出来的 $P_y$ 、性别比算出的密度带入最上面的公式，可以算出B

假设：成年鱼存活率为1 **快找个文献论证一下**（或者根本不提这个事了）

$N^{juvenile}$ ：当前时刻单位体积成年鱼数量

$D^{larval} = 4$ 年：未成年时期的时长（*duration*），单位：年

$D^{juvenile} = 2$ 年：成年时期的时长（*duration*），单位：年

$S^{larval} = 0.627$ ：幼鱼每年存活率

$P_y$ ：幼鱼存活 $y$ 年，且没有变态的概率（前面算过了）

$R_y$ ： $y$ 年前的那一年出生的鱼，在今年或之前成年并存活

的概率

$m_i$ ：幼鱼在第 $i$ 年变态为成年鱼的概率（前面算过了）

$B$ ：每年出生的幼鱼数量（前面算过了）

**思路**：今年成年鱼的数量，等于寿命时间范围内，每年出生的鱼的数量，乘这些鱼存活并变态的概率

今年出生的未成年鱼不会成年

1年前出生的未成年鱼今年成年的概率等于**存活一年并变态**

$$R_1 = S^{larval} m_1$$

2年前出生的未成年鱼现在成年且存活的概率等于：出生就成年（概率为0）+ 幼鱼存活1年再成年 + 幼鱼存活2年，今年成年

$$R_2 = S^{larval} m_1 + S^{larval} (1 - m_1) \times S^{larval} m_2$$

3年前出生的未成年鱼现在成年且存活的概率等于：出生就成年（概率为0）+ 幼鱼存活1年再成年 + 幼鱼存活2年再成年 + 幼鱼存活3年再成年

$$R_3 = S^{larval} m_1 + S^{larval} (1 - m_1) \times S^{larval} m_2 + S^{larval} (1 - m_1) \times S^{larval} (1 - m_2) \times S^{larval} m_3$$

4年前出生的未成年鱼现在成年且存活的概率等于：出生就成年（概率为0）+ 幼鱼存活1年再成年(但是成年后活了2年就死了) + 幼鱼存活2年再成年 + 幼鱼存活3年再成年 + 幼鱼存活4年再成年

$$R_4 = S^{larval}(1 - m_1) \times S^{larval}m_2 \\ + S^{larval}(1 - m_1) \times S^{larval}(1 - m_2) \times S^{larval}m_3 \\ + S^{larval}(1 - m_1) \times S^{larval}(1 - m_2) \times S^{larval}(1 - m_3) \times S^{larval}m_4$$

5年前出生的未成年鱼现在成年且存活概率等于：出生就成年（概率为0）+ 幼鱼存活1年再成年(但是成年后活了2年就死了)+ 幼鱼存活2年再成年(但是成年后活了2年就死了)+ 幼鱼存活3年再成年+ 幼鱼存活4年再成年

$$R_5 = S^{larval}(1 - m_1) \times S^{larval}(1 - m_2) \times S^{larval}m_3 \\ + S^{larval}(1 - m_1) \times S^{larval}(1 - m_2) \times S^{larval}(1 - m_3) \times S^{larval}m_4$$

6年前出生的未成年鱼现在成年且存活概率等于：出生就成年（概率为0）+ 幼鱼存活1年再成年(但是成年后活了2年就死了)+ 幼鱼存活2年再成年(但是成年后活了2年就死了)+ 幼鱼存活3年再成年(但是成年后活了2年就死了)+ 幼鱼存活4年再成年

$$R_6 = S^{larval}(1 - m_1) \times S^{larval}(1 - m_2) \times S^{larval}(1 - m_3) \times S^{larval}m_4$$

如果一个幼虫超过4年了还没成年，我们认为它已经死了

总公式如下：

$$R_y = \sum_{i=\max(y-D^{juvenile}, 0)}^{\min(y, D^{larval})} P_{i-1} S^{larval} m_i \\ P_0 = 1 \\ y = 1, 2 \dots (D^{larval} + D^{juvenile}) \\ N^{juvenile} = \sum_{y=1}^{D^{juvenile} + D^{larval}} R_y B$$

注：当前时刻成年鱼的数量，等于所有  $D^{juvenile} + D^{larval}$  年前出生的鱼

这样，就从性别比，幼虫密度到出生量B，计算出了当前成年个体的数量

## 计算七鳃鳗密度对各种鱼类的影响

### 参考文档

$a_i$ : 寄生生物对第*i*种宿主的攻击次数

$F = 0.41$ : 进食季节长度

$N_i$ : 第*i*种宿主的密度

$\lambda_i$ : 对第*i*种宿主的有效搜索率

$S_i$ : 在攻击季节宿主游泳的距离

$P_S$ : 在攻击中存活概率

$h_i = 0.0548$ : 第*i*种宿主附着时间

$L_i$ : 宿主长度 (mm)

$PR$ :  $\frac{\text{七鳃鳗质量}}{\text{宿主质量}}$

七鳃鳗质量 = 200.9 (173.5, 203)

$$\lambda_i = S_i$$

$$S_i = 7.884L_i$$

$$P_S = 1 - \frac{PR^2}{1 + PR^2}$$

$$a_i = \frac{F\lambda_i N_i}{1 + \sum_j \lambda_j N_j h_j}$$

- **假设：**所有物种的 $h$ 都相同（不会造成极端影响）
  - 引用：Although handling times will really vary among host types, this assumption is not as extreme as it first appears because it is applied only to the larger host species that form a substantial portion of the diet during the summer and autumn feeding season that is being modeled. 《Sea Lamprey (*Petromyzon marinus*) Parasite-host Interactions》
- **假设：** $F = 0.41, h = 0.0548$  引用：[http://www.glf.org/pubs/SpecialPubs/Sp89\\_1.pdf](http://www.glf.org/pubs/SpecialPubs/Sp89_1.pdf)
- **假设：** $\lambda_i$ ：对第 $i$ 种宿主的有效搜索率 引用《Sea Lamprey (*Petromyzon marinus*) Parasite-host Interactions in the Great Lakes》Bence2003

$M_i$ ：攻击瞬间死亡率（年死亡率）

$A_i$ ：每个宿主平均受攻击次数（年受攻击次数）

$P_s$ ：宿主每次受攻击生存率

$$M_i = (1 - P_s)A_i$$

现在不用这个假设了

- **假设：** $P_s = 0.25$  引用：<https://cdnsiencepub.com/doi/abs/10.1139/f80-243>

$A_i$ ：每个宿主平均受攻击次数（年受攻击次数）

$L$ ：七鳃鳗数量（密度）

$N_i$ ：第 $i$ 种宿主的密度

$$A_i = \frac{a_i L}{N_i}$$

这样，就能从七鳃鳗密度、宿主数量密度、宿主长度，计算出某鱼类物种受七鳃鳗攻击的年死亡率（相对）

## 自然资源和性别比的关系

### 假设

- 设有两个环境P（productive 资源丰富），U（unproductive 资源不丰富）
- 假设自然增长率R（rate of natural increase）主要由雌性或雄性占比较小的（ $\min(1-M\%, M\%)$ ）决定
- 两环境由于资源不同，自然增长率不同
  - $R_P = \alpha_P[\min(1 - M_P, M_P)]$
  - $R_U = \alpha_U[\min(1 - M_U, M_U)]$
  - 引用：《Field study suggests that sexdetermination in sea lamprey is directlyinfluenced by larval growth rate》《Survival and metamorphosis of low-density populations of larval sea lampreys (*Petromyzon marinus*) in streams》《Survival and metamorphosis of larval sea lamprey (*Petromyzon marinus*) residing near river mouths in lakes Michigan and Huron. J. Great Lakes》

Previous population demographic work showed that larvae reared in lenticenvironments grew two to four times slower and metamorphosed into the parasitic stage at smaller sizes than larvae from the stream environments [22,24].

- 假设只考虑短期变化，种群无死亡
- (假设自然增长率 + 1)就是种群数量 ( $N_P, N_U$ ) 的导数
- 由于水流运动，两环境会有 $\beta\%$ 的七鳃鳗交换
- 由于营养不良，U环境中雌性七鳃鳗进入P环境后，繁殖能力不能和P环境中雌性七鳃鳗相比。P环境七鳃鳗进入U环境中，繁殖能力超过U中雌性七鳃鳗
- 假设两环境种的出生七鳃鳗性别比为： $M_{BP}$ 、 $M_{BU}$ ，即两环境种出生雄性占比（不同于总雄性占比）

productive环境中

$N_{PF}$ : 雌性数量

$N'_{PF}$ : 雌性繁殖能力

$N_{PM}$ : 雄性数量

$N_P = N_{PF} + N_{PM}$ : 总数量

$N'_P = N'_{PF} + N_{PM}$ : 总繁殖能力

$R_P$ : 自然增长率

$M_{BP}$ : 出生七鳃鳗中雄性比例 (常数)

$M_P$ : 雄性繁殖能力占比

$\alpha_P$ : 系数 (常数)

$\beta$ : 系数 (常数)

$\gamma$ :  $P$ 环境中雌性七鳃鳗繁殖能力比 $U$ 环境中强的倍数

思路: 雄性增长率 = 自然增长率  $\times$  总数  $\times$  出生雄性占比 + 迁移速率  $\times$  另一环境总数  $\times$  另一环境雄性占比 - 迁出数量

$$\frac{dN_{PM}}{dt} = R_P M_{BP} N'_P + \beta M_U N_U - \beta M_P N_P$$

$$\frac{dN_{PF}}{dt} = R_P (1 - M_{BP}) N'_P + \beta (1 - M_U) N_U - \beta (1 - M_P) N_P$$

$$\frac{dN'_{PF}}{dt} = R_P (1 - M_{BP}) N'_P + \beta \frac{1}{\gamma} (1 - M_U) N_U - \beta (1 - M_P) N_P$$

$$R_P = \alpha_P [\min(1 - M_P, M_P)]$$

$$M_P = \frac{N_{PM}}{N_{PM} + N_{PF}}$$

unproductive环境中把P改成U,增加gamma突出两个环境的不平衡性

$$\frac{dN_{UM}}{dt} = R_U M_{BU} N'_U + \beta M_P N_P - \beta M_U N_U$$

$$\frac{dN_{UF}}{dt} = R_U (1 - M_{BU}) N'_U + \beta (1 - M_P) N_P - \beta (1 - M_U) N_U$$

$$\frac{dN'_{UF}}{dt} = R_U (1 - M_{BU}) N'_U + \beta \gamma (1 - M_P) N_P - \beta (1 - M_U) N_U$$

$$R_U = \alpha_U [\min(1 - M_U, M_U)]$$

$$M_U = \frac{N_{UM}}{N_{UM} + N_{UF}}$$

"""

ap = 1;

au = 0.4;

mp = 0.4;

mu = 0.8;

b = 0.4;

r = 4;

ap = 0.7;

au = 0.7;

mp = 0.4;

mu = 0.8;

b = 0.4;

r = 1;

"""

# 环境稳定性

物种多样性：物种多样性指数（物种数量、物种均匀度）

$H$ : 物种占比的信息熵

$P_i$ : 第*i*个物种的占比（频率）

$R_i$ : 第*i*个物种减少量（相对值）

$N$ : 物种总数

$D$ : 物种多样性指数

$$H = - \sum_{i=1}^N P_i \log_2 P_i$$

$$\bar{R} = \frac{\sum_{i=1}^N R_i}{N}$$

$$D = \frac{H + (1 - \tanh(\bar{R}))}{2} \quad D \text{越大越好}$$

## 最后一问

假设：可以用正态分布估计七鳃鳗被感染概率

$SE$ : 样本标准误差

$p$ : 频率

$n$ : 样本量

正态分布的95%分布区间:  $[-1.96, 1.96]$

$$SE = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

七鳃鳗被寄生概率的95%显著区间为:  $[p - 1.96 \cdot SE, p + 1.96 \cdot SE]$

若0在区间中，认为该种寄生虫不易寄生七鳃鳗，否则该寄生虫易寄生七鳃鳗。

七鳃鳗性别比影响七鳃鳗密度，七鳃鳗密度影响**易寄生的寄生虫**生存环境。（雄性比约为0.73时，最有利于寄生虫的寄生）

单位体积寄生数量为:  $p \cdot \text{七鳃鳗密度}$