Жалобы:								
Заболел: □ до часа, □ от 1 до 3, □ от 3 до 6, □ от 6 до 12, □ свыше суток Анамнез болезни и жизни:								
Аллергологический (эпидемиологический) анамнез								
-								
Объек	тириые па	DULLO: OFII	100 000	тодиме: Пуповлетвор	итоп	ا مما	□ средней тяжести, □ тяжелое, □ терминальное, □ смерть.	
<u>Сознание:</u> □ ясное, □ оглушение, □ сопор, □ кома (□ I; □ II), □ ШКГ баллов. <u>Положение:</u> □ активное, □ пассивное, □ вынужденное								
	Кожные покровы: □ сухие, □ влажные, □ теплые, □ холодные, □ физиологической окраски, □ бледные, □ гиперемированные, □ цианотичные,							
□ желтушные, □ акроцианоз, □ мраморность. <u>Лимфоузлы:</u> <u>Сыпь:</u> □ нет; □ есть								
Видимые слизистые:								
Нервная система: <u>Поведение:</u> □ спокойное, □ возбужденное, □ агрессивное, □ депрессивное, □ контактен, □ неконтактен, □ амнезия, □ атаксия;								
Речь: Зрачки: □ OD=OS; □ OD≠OS; □ обычные, □ широкие, □ узкие, □ анизокория; <u>Реакция на свет:</u> □ живая, □ вялая, □ отсутствует								
Нистагм: 🗆 нет, 🗀 есть Менингеальные симптомы: 🗀 нет; 🗀 есть (🗀 Ригидность затылочных мышц, 🗀 Кернига, 🗀 Брудзинского)								
Очаговые симптомы:								
Дыхательная система: Носовое дыхание: Отделяемое из носовых ходов:								
МиндалиныЧДДв мин; <u>олышка:</u> □ инспираторная, □ экспираторная, □ смешанная, □ патологическое дыхание								
							□ тупой, □ коробочный над	
🗆 везикулярное, 🗅 бронхиальное, 🗅 жесткое, 🗅 стенотическое, 🗅 ослаблено, 🗅 отсутствуетХрипы: 🗋 нет; 🗀 есть 🗀 сухие, 🗋 влажные								
□Мелко-, □средне-, □крупнопузырчатые) в шум трения плевры: □ нет: □ есть;Кашель, мокрота:								
Органы кровообращения: сердечные сокращения: Тоны сердца: 🗆 звучные, 🗀 приглушены, 🗀 глухие								
<u>Шум:</u> □ систолический, □ диастолический, □ акцент Пульс Дефицит пульса Шум трения перикарда: □ нет; □ есть. Привычное АД макс. АД макс. АД								
Органы пищеварения: Язык: □ влажный, □ сухой, □ обложен Живот: форма □ мягкий, □ напряжен □ болезненный Положительные симптомы: (□ Ситковского, □ Ровзинга, □ Мерфи, □ Ортнера, □ Мейо-Робсона.								
□ оолезненныи								
Диспепсия: ☐ тошнота, ☐ рвота								
Органы мочеполовой системы: Почки С-м поколачивания								
<u>Диурез:</u> □ Достаточный, □ снижен, □ полиурия, □ гематурия, □ анурия, Гинеколонический анамнез: Menses Задержка								
Дополнительные данные, локальный статус:								
	До терапии		пии	После терапии	ЭКГ до оказания медицинской помощи:			
A,	Д				_			
40	cc				_			
Р					_			
	дд) —	Г после	терапии:	
T					_			
-	рО ₂ юкоза				_			
	Юкоза							
Pe	анимация			Инфузия			Оказанная помощь на месте и во впемя мед. эвакуации:	
ИВ	л/ввл			Катетер в/в				
He	булайзер			Ост. кров/обр. ран				
Ин	Интубация/ларинг.			Повязка/п/ожог				
Ко	Коникотомия			Иммобилизация				
	Трахеотомия			Дефибрилляция				
_	ЭИТ			Тампонада носа				
<u>⊢</u>	Тромболизис		\sqcup	ЭКГ, монитор				
	Катетер. мочев.			Инъекции				
Таблетки			Ингаляция О ₂					
Промыв. желудка				БСЖК, тропонин				
I ly	Пульсоксиметрия			Глюкометрия				
Расход	ı:							