
pre reconstruction
B_{000} only, $b_1 = 1.93$
$V = 42.875\,(h^{-1}\mathrm{Gpc})^3$
recovered f_{NL}
input f_{NL}
150
100
50
0
−50
−100
−100
−50
0
50
100
$k_{\mathrm{max}} = 0.08$
$k_{\mathrm{max}} = 0.10$
$k_{\mathrm{max}} = 0.12$
$k_{\mathrm{max}} = 0.14$
$k_{\mathrm{max}} = 0.15$
$k_{\mathrm{max}} = 0.18$
$k_{\mathrm{max}} = 0.20$


standard reconstruction
B_{000} only, $b_1 = 1.93$
$V = 42.875\,(h^{-1}\mathrm{Gpc})^3$
recovered f_{NL}
input f_{NL}
200
100
0
−100
−200
−100
−50
0
50
100
$k_{\mathrm{max}} = 0.08$
$k_{\mathrm{max}} = 0.10$
$k_{\mathrm{max}} = 0.12$
$k_{\mathrm{max}} = 0.14$
$k_{\mathrm{max}} = 0.15$
$k_{\mathrm{max}} = 0.18$
$k_{\mathrm{max}} = 0.20$


Marisa reconstruction
B_{000} only, $b_1 = 1.93$
$V = 42.875\,(h^{-1}\mathrm{Gpc})^3$
recovered f_{NL}
input f_{NL}
100
0
−100
−200
−100
−50
0
50
100
$k_{\mathrm{max}} = 0.08$
$k_{\mathrm{max}} = 0.10$
$k_{\mathrm{max}} = 0.12$
$k_{\mathrm{max}} = 0.14$
$k_{\mathrm{max}} = 0.15$
$k_{\mathrm{max}} = 0.18$
$k_{\mathrm{max}} = 0.20$