

Programowanie narzędzi analitycznych Z05

Rafał Woźniak

Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw

Warszawa, 19-11-2020

Metoda Największej Wiarygodności

Niech $f(x; \theta)$ będzie rozkładem prawdopodobieństwa dyskretnej zmiennej losowej z parametrem θ .

Założmy, że X_1, X_2, \dots, X_n są niezależną próbą losową z tego rozkładu oraz, że x_1, x_2, \dots, x_n są zaobserwowanymi wartościami tych zmiennych losowych.

Wówczas, funkcją wiarygodności dla parametru θ jest

$$\begin{aligned} L(\theta|x_1, x_2, \dots, x_n) &= P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n) \\ &= P(X_1 = x_1)P(X_2 = x_2) \cdots P(X_n = x_n) \\ &= f(x_1; \theta)f(x_2; \theta) \cdots f(x_n; \theta) \\ &= \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) \end{aligned}$$

F. wiarygodn. jest funkcją θ i bywa oznaczana $L(\theta) = L(\theta|x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Źródło: *Mathematical Statistics with Resampling and R*, str. 137.

Metoda Największej Wiarygodności

Niech $f(x; \theta)$ będzie rozkładem prawdopodobieństwa ciągłej zmiennej losowej z parametrem θ .

Założmy, że X_1, X_2, \dots, X_n są niezależną próbą losową z tego rozkładu oraz, że x_1, x_2, \dots, x_n są zaobserwowanymi wartościami tych zmiennych losowych.

Wówczas, funkcją wiarygodności dla parametru θ jest

$$L(\theta | x_1, x_2, \dots, x_n) = f(x_1; \theta) f(x_2; \theta) \cdots f(x_n; \theta)$$

Oszacowaniem największej wiarygodności parametru θ jest statystyka $\hat{\theta}$, która maksymalizuje funkcję wiarygodności $L(\theta)$

$$L(\hat{\theta}) \geq L(\theta) \text{ dla każdego } \theta. \quad (1)$$

Źródło: *Mathematical Statistics with Resampling and R*, str. 139.


- Załóżmy, że kupiliśmy monetę w sklepie z magicznymi rekwizytami. Moneta wygląda na symetryczną, ale nie koniecznie taka jest. Rzuciliśmy monetą 8 razy i otrzymaliśmy OOROROR. Jaka wartość będzie dobrym oszacowaniem p , prawdopodobieństwa orła?
- Niech $X_i \sim \text{Bern}(p)$, gdzie X_i oznacza orła. Załóżmy, że poszczególne wyniki rzutów są niezależne.

$$\begin{aligned} & P(X_1 = 1, X_2 = 1, X_3 = 1, X_4 = 0, X_5 = 1, X_6 = 0, X_7 = 1, X_8 = 0) \\ = & P(X_1 = 1)P(X_2 = 1)P(X_3 = 1) \cdots P(X_8 = 0) \\ = & p^5(1 - p)^3 \end{aligned}$$

- $\hat{p}_{MNW} = 5/8$

Źródło: *Mathematical Statistics with Resampling and R*, str. 136.

Metoda Newtona-Raphsona



Metoda Newtona (zwana też Metodą Newtona-Raphsona)

Dobre omówienie z przykładami

Włodzimierz Krywicki, Lech Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach tom I (Rozdział XIV Przybliżone rozwiązywanie równań i układów), Wydawnictwo Naukowe PWN.

Metoda

- 1 Zaczynamy od jakiegoś punktu startowego θ_0 .
- 2 Jeżeli wartość w tym punkcie jest różna od zera, to wyznaczamy styczną do funkcji w tym punkcie i wyliczamy jej punkt przecięcia z osią X - otrzymujemy nowy punkt θ_1 .
- 3 Powtarzamy punkty (1) i (2) dopóki nie uzyskamy zbieżności, czyli dopóki nie otrzymamy takiego θ_n , że w następnym kroku daje on siebie, czyli θ_n .

Za pomocą metody Newtona znaleźć miejsce zerowe funkcji

$$f(x) = x^3 - 2x^2 - 4x - 7$$

w przedziale $(3; 4)$.

Przykład (Zadanie 14.2 Krysicki-Włodarski)

Za pomocą metody Newtona znaleźć miejsce zerowe funkcji

$$f(x) = x^3 - 2x^2 - 4x - 7$$

w przedziale (3; 4).

$$f(3) = 27 - 18 - 12 - 7 = -10 < 0$$

$$f(4) = 64 - 32 - 16 - 7 = 9 > 0$$

Wyjdźmy z punktu $\theta_0 = x_0 = 4$. Styczną do funkcji $f(x)$ w x_0 :

$$y - y_0 = f'(x)(x - x_0)$$

Pochodna $f(x)$ to $f'(x) = 3x^2 - 4x - 4$, a

$f'(x_0 = 4) = 48 - 16 - 4 = 28$. Styczna do $f(x)$ w punkcie $x_0 = 4$:

$$y - 9 = 28(x - 4) \rightarrow y = 28x - 103$$

Styczna przecina się z osią X w punkcie $y = 0$, czyli dla

$$x_1 = \frac{103}{28} = 3.678.$$

Następny krok: wyznaczamy wartość funkcji $f(x)$ w punkcie

$x_1 = 3.678$ i jeśli jest różna od zera, to wyznaczamy styczną itd.

Metoda Newtona do znajdowania miejsca zerowego

$$y - y_0 = f'(x)(x - x_0)$$

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0) - 0}{x - x_0}$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

W maksymalizacji funkcji metodą Newtona znajduje się miejsce zerowe pochodnej

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f'(x_n)}{f''(x_n)} \quad (2)$$

- [1] Kryszicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M., *Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach*, Tom I i II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
- [2] Boratyńska A., *Zadania na ćwiczenia ze statystyki matematycznej*.
- [3] Laura Chihara, Tim Hesterberg, *Mathematical Statistics with Resampling and R*, John Wiley&Sons, 2011.