

אריה פיל גירף דודו למה מצויה למור

תנין סיאמי

חזור לדף הראשי

I. אודות


II. מאפיינים

III. התנהגות

אודות

תנין סיאמי (שם מדעי: *Crocodylus siamensis*) הוא מין של תנין ממשפחת התניניים החי בדרום-מזרח אסיה.

מין זה בינוני בגודלו אך קטן יחסית למינים אחרים בסוג תנין. אורכו 2.1 מטרים (6.9 רגל) משקלו מגיע ל-40–70 ק"ג, אם כי פרטים הרבה יותר גדולים התגלו, כשהגדול ביותר הגיע לאורך 4 מטרים (13 רגל) ושקל 350 ק"ג. התנינים גדולים הרבה יותר כשהם בשבי. לתנין זה חרטום מוארך, קשקשים עבים מעל העיניים וצבעם ירוק-זית עד



ירוק כהה.



מאפיינים

מין זה בינוני בגודלו אך קטן יחסית למינים אחרים בסוג תנין. אורכו 2.1 מטרים (6.9 רגל) משקלו מגיע ל-40–70 ק"ג, אם כי פרטים הרבה יותר גדולים התגלו, כשהגדול ביותר הגיע לאורך 4 מטרים (13 רגל) ושקל 350 ק"ג. התנינים גדולים הרבה יותר כשהם בשבי. לתנין זה חרטום מוארך, קשקשים עבים מעל העיניים וצבעם ירוק-זית עד ירוק כהה.

בעבר תנין זה היה נפוץ בכל דרום-מזרח אסיה. כיום הוא מוגבל למדינות: אינדונזיה (בעיקר בבורנאו ובג'אווה), ברוניי, מלזיה, לאוס, קמבודיה, בורמה, וייטנאם ותאילנד (או סיאם), ממנה קיבל את שמו הוא מצוי במים מתוקים באגמים, נהרות איטיים וביצות והוא יכול להימצא גם מחוץ למים זמן ממושך



התנהגות

למרות חשישות השימור, היבטים רבים של תולדות החיים של *C. siamensis* בטבע נותרו לא ידועים, במיוחד בנוגע לביולוגיה הרבייה שלו. [11] מבוגרים ניזונים בעיקר מדגים ונחשים, אך אוכלים גם דו-חיים ויונקים קטנים. [3] מעט מאוד ידוע על ההיסטוריה הטבעית של מין זה בטבע, אך הנקבות בונות קנים תלים הבנויים מפסולת צמחים מגורדת מעורבת בבוץ. [6] בשבי, תנינים אלו מתרבים במהלך העונה הרטובה (אפריל עד מאי), כשהם מטילים בין 15 ל-50 ביצים, אשר לאחר מכן נשמרות עד לבקיעתן. [12] לאחר

הדגירה, הנקבה תסייע לגורים שלה כשהם פורצים מביציהם ולאחר מכן נושאת את הדגירה למים בלסתותיה.

