МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский Авиационный Институт»
(Национальный Исследовательский Университет)

Институт: №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»

Лабораторная работа № 2
по курсу «Численные методы»

Группа: М8О-303Б-23

Студент(ка): Жуховицкий А. Д.

Преподаватель: Ревизников Д.Л.

Оценка:

Москва, 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Тема.....3
2 Задание 3
3 Ход лабораторной работы.....4

1 Тема

Численные методы решения нелинейных уравнений и систем.

2 Задание

2.1. Реализовать методы простой итерации и Ньютона решения нелинейных уравнений в виде программ, задавая в качестве входных данных точность вычислений. С использованием разработанного программного обеспечения найти положительный корень нелинейного уравнения (начальное приближение определить графически). Проанализировать зависимость погрешности вычислений от количества итераций.

$$7.\ 2^x + x^2 - 2 = 0$$

2.2. Реализовать методы простой итерации и Ньютона решения систем нелинейных уравнений в виде программного кода, задавая в качестве входных данных точность вычислений. С использованием разработанного программного обеспечения решить систему нелинейных уравнений (при наличии нескольких решений найти то из них, в котором значения неизвестных являются положительными); начальное приближение определить графически. Проанализировать зависимость погрешности вычислений от количества итераций. a = 2.

$$\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 - a^2 = 0, \\ x_1 - e^{x_2} + a = 0. \end{cases}$$

3 Ход лабораторной работы

```
import numpy as np
import math
import matplotlib.pyplot as plt
from IPython.display import display, Math

equation = lambda x: 2 ** x + x * x - 2
eps = 1e-3
```

Метод Ньютона


Введём производные функции для метода Ньютона

```
ln2 = math.log(2)
derivative = lambda x: (2 ** x) * ln2 + 2 * x
second_derivative = lambda x: (2 ** x) * ln2 * ln2 + 2
```

Оценим начальное приближение графически

```
x = np.linspace(-0.5, 2, 200)
y = equation(x)

plt.axhline(0, color='lightgreen', linewidth=2)
plt.plot(x, y)
plt.grid(True)
plt.show()
```



Положим $x^{(0)} = 0.75$ и проверим условия сходимости метода.

```
x_i = x_prev = 0.75

equation(x_i) * second_derivative(x_i) > 0
```

```
True
```

```
condition = True
iterations = 0

while abs(condition) > eps:
    iterations += 1
    condition = equation(x_prev) / derivative(x_prev)
    x_i = x_prev - condition
    x_prev = x_i

x_newton = x_i
display(Math(fr"x_1 = {x_newton:.3f}"))
print(f"Iterations: {iterations}")
```

$x_1 = 0.653$

```
Iterations: 3
```

Метод простых итераций


Ввёдём функцию $\phi(x) = \sqrt{2 - 2^x}$, которая является преобразованием уравнения $x = \phi(x)$. А также её производную для проверки сходимости метода простых итераций.

```
phi = lambda x: np.sqrt(2 - 2 ** x)
phi_derivative = lambda x: -ln2 * 2 ** (x - 1) / np.sqrt(2 - 2 ** x)
```

Проверим по теореме о условии сходимости метода и оценке его погрешности

```
x = np.linspace(0.575, 0.725, 200)
y = phi(x)
y2 = phi_derivative(x)

plt.axhline(0, color='lightgreen', linewidth=2)
plt.plot(x, y)
plt.plot(x, y2, color='red')
plt.grid(True)
plt.show()
```



На рассматриваемом интервале $[0.575, 0.725]$ функция $\phi(x)$ и её производная непрерывны. Можно заметить, что производная по модулю меньше 1, значит метод простых итераций будет сходиться. Также все значения функции $\phi(x)$ на этом интервале лежат внутри него, что также гарантирует сходимость метода.

Проверим условия теоремы в коде

```
x[0] < phi(x[0])
```

```
np.True_
```

```
phi(x[-1]) < x[-1]
```

```
np.True_
```

```
abs(phi_derivative(x[-1])) < 1
```

```
np.True_
```

```
print(phi_derivative(x[-1]))
```

```
-0.972333622322209
```

```
x_i = 0
x_prev = (x[0] + x[-1]) / 2
q = 0.98
iterations = 0

condition = abs(x_i - x_prev) * q / (1 - q) > eps
```

```
while condition:
    iterations += 1
    x_i = phi(x_prev)
    condition = abs(x_i - x_prev) * q / (1 - q) > eps
    x_prev = x_i

x_iter = x_i
display(Math(fr"x_1 = {x_iter:.3f}"))
print(f"Iterations: {iterations}")
```

$x_1 = 0.653$

```
Iterations: 33
```

Валидация

Используем scipy для проверки

```
from scipy.optimize import fsolve

root = fsolve(equation, 0.7)[0]
```

```
np.allclose(x_newton, root, eps)
```

```
True
```

```
np.allclose(x_iter, root, eps)
```

```
True
```

```
import numpy as np
import math
import matplotlib.pyplot as plt
from IPython.display import display, Math

equation1 = lambda x: x[0] * x[0] + x[1] * x[1] - 4
equation2 = lambda x: x[0] - math.exp(x[1]) + 2
eps = 1e-3
```

Анализ системы

```
x = y = np.linspace(-4, 4, 400)

equation_xy_1 = lambda X, Y: X**2 + Y**2 - 4
equation_xy_2 = lambda X, Y: X - np.exp(Y) + 2


X, Y = np.meshgrid(x, y)

Z1 = equation_xy_1(X, Y)
Z2 = equation_xy_2(X, Y)

plt.figure(figsize=(8, 6))

plt.contour(X, Y, Z1, levels=[0], colors='blue')
plt.contour(X, Y, Z2, levels=[0], colors='red')

plt.axhline(0, color='lightgreen', linewidth=1)
plt.axvline(0, color='lightgreen', linewidth=1)
plt.grid(True)
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.title('Графики уравнений F(x,y)=0 и G(x,y)=0')
plt.show()
```



Введём функции норм

```
def vector_norm(vector):
    vector = np.asarray(vector)
    return np.abs(vector).max()

def matrix_norm(matrix):
    matrix = np.asarray(matrix)
    return np.abs(matrix).sum(axis=1).max()
```

Зададим функции ϕ

$$\phi_1(X) = \sqrt{4 - x_2^2}$$
$$\phi_2(X) = \ln(x_1 + 2)$$

Определим, при каких значениях вектора X норма матрицы Якоби для системы функций ϕ будет меньше 1.

1. Составление матрицы Якоби

- Матрица Якоби $J(X)$ составляется из частных производных заданных функций по каждой из переменных x_1 и x_2: $J(X) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \phi_1}{\partial x_1} & \frac{\partial \phi_1}{\partial x_2} \\ \\ \frac{\partial \phi_2}{\partial x_1} & \frac{\partial \phi_2}{\partial x_2} \end{pmatrix}$

- Найдем соответствующие частные производные:

$$\frac{\partial \phi_1}{\partial x_1} = 0$$
$$\frac{\partial \phi_1}{\partial x_2} = \frac{-2x_2}{2\sqrt{4 - x_2^2}} = \frac{-x_2}{\sqrt{4 - x_2^2}}$$
$$\frac{\partial \phi_2}{\partial x_1} = \frac{1}{x_1 + 2}$$
$$\frac{\partial \phi_2}{\partial x_2} = 0$$

- Подставим найденные производные в матрицу: $J(X) = \begin{pmatrix} 0 & \frac{-x_2}{\sqrt{4-x_2^2}} \\ \\ \frac{1}{x_1+2} & 0 \end{pmatrix}$

2. Вычисление нормы

- Норма: $\|J\| = \max\left(\left|\frac{-x_2}{\sqrt{4-x_2^2}}\right|, \left|\frac{1}{x_1+2}\right|\right)$

Подготовка производных и функций $\phi(x)$ для метода простых итераций в матричной форме

3. Решение неравенств

- По условию задачи норма матрицы должна быть строго меньше единицы ($\|J\| < 1$). Это означает, что каждый из ненулевых элементов по модулю должен быть меньше единицы.Получаем систему неравенств: $\begin{cases} \left|\frac{1}{x_1+2}\right| < 1 \\ \\ \left|\frac{-x_2}{\sqrt{4-x_2^2}}\right| < 1 \end{cases}$

- Решим первое неравенство: С учетом области определения логарифма ($x_1 + 2 > 0 \Rightarrow x_1 > -2$), выражение под модулем положительно. Неравенство примет вид:

$$\frac{1}{x_1 + 2} < 1$$
$$1 < x_1 + 2$$
$$x_1 > -1$$

- Решим второе неравенство: Учитывая ОДЗ для корня ($4 - x_2^2 > 0 \Rightarrow -2 < x_2 < 2$), возведем обе части неравенства в квадрат, так как обе части неотрицательны:

$$\frac{x_2^2}{4 - x_2^2} < 1$$
$$x_2^2 < 4 - x_2^2$$
$$2x_2^2 < 4$$
$$x_2^2 < 2$$
$$-\sqrt{2} < x_2 < \sqrt{2}$$

  Полученный интервал $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ полностью входит в ОДЗ корня $(-2, 2)$.

4. Норма матрицы Якоби меньше 1 при значениях вектора $X = (x_1, x_2)$, удовлетворяющих условиям: $x_1 \in (-1, +\infty), \quad x_2 \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$

Возьмём интервал $x_1 \in [1, 1.75], x_2 \in [1, 1.38]$, так как на графике видно, что искомые корни где-то в области квадрата от 1 до 2

```
x_range = np.array([[1, 1.75], [1, 1.38]])
```

Определим функции ϕ + их производные. Введём матричные представления системы и функций.

```
phi1 = lambda x: math.sqrt(4 - x[1] * x[1])
phi2 = lambda x: math.log(x[0] + 2)

def combine_funcs(*funcs):
    return lambda x: np.array([f(x) for f in funcs])

equation = combine_funcs(equation1, equation2)
phi = combine_funcs(phi1, phi2)
```

```
equation_derivative = lambda x: np.array(
    [
        [2 * x[0], 2 * x[1]],
        [1, -math.exp(x[1])]
    ]
)

phi_derivative = lambda x: np.array(
    [
        [0, -x[1] / math.sqrt(4 - x[1] * x[1])],
        [1 / (x[0] + 2), 0],
```

```
    ]
)
```

Проверим, что ϕ инвариантно

```
def phi_image_range_exact(x_range):
    x0_min, x0_max = x_range[0]
    x1_min, x1_max = x_range[1]

    phi1_min = phi1([0, x1_max])
    phi1_max = phi1([0, x1_min])

    phi2_min = phi2([x0_min, 0])
    phi2_max = phi2([x0_max, 0])

    return np.array([
        [phi1_min, phi1_max],
        [phi2_min, phi2_max],
    ])

def is_invariant_exact(x_range, eps=1e-12):
    image = phi_image_range_exact(x_range)

    ok0 = image[0, 0] >= x_range[0, 0] - eps and image[0, 1] <= x_range[0, 1] + eps
    ok1 = image[1, 0] >= x_range[1, 0] - eps and image[1, 1] <= x_range[1, 1] + eps

    return ok0 and ok1

is_invariant_exact(x_range)
```

```
np.True_
```

Найдём q. Так как функции монотонны, максимум точно достигается на одной из границ.

```
max(
    abs(
        matrix_norm(phi_derivative([x_range[0, 0], x_range[1, 0]])),
    ),
    abs(
        matrix_norm(phi_derivative([x_range[0, 0], x_range[1, 1]])),
    ),
    abs(
        matrix_norm(phi_derivative([x_range[0, 1], x_range[1, 0]])),
    ),
    abs(
        matrix_norm(phi_derivative([x_range[0, 1], x_range[1, 1]])),
    ),
)
```

```
np.float64(0.9532896799882666)
```

```
q = 0.955
```

Вспомогательные функции для решения через метода крамера и вычисления определителя

```python
def get_det(matrix: np.ndarray, eps=1e-3):
    matrix = matrix.copy().astype(np.float64)

    n, m = matrix.shape

    sign = 1.0

    for col in range(n):
        pivot_row = col

        while pivot_row < n and abs(matrix[pivot_row, col]) < eps:
            pivot_row += 1

        if pivot_row == n:
            return 0.0

        if pivot_row != col:
            matrix[[col, pivot_row]] = matrix[[pivot_row, col]]
            sign *= -1

        pivot = matrix[col, col]

        for row in range(col + 1, n):
            factor = matrix[row, col] / pivot
            matrix[row, col:] -= factor * matrix[col, col:]

    det = sign * np.prod(np.diag(matrix))
    return det
```

```python
def cramer(A: np.ndarray, b: np.ndarray, eps=1e-3):
    A = A.copy()
    b = b.copy()

    n, m = A.shape

    det_A = get_det(A.copy(), eps)

    if abs(det_A) < eps:
        raise ValueError("Определитель равен 0, система не имеет единственного решения

    x = np.zeros(n)

    for i in range(n):
        Ai = A.copy()
        Ai[:, i] = b
        x[i] = get_det(Ai, eps) / det_A

    return x
```

Метод Ньютона

```python
x_i = np.sum(x_range / 2, axis=1)
iterations = 0
```

```
condition = True

while condition:
    delta_x = cramer(equation_derivative(x_i), -equation(x_i))
    x_i += delta_x
    condition = vector_norm(delta_x) > eps
    iterations += 1

x_newton = x_i
for i in range(len(x_newton)):
    display(Math(fr"x_{{{i}}} = {x_newton[i]:.3f}"))
print(f"Итераций: {iterations}")
```

$x_0 = 1.548$

$x_1 = 1.266$

```
Итераций: 3
```

Метод простых итераций

```
x_i = x_prev = np.sum(x_range / 2, axis=1)
iterations = 0
condition = True

while condition:
    x_i = phi(x_i)
    condition = q * vector_norm(x_i - x_prev) / (1 - q) > eps
    x_prev = x_i
    iterations += 1

x_iter = x_i
for i in range(len(x_iter)):
    display(Math(fr"x_{{{i}}} = {x_iter[i]:.3f}"))
print(f"Итераций: {iterations}")
```

$x_0 = 1.548$

$x_1 = 1.266$

```
Итераций: 12
```

Валидация

```
from scipy.optimize import fsolve

x_0 = np.sum(x_range / 2, axis=1)
solution = fsolve(equation, x_0)
solution
```

```
array([1.54799144, 1.26638165])
```

```
np.allclose(x_newton, solution, eps)
```

True

```
np.allclose(x_iter, solution, eps)
```

True