

Логика-1, 1 курс М

Виктор Львович Селиванов ¹

¹ФМКН СПбГУ

Весенний семестр, 2024

v.selivanov@spbu.ru

Важная дополнительная информация:

<https://github.com/vseliv/Logic1-2023/tree/main>

Литература

1. Н.К. Верещагин, А. Шень. Лекции по математической логике и теории алгоритмов. Часть 2. Языки и исчисления. — 4-е изд., доп. — М.: МЦНМО, 2012. — 240 с.
2. И.А. Лавров, Л.Л. Максимова, Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгоритмов. Издание четвертое, М.: Наука, 2001. 256 с.
3. Дж. Шенфилд. Математическая логика. М.: Наука, 1975. 528 с.

Исходные символы $ЛП^\sigma$

Выражения $ЛП^\sigma$ строятся из следующих исходных различных символов:

- ▶ Множество σ предикатных и функциональных символов, каждому из которых сопоставлено натуральное число — местность этого символа; будем считать, что σ содержит хотя бы один предикатный символ.

Исходные символы $ЛП^\sigma$

Выражения $ЛП^\sigma$ строятся из следующих исходных различных символов:

- ▶ Множество σ предикатных и функциональных символов, каждому из которых сопоставлено натуральное число — местность этого символа; будем считать, что σ содержит хотя бы один предикатный символ.
- ▶ Счетное множество Var переменных $v_0 v_1 v_2 \dots$

Исходные символы $ЛП^\sigma$

Выражения $ЛП^\sigma$ строятся из следующих исходных различных символов:

- ▶ Множество σ предикатных и функциональных символов, каждому из которых сопоставлено натуральное число — местность этого символа; будем считать, что σ содержит хотя бы один предикатный символ.
- ▶ Счетное множество Var переменных $v_0 v_1 v_2 \dots$
- ▶ Логические символы $\wedge \vee \rightarrow \neg \forall \exists$

Исходные символы $ЛП^\sigma$

Выражения $ЛП^\sigma$ строятся из следующих исходных различных символов:

- ▶ Множество σ предикатных и функциональных символов, каждому из которых сопоставлено натуральное число — местность этого символа; будем считать, что σ содержит хотя бы один предикатный символ.
- ▶ Счетное множество Var переменных $v_0 v_1 v_2 \dots$
- ▶ Логические символы $\wedge \vee \rightarrow \neg \forall \exists$
- ▶ Вспомогательные символы $() ,$

Осмысленные выражения $ЛП^\sigma$

σ -ТЕРМЫ:

любая переменная есть терм;

если f — n -местный функциональный символ из σ и t_1, \dots, t_n — термы, то выражение $f(t_1, \dots, t_n)$ тоже терм.

Осмысленные выражения ЛП^σ

σ -ТЕРМЫ:

любая переменная есть терм;

если f — n -местный функциональный символ из σ и t_1, \dots, t_n — термы, то выражение $f(t_1, \dots, t_n)$ тоже терм.

σ -ФОРМУЛЫ:

выражение $P(t_1, \dots, t_n)$,

где t_1, \dots, t_n — термы, а P — n -местный предикатный символ из σ , является формулой;
если φ и ψ — формулы, а x — переменная, то выражения

$(\varphi \wedge \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$, $(\varphi \rightarrow \psi)$, $\neg\varphi$, $\forall x\varphi$, $\exists x\varphi$
суть формулы.

Свободные и связанные переменные

Множество $FV(\varphi)$ свободных переменных формулы φ определяется по индукции:

$FV(P(t_1, \dots, t_n))$ состоит из переменных, входящих хотя бы в один из термов t_1, \dots, t_n ;

$FV(\varphi \wedge \psi) = FV(\varphi) \cup FV(\psi)$, и аналогично для \vee, \rightarrow, \neg ;

$FV(\forall x \varphi) = FV(\varphi) \setminus \{x\}$, и аналогично для \exists .

Свободные и связанные переменные

Множество $FV(\varphi)$ свободных переменных формулы φ определяется по индукции:

$FV(P(t_1, \dots, t_n))$ состоит из переменных, входящих хотя бы в один из термов t_1, \dots, t_n ;

$FV(\varphi \wedge \psi) = FV(\varphi) \cup FV(\psi)$, и аналогично для \vee, \rightarrow, \neg ;

$FV(\forall x \varphi) = FV(\varphi) \setminus \{x\}$, и аналогично для \exists .

Переменные, которые входят в формулу, но не являются свободными, называются связанными.

Формулы без свободных переменных называются предложениями.

Запись $\varphi = \varphi(x_1, \dots, x_m)$ означает, что

$FV(\varphi) \subseteq \{x_1, \dots, x_m\}$. Аналогично для термов.

σ -Структуры

σ -Структура — пара $\mathbb{A} = (A; I)$, состоящая из непустого множества A и интерпретации I всех сигнатурных символов в A (I сопоставляет n -местному предикатному символу $P \in \sigma$ некоторый n -местный предикат $P^I = P^{\mathbb{A}} : A^n \rightarrow \{\text{И}, \text{Л}\}$, а каждому n -местному функциональному символу f из σ — некоторую n -местную функцию $f^I = f^{\mathbb{A}}$ на A).

σ -Структуры

σ -Структура — пара $\mathbb{A} = (A; I)$, состоящая из непустого множества A и интерпретации I всех сигнатурных символов в A (I сопоставляет n -местному предикатному символу $P \in \sigma$ некоторый n -местный предикат $P^I = P^{\mathbb{A}} : A^n \rightarrow \{\text{И}, \text{Л}\}$, а каждому n -местному функциональному символу f из σ — некоторую n -местную функцию $f^I = f^{\mathbb{A}}$ на A).

Изоморфизмом \mathbb{A} на \mathbb{B} называется биекция g множества A на множество B такая, что

$P^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_n) = P^{\mathbb{B}}(g(a_1), \dots, g(a_n))$ и
 $g(f^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathbb{B}}(g(a_1), \dots, g(a_n))$ для любых $a_1, \dots, a_n \in A$.

Структуры \mathbb{A} и \mathbb{B} называются изоморфными ($\mathbb{A} \simeq \mathbb{B}$), если существует изоморфизм \mathbb{A} на \mathbb{B} .

Значения термов и формул

Для любой σ -структуры \mathbb{A} и означивания $\nu : Var \rightarrow A$ определяем значения $t^{\mathbb{A},\nu} \in A$ и $\varphi^{\mathbb{A},\nu} \in \{И, Л\}$ индукцией:

$$x^{\mathbb{A},\nu} = \nu(x), \quad f(t_1, \dots, t_n)^{\mathbb{A},\nu} = f^{\mathbb{A}}(t_1^{\mathbb{A},\nu}, \dots, t_n^{\mathbb{A},\nu});$$

Значения термов и формул

Для любой σ -структуры \mathbb{A} и означивания $\nu : Var \rightarrow A$ определяем значения $t^{\mathbb{A},\nu} \in A$ и $\varphi^{\mathbb{A},\nu} \in \{И, Л\}$ индукцией:

$$x^{\mathbb{A},\nu} = \nu(x), \quad f(t_1, \dots, t_n)^{\mathbb{A},\nu} = f^{\mathbb{A}}(t_1^{\mathbb{A},\nu}, \dots, t_n^{\mathbb{A},\nu});$$

$$P(t_1, \dots, t_n)^{\mathbb{A},\nu} = P^{\mathbb{A}}(t_1^{\mathbb{A},\nu}, \dots, t_n^{\mathbb{A},\nu});$$

$$(\varphi \wedge \psi)^{\mathbb{A},\nu} = \varphi^{\mathbb{A},\nu} \wedge \psi^{\mathbb{A},\nu}, \text{ аналогично для } \vee, \rightarrow, \neg;$$

$$(\forall x \varphi)^{\mathbb{A},\nu} = \bigwedge_{a \in A} \varphi^{\mathbb{A},\nu_a^x} \text{ и } (\exists x \varphi)^{\mathbb{A},\nu} = \bigvee_{a \in A} \varphi^{\mathbb{A},\nu_a^x}$$

,

где ν_a^x — означивание, полученное из ν изменением значения x на a .

Значения термов и формул

Пусть $t = t(x_1, \dots, x_m)$ и $\varphi = \varphi(x_1, \dots, x_m)$.

- ▶ Если означивания μ и ν согласованы на x_1, \dots, x_m , то $t^{\mathbb{A}, \mu} = t^{\mathbb{A}, \nu}$ и $\varphi^{\mathbb{A}, \mu} = \varphi^{\mathbb{A}, \nu}$. Поэтому вместо $t^{\mathbb{A}, \nu}$ часто пишут $t^{\mathbb{A}}(x_1/a_1, \dots, x_m/a_m)$ или, короче, $t^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_m)$, где $a_i = \nu(x_i)$; аналогично для формул. Вместо $\varphi^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_m)$ часто пишут $\mathbb{A} \models \varphi(a_1, \dots, a_m)$.
- ▶ Если g — изоморфизм \mathbb{A} на \mathbb{B} , то $g(t^{\mathbb{A}, \nu}) = t^{\mathbb{B}, g \circ \nu}$ и $\varphi^{\mathbb{A}, \nu} = \varphi^{\mathbb{B}, g \circ \nu}$. Иными словами, $g(t^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_m)) = t^{\mathbb{B}}(g(a_1), \dots, g(a_m))$ и $\varphi^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_m) = \varphi^{\mathbb{B}}(g(a_1), \dots, g(a_m))$.
- ▶ Если $\mathbb{A} \simeq \mathbb{B}$, то эти структуры элементарно эквивалентны ($\mathbb{A} \equiv \mathbb{B}$), т.е. в них истинны одни и те же σ -предложения.

Определимость и автоморфизмы

Предикат $P(x_1, \dots, x_k)$ на σ -структуре \mathbb{A} называется *определимым*, если он определяется подходящей σ -формулой $\varphi(x_1, \dots, x_k)$, т.е.

$P(a_1, \dots, a_k) = \varphi^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_k)$ для любых $a_1, \dots, a_k \in A$.

Функция на A *определима*, если определим ее график.

Элемент $a \in A$ определим, если множество $\{a\}$ (равносильно, предикат $x = a$) определимо. τ -Структура \mathbb{B} определима в \mathbb{A} , если определимы ее универсум и интерпретации всех τ -символов.

Определимость и автоморфизмы

Предикат $P(x_1, \dots, x_k)$ на σ -структуре \mathbb{A} называется *определимым*, если он определяется подходящей σ -формулой $\varphi(x_1, \dots, x_k)$, т.е.

$P(a_1, \dots, a_k) = \varphi^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_k)$ для любых $a_1, \dots, a_k \in A$.

Функция на A *определима*, если определим ее график.

Элемент $a \in A$ определим, если множество $\{a\}$

(равносильно, предикат $x = a$) определимо. τ -Структура \mathbb{B} определима в \mathbb{A} , если определимы ее универсум и интерпретации всех τ -символов.

Определимость в структуре \mathbb{A} связана с автоморфизмами этой структуры, которые составляют группу $Aut(\mathbb{A})$:

любой определимый предикат инвариантен относительно всех автоморфизмов. Это свойство часто используют для доказательства неопределимости: если предикат не инвариантен, то он не определим.

Общезначимость и ее варианты

- ▶ φ общезначима (тождественно истинна), если $\varphi^{\mathbb{A}, \nu} = \text{И}$ для любых \mathbb{A} и ν .
- ▶ φ и ψ равносильны ($\varphi \equiv \psi$), если $\varphi^{\mathbb{A}, \nu} = \psi^{\mathbb{A}, \nu}$ для любых \mathbb{A} и ν .
- ▶ Моделью множества предложений T называется структура, в которой все предложения из T истинны.
- ▶ Предложение φ логически следует из множества предложений T ($T \models \varphi$), если φ истинно в любой модели множества T .

Общезначимость и ее варианты

- ▶ φ общезначима $\iff \models \varphi$.
- ▶ $\varphi \equiv \psi \iff (\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)$ общезначима.
- ▶ $\varphi(\bar{x})$ общезначима $\iff \forall \bar{x} \varphi$ общезначима.
- ▶ $T \models (\varphi \rightarrow \psi) \iff T \cup \{\varphi\} \models \psi$.
- ▶ $T \models \varphi \iff T \cup \{\neg\varphi\}$ не имеет модели.
- ▶ $T \models \varphi \iff \bigwedge T \rightarrow \varphi$ общезначима, где T — конечное множество предложений.

Фильтры и ультрафильтры

Фильтр F на множестве I — это собственное подмножество множества $P(I)$, замкнутое относительно пересечения и надмножеств. Фильтр F называется ультрафильтром, если $J \in F \vee \bar{J} \in F$ для любого $J \subseteq I$, где $\bar{J} = I \setminus J$.

Фильтры и ультрафильтры

Фильтр F на множестве I — это собственное подмножество множества $P(I)$, замкнутое относительно пересечения и надмножеств. Фильтр F называется ультрафильтром, если $J \in F \vee \bar{J} \in F$ для любого $J \subseteq I$, где $\bar{J} = I \setminus J$.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

1. Ультрафильтры на I — это в точности максимальные фильтры по включению.
2. Если F — ультрафильтр, то $J \notin F \iff \bar{J} \in F$ и $J \cup K \in F \iff (J \in F \vee K \in F) \in F$, для любых $J, K \subseteq I$.
3. Любой фильтр на I содержится в некотором ультрафильтре.

Фильтрованные произведения

Пусть $\{\mathbb{A}_i\}_{i \in I}$ — семейство σ -структур и F — фильтр на I .

Тогда отношение $a \equiv_F b \iff \{i \mid a(i) = b(i)\} \in F$ есть эквивалентность на $A = \{a : I \rightarrow \bigcup_i A_i \mid \forall i (a(i) \in A_i)\}$.

Определим σ -структуру \mathbb{A}_F на A/\equiv_F так:

$P^{\mathbb{A}_F}([a_1], \dots, [a_n]) \iff \{i \mid P^{\mathbb{A}_i}(a_1(i), \dots, a_n(i))\} \in F,$

$f^{\mathbb{A}_F}([a_1], \dots, [a_n]) = [a],$ где $a(i) = f^{\mathbb{A}_i}(a_1(i), \dots, a_n(i));$

это определение корректно.

Фильтрованные произведения

Пусть $\{\mathbb{A}_i\}_{i \in I}$ — семейство σ -структур и F — фильтр на I . Тогда отношение $a \equiv_F b \iff \{i \mid a(i) = b(i)\} \in F$ есть эквивалентность на $A = \{a : I \rightarrow \bigcup_i A_i \mid \forall i (a(i) \in A_i)\}$. Определим σ -структуру \mathbb{A}_F на A/\equiv_F так:
 $P^{\mathbb{A}_F}([a_1], \dots, [a_n]) \iff \{i \mid P^{\mathbb{A}_i}(a_1(i), \dots, a_n(i))\} \in F$,
 $f^{\mathbb{A}_F}([a_1], \dots, [a_n]) = [a]$, где $a(i) = f^{\mathbb{A}_i}(a_1(i), \dots, a_n(i))$;
это определение корректно.

ТЕОРЕМА. Для любых ультрафильтра F , σ -формулы $\varphi(x_1, \dots, x_m)$ и $a_1, \dots, a_m \in A$ имеем:
 $\mathbb{A}_F \models \varphi([a_1], \dots, [a_m]) \iff \{i \mid \mathbb{A}_i \models \varphi(a_1(i), \dots, a_m(i))\} \in F$.

В частности, при $m = 0$: $\mathbb{A}_F \models \varphi \iff \{i \mid \mathbb{A}_i \models \varphi\} \in F$.

Теорема компактности

ТЕОРЕМА. Если любое конечное подмножество данного множества предложений T имеет модель, то и все множество T имеет модель.

Теорема компактности

ТЕОРЕМА. Если любое конечное подмножество данного множества предложений T имеет модель, то и все множество T имеет модель.

Далее предполагаем, что σ содержит символ равенства $=$ (двухместный предикатный символ). σ -Структура называется нормальной, если символ равенства в ней интерпретируется стандартным образом, как отношение равенства элементов.

Теорема компактности

ТЕОРЕМА. Если любое конечное подмножество данного множества предложений T имеет модель, то и все множество T имеет модель.

Далее предполагаем, что σ содержит символ равенства = (двухместный предикатный символ). σ -Структура называется нормальной, если символ равенства в ней интерпретируется стандартным образом, как отношение равенства элементов.

Аксиомы равенства $\forall x(x = x)$, $\forall x\forall y(x = y \rightarrow y = x)$,
 $\forall x\forall y\forall z(x = y \wedge y = z \rightarrow x = z)$,
 $\forall x_1\forall y_1 \dots \forall x_n\forall y_n(x_1 = y_1 \wedge \dots \wedge x_n = y_n \rightarrow$
 $f(x_1, \dots, x_n) = f(y_1, \dots, y_n))$,
 $\forall x_1\forall y_1 \dots \forall x_n\forall y_n(x_1 = y_1 \wedge \dots \wedge x_n = y_n \wedge P(x_1, \dots, x_n) \rightarrow$
 $P(y_1, \dots, y_n))$

истинны в любой нормальной структуре.

Нормальные модели, компактность для них

ТЕОРЕМА. Если теория содержит аксиомы равенства и имеет модель, то она имеет и нормальную модель.

Нормальные модели, компактность для них

ТЕОРЕМА. Если теория содержит аксиомы равенства и имеет модель, то она имеет и нормальную модель.

Следующий результат есть теорема компактности для нормальных моделей.

ТЕОРЕМА. Если любое конечное подмножество данного множества предложений T сигнатуры с равенством имеет нормальную модель, то и все множество T имеет нормальную модель.

Для доказательства надо применить теорему компактности к множеству $T \cup E_\sigma$, где E_σ — аксиомы равенства, и профакторизовать полученную модель \mathbb{A} по $\equiv^{\mathbb{A}}$.

Понижение мощности

- ▶ \mathbb{A} — *подструктура* \mathbb{B} ($\mathbb{A} \subseteq \mathbb{B}$), если $A \subseteq B$, $P^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_n) = P^{\mathbb{B}}(a_1, \dots, a_n)$ и $f^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_n) = f^{\mathbb{B}}(a_1, \dots, a_n)$ для всех $a_1, \dots, a_n \in A$;
- ▶ *вложение* структуры \mathbb{A} в структуру \mathbb{B} — это изоморфизм \mathbb{A} на подструктуру структуры \mathbb{B} ;
- ▶ \mathbb{A} — *элементарная подструктура* \mathbb{B} ($\mathbb{A} \preceq \mathbb{B}$), если $A \subseteq B$ и $\varphi^{\mathbb{A}}(\bar{a}) = \varphi^{\mathbb{B}}(\bar{a})$ для всех $\bar{a} \in A$ и для всех формул $\varphi(\bar{x})$;
- ▶ *элементарное вложение* \mathbb{A} в \mathbb{B} — это изоморфизм \mathbb{A} на элементарную подструктуру структуры \mathbb{B} ;
- ▶ \mathbb{A} *элементарно эквивалентно* \mathbb{B} ($\mathbb{A} \equiv \mathbb{B}$), если они удовлетворяют одни и те же предложения.

Понижение мощности

ТЕОРЕМА. Пусть есть \mathbb{A} , $X \subseteq A$, $|X| \leq |\text{For}_\sigma|$.

Тогда существует $\mathbb{B} \preceq \mathbb{A}$: $X \subseteq B$ и $|\mathbb{B}| \leq |\text{For}_\sigma|$.

Понижение мощности

ТЕОРЕМА. Пусть есть \mathbb{A} , $X \subseteq A$, $|X| \leq |\text{For}_\sigma|$.
Тогда существует $\mathbb{B} \preceq \mathbb{A}$: $X \subseteq B$ и $|\mathbb{B}| \leq |\text{For}_\sigma|$.

Д. Определим последовательность

$X = S_0 \subseteq S_1 \subseteq \dots$ по индукции:

$$S_{n+1} = S_n \cup \{\eta(e) \mid e \in E_n\},$$

где E_n и $\eta : E_n \rightarrow A$ определены так:

$$E_n = \{(\bar{a}, \varphi(\bar{x}, y)) \mid \bar{a} \in S_n \text{ и } \mathbb{A} \models \exists y \varphi(\bar{a}, y)\} \text{ и } \\ \mathbb{A} \models \varphi(\bar{a}, \eta(e)) \text{ для всех } e \in E_n. B = \bigcup_n S_n.$$

Понижение мощности

ТЕОРЕМА. Пусть есть \mathbb{A} , $X \subseteq A$, $|X| \leq |\text{For}_\sigma|$.
Тогда существует $\mathbb{B} \preceq \mathbb{A}$: $X \subseteq B$ и $|\mathbb{B}| \leq |\text{For}_\sigma|$.

Д. Определим последовательность

$X = S_0 \subseteq S_1 \subseteq \dots$ по индукции:

$$S_{n+1} = S_n \cup \{\eta(e) \mid e \in E_n\},$$

где E_n и $\eta : E_n \rightarrow A$ определены так:

$$E_n = \{(\bar{a}, \varphi(\bar{x}, y)) \mid \bar{a} \in S_n \text{ и } \mathbb{A} \models \exists y \varphi(\bar{a}, y)\} \text{ и } \mathbb{A} \models \varphi(\bar{a}, \eta(e)) \text{ для всех } e \in E_n. B = \bigcup_n S_n.$$

Известен следующий важный результат: Не существует логики, собственным образом расширяющей логику предикатов и удовлетворяющей теоремам компактности и понижения мощности.

Константное обогащение

Если $\sigma \subseteq \tau$, то сигнатура τ называется *обогащением* сигнатуры σ . Если \mathbb{A} — σ -структура, то, определив интерпретацию символов из $\tau \setminus \sigma$ в A , получим τ -структуру \mathbb{B} , называемую обогащением структуры \mathbb{A} . Наоборот: если \mathbb{B} — τ -структура, то, “забывая” интерпретацию символов из $\tau \setminus \sigma$, получим σ -обеднение $B|_\sigma$ структуры \mathbb{B} . Чаще всего сигнатуры обогащаются константными символами.

Константное обогащение

Если $\sigma \subseteq \tau$, то сигнатура τ называется *обогащением* сигнатуры σ . Если $\mathbb{A} — \sigma$ -структура, то, определив интерпретацию символов из $\tau \setminus \sigma$ в A , получим τ -структуру \mathbb{B} , называемую обогащением структуры \mathbb{A} . Наоборот: если $\mathbb{B} — \tau$ -структура, то, “забывая” интерпретацию символов из $\tau \setminus \sigma$, получим σ -обеднение $B|_\sigma$ структуры \mathbb{B} . Чаще всего сигнатуры обогащаются константными символами.

Например, пусть $\mathbb{A} — \sigma$ -структура, а $\sigma_A = \sigma \cup \{c_a \mid a \in A\}$ ее обогащение новыми константными символами c_a такими, что $c_a \neq c_b$ при $a \neq b$. Стандартным константным обогащением структуры \mathbb{A} называется ее σ_A -обогащение, в котором новые символы интерпретируются так: $c_a \mapsto a$, для любого $a \in A$.

Аксиоматизируемые классы

- ▶ Теория T — множество σ -предложений.
- ▶ Теории T соответствует класс ее моделей $\text{Mod}(T) = \{\mathbb{A} \mid \mathbb{A} \models T\}$
- ▶ Классу структур $K \subseteq \text{Str}_\sigma$ соответствует его теория $\text{Th}(K) = \{\varphi \in \text{Sent}_\sigma \mid \forall \mathbb{A} \in K (\mathbb{A} \models \varphi)\}$.
- ▶ Класс структур K *аксиоматизируем*, если $K = \text{Mod}(T)$ для некоторой теории T .
- ▶ Класс структур K *конечно аксиоматизируем*, если $K = \text{Mod}(T)$ для некоторой конечной теории $T = \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$. Это равносильно аксиоматизируемости одной формулой $(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_n)$.

Аксиоматизируемые классы: свойства

1. Если $T \subseteq T'$, то $\text{Mod}(T) \supseteq \text{Mod}(T')$;
2. Если $K \subseteq K'$, то $\text{Th}(K) \supseteq \text{Th}(K')$;
3. $K \subseteq \text{Mod}(\text{Th}(K))$ и $T \subseteq \text{Th}(\text{Mod}(T))$;
4. Класс K аксиоматизируем тогда и только тогда, когда $K = \text{Mod}(\text{Th}(K))$;
5. Любое пересечение аксиоматизируемых классов является аксиоматизируемым классом. Объединение двух аксиоматизируемых классов является аксиоматизируемым классом;
6. Класс K конечно аксиоматизируем тогда и только тогда, когда K и $\text{Str}_\sigma \setminus K$ аксиоматизируемы;
7. Класс K — аксиоматизируем тогда и только тогда, когда K замкнут относительно элементарной эквивалентности и ультрапроизведений.

Логика высказываний

Пусть σ бесконечна и состоит только из нульместных предикатных символов p, q, r, \dots . Бескванторные σ -формулы называются формулами логики высказываний (ЛВ) сигнатуры σ . Они называются также булевыми формулами (изучались в курсе дискретной математики).

Общезначимые формулы ЛВ называются также тавтологиями.

Хотя ЛВ составляет маленький фрагмент ЛП, она очень важна для применений, поскольку широко используется в проектировании микросхем.

Логика высказываний

Пусть σ бесконечна и состоит только из нульместных предикатных символов p, q, r, \dots . Бескванторные σ -формулы называются формулами логики высказываний (ЛВ) сигнатуры σ . Они называются также булевыми формулами (изучались в курсе дискретной математики).

Общезначимые формулы ЛВ называются также тавтологиями.

Хотя ЛВ составляет маленький фрагмент ЛП, она очень важна для применений, поскольку широко используется в проектировании микросхем.

Множество булевых формул счетной сигнатуры, имеющих модель, является NP-полным. Вопрос “ $P=?NP$ ” является одной из основных открытых проблем информатики.

Основные тавтологии

1. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi);$
2. $(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \theta)) \rightarrow (\varphi \rightarrow \theta));$
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi));$
4. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi;$
5. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi;$
6. $\varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi);$
7. $\psi \rightarrow (\varphi \vee \psi);$
8. $(\varphi \rightarrow \theta) \rightarrow ((\psi \rightarrow \theta) \rightarrow ((\varphi \vee \psi) \rightarrow \theta));$
9. $(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow \neg\varphi);$
10. $\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi.$

Основные равносильности

1. $(\varphi \rightarrow \psi) \equiv (\neg\varphi \vee \psi)$; 2. $\neg\neg\varphi \equiv \varphi$;
3. $\neg(\varphi \wedge \psi) \equiv (\neg\varphi \vee \neg\psi)$; 4. $\neg(\varphi \vee \psi) \equiv (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$;
5. $(\varphi \wedge \psi) \equiv (\psi \wedge \varphi)$; 6. $(\varphi \vee \psi) \equiv (\psi \vee \varphi)$;
7. $\varphi \wedge (\psi \wedge \theta) \equiv (\varphi \wedge \psi) \wedge \theta$;
8. $\varphi \vee (\psi \vee \theta) \equiv (\varphi \vee \psi) \vee \theta$;
9. $\varphi \wedge (\psi \vee \theta) \equiv (\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \theta)$;
10. $\varphi \vee (\psi \wedge \theta) \equiv (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \theta)$.
11. $\neg(\forall x\varphi) \equiv \exists x(\neg\varphi)$;
12. $\neg(\exists x\varphi) \equiv \forall x(\neg\varphi)$;
13. $\psi \wedge \forall x\varphi \equiv \forall x(\psi \wedge \varphi)$;
14. $\psi \vee \exists x\varphi \equiv \exists x(\psi \vee \varphi)$;
15. $\psi \vee \forall x\varphi \equiv \forall x(\psi \vee \varphi)$ (x не входит свободно в ψ);
16. $\psi \wedge \exists x\varphi \equiv \exists x(\psi \wedge \varphi)$ (x не входит свободно в ψ);
17. $\forall x\varphi(x) \equiv \forall y\varphi(y)$ (y не входит в φ);
18. $\exists x\varphi(x) \equiv \exists y\varphi(y)$ (y не входит в φ).

Ограниченные кванторы

На практике часто используют так называемые формулы с ограниченными кванторами

$$\forall x_{\psi(x)} \varphi \text{ и } \exists x_{\psi(x)} \varphi,$$

где формула ψ является ограничением.

Такие выражения являются сокращениями обычных формул

$$\forall x(\psi \rightarrow \varphi) \text{ и } \exists x(\psi \wedge \varphi).$$

Ограниченные кванторы

На практике часто используют так называемые формулы с ограниченными кванторами

$$\forall x_{\psi(x)}\varphi \text{ и } \exists x_{\psi(x)}\varphi,$$

где формула ψ является ограничением.

Такие выражения являются сокращениями обычных формул

$$\forall x(\psi \rightarrow \varphi) \text{ и } \exists x(\psi \wedge \varphi).$$

Законы Де Моргана справедливы и для ограниченных кванторов:

$$\neg(\forall x_{\psi}\varphi) \equiv \exists x_{\psi}(\neg\varphi),$$

$$\neg(\exists x_{\psi}\varphi) \equiv \forall x_{\psi}(\neg\varphi).$$

Свойства равносильности

- ▶ Отношение \equiv рефлексивно, симметрично и транзитивно.
- ▶ Если $\varphi \equiv \psi$ и $\varphi_1 \equiv \psi_1$, то $\varphi \wedge \varphi_1 \equiv \psi \wedge \psi_1$, $\varphi \vee \varphi_1 \equiv \psi \vee \psi_1$, $\varphi \rightarrow \varphi_1 \equiv \psi \rightarrow \psi_1$, $\neg\varphi \equiv \neg\psi$ и $\forall x\varphi \equiv \forall x\psi, \exists x\varphi \equiv \exists x\psi$ для любой предметной переменной x .
- ▶ Пусть ψ — подформула формулы φ , а φ' — результат замены некоторого вхождения ψ в φ на формулу ψ' . Тогда из $\psi \equiv \psi'$ следует $\varphi \equiv \varphi'$.

ДНФ и КНФ

Элементарной дизъюнкцией называется формула, являющаяся либо переменной, либо отрицанием переменной, либо дизъюнкцией нескольких переменных и отрицаний переменных.

Конъюнктивной нормальной формой (КНФ) называется формула, являющаяся либо элементарной дизъюнкцией, либо конъюнкцией нескольких элементарных дизъюнкций. Элементарные конъюнкции и ДНФ определяются так же, с заменой \wedge на \vee и наоборот.

ДНФ и КНФ

Элементарной дизъюнкцией называется формула, являющаяся либо переменной, либо отрицанием переменной, либо дизъюнкцией нескольких переменных и отрицаний переменных.

Конъюнктивной нормальной формой (КНФ) называется формула, являющаяся либо элементарной дизъюнкцией, либо конъюнкцией нескольких элементарных дизъюнкций. Элементарные конъюнкции и ДНФ определяются так же, с заменой \wedge на \vee и наоборот.

Для любой формулы найдется равносильная ей КНФ.

Алгоритм приведения к КНФ (ДНФ):

Исключаем все импликации. По законам де Моргана проносим все отрицания как можно дальше вглубь формулы. Убираем все двойные отрицания. Раскрываем все скобки по закону дистрибутивности 9 (10).

Формулы предваренного вида

Формулу называют предваренной, если она либо бескванторная, либо имеет вид $Q_1x_1 \dots Q_kx_k\psi$, где Q_i — кванторы, x_i — попарно различные переменные и формула ψ не содержит кванторов.

Формулы предваренного вида

Формулу называют предваренной, если она либо бескванторная, либо имеет вид $Q_1x_1 \dots Q_kx_k\psi$, где Q_i — кванторы, x_i — попарно различные переменные и формула ψ не содержит кванторов.

Любая формула логики предикатов равносильна некоторой предваренной формуле. Алгоритм приведения к предваренному виду:

Исключаем все импликации. По законам де Моргана проносим все отрицания как можно дальше вглубь формулы. Убираем все двойные отрицания.

Переименовываем все связанные переменные по равносильностям 17, 18 так, чтобы новые переменные отличались от всех свободных переменных. Выносим по очереди кванторы вперед по равносильностям 13 — 16.

Элиминация кванторов

Говорят, что формулы $\varphi(\bar{x})$ и $\psi(\bar{x})$ *равносильны в теории T* ($\varphi \equiv_T \psi$), если $T \models \forall \bar{x}(\varphi(\bar{x}) \leftrightarrow \psi(\bar{x}))$.

Элиминация кванторов

Говорят, что формулы $\varphi(\bar{x})$ и $\psi(\bar{x})$ *равносильны в теории T* ($\varphi \equiv_T \psi$), если $T \models \forall \bar{x}(\varphi(\bar{x}) \leftrightarrow \psi(\bar{x}))$.

Теория T *допускает элиминацию кванторов*, если любая формула $\varphi(\bar{x})$ *равносильна* подходящей бескванторной формуле $\psi(\bar{x})$ в теории T .

Элиминация кванторов

Говорят, что формулы $\varphi(\bar{x})$ и $\psi(\bar{x})$ *равносильны в теории T* ($\varphi \equiv_T \psi$), если $T \models \forall \bar{x}(\varphi(\bar{x}) \leftrightarrow \psi(\bar{x}))$.

Теория T *допускает элиминацию кванторов*, если любая формула $\varphi(\bar{x})$ равносильна подходящей бескванторной формуле $\psi(\bar{x})$ в теории T .

Аналогично, структура \mathbb{A} *допускает элиминацию кванторов*, если любая формула $\varphi(\bar{x})$ равносильна подходящей бескванторной формуле $\psi(\bar{x})$ в этой структуре.

\mathbb{A} *допускает элиминацию кванторов в точности тогда, когда теория $Th(\mathbb{A}) = \{\varphi \mid T \models \varphi\}$ допускает элиминацию кванторов* (эта теория называется теорией структуры \mathbb{A}).

Элиминация кванторов в \mathbb{R}

ТЕОРЕМА. Упорядоченное поле $(\mathbb{R}; =, <, +, \cdot, 0, 1)$ вещественных чисел допускает элиминацию кванторов.

Элиминация кванторов в \mathbb{R}

ТЕОРЕМА. Упорядоченное поле $(\mathbb{R}; =, <, +, \cdot, 0, 1)$ вещественных чисел допускает элиминацию кванторов.

Доказательство разобьем на вспомогательные утверждения, в которых все формулы имеют сигнатуру $\{=, <, +, \cdot, 0, 1\}$, $\bar{x} = (x_1, \dots, x_m)$ — набор различных переменных, а структура из формулировки теоремы сокращенно обозначается \mathbb{R} .

Элиминация кванторов в \mathbb{R}

ТЕОРЕМА. Упорядоченное поле $(\mathbb{R}; =, <, +, \cdot, 0, 1)$ вещественных чисел допускает элиминацию кванторов.

Доказательство разобьем на вспомогательные утверждения, в которых все формулы имеют сигнатуру $\{=, <, +, \cdot, 0, 1\}$, $\bar{x} = (x_1, \dots, x_m)$ — набор различных переменных, а структура из формулировки теоремы сокращенно обозначается \mathbb{R} .

1) Достаточно проверить, что для любой бескванторной формулы $\theta(x, \bar{x})$ формула $\varphi(\bar{x}) = \exists x \theta(x, \bar{x})$ равносильна в \mathbb{R} подходящей бескванторной формуле.

Элиминация кванторов в \mathbb{R}

ТЕОРЕМА. Упорядоченное поле $(\mathbb{R}; =, <, +, \cdot, 0, 1)$ вещественных чисел допускает элиминацию кванторов.

Доказательство разобьем на вспомогательные утверждения, в которых все формулы имеют сигнатуру $\{=, <, +, \cdot, 0, 1\}$, $\bar{x} = (x_1, \dots, x_m)$ — набор различных переменных, а структура из формулировки теоремы сокращенно обозначается \mathbb{R} .

- 1) Достаточно проверить, что для любой бескванторной формулы $\theta(x, \bar{x})$ формула $\varphi(\bar{x}) = \exists x \theta(x, \bar{x})$ равносильна в \mathbb{R} подходящей бескванторной формуле.
- 2) Любая бескванторная формула $\psi(\bar{x})$ равносильна в \mathbb{R} дизъюнкции нескольких формул, каждая из которых является конъюнкцией нескольких атомарных формул $t = t_1, t < t_1$.

Элиминация кванторов в \mathbb{R}

Отношение $(t = t_1)^{\mathbb{R}}$ (соотв. $(t < t_1)^{\mathbb{R}}$) совпадает с множеством всех решений уравнения $Q(\bar{x}) = 0$ (соотв. неравенства $Q(\bar{x}) > 0$), для подходящего полинома $Q \in \mathbb{Z}[\bar{x}]$. Поэтому предикат $\psi(\bar{x})^{\mathbb{R}}$ (рассматриваемый как подмножество \mathbb{R}^m) совпадает с конечным объединением множеств всех решений системы уравнений и неравенств указанного вида. Такие конечные объединения называются *полуалгебраическими множествами*.

Элиминация кванторов в \mathbb{R}

Отношение $(t = t_1)^{\mathbb{R}}$ (соотв. $(t < t_1)^{\mathbb{R}}$) совпадает с множеством всех решений уравнения $Q(\bar{x}) = 0$ (соотв. неравенства $Q(\bar{x}) > 0$), для подходящего полинома $Q \in \mathbb{Z}[\bar{x}]$. Поэтому предикат $\psi(\bar{x})^{\mathbb{R}}$ (рассматриваемый как подмножество \mathbb{R}^m) совпадает с конечным объединением множеств всех решений системы уравнений и неравенств указанного вида. Такие конечные объединения называются *полуалгебраическими множествами*.

Для бескванторной формулы $\theta(x, \bar{x})$ докажем, что формула $\varphi(\bar{x}) = \exists x \theta(x, \bar{x})$ равносильна в \mathbb{R} подходящей бескванторной формуле (т.е. $\varphi(\bar{x})^{\mathbb{R}}$ полуалгебраическое). Согласно предыдущему слайду, можем найти полиномы Q_1, \dots, Q_k из кольца $\mathbb{Z}[x, \bar{x}] = K[x]$, где $K = \mathbb{Z}[\bar{x}]$, определяющие полуалгебраическое множество $\theta(x, \bar{x})^{\mathbb{R}}$, содержащееся в \mathbb{R}^{m+1} .

Элиминация кванторов в \mathbb{R}

При фиксировании значений $\bar{x} \in \mathbb{R}^m$, $Q_1^{\bar{x}}, \dots, Q_k^{\bar{x}}$ становятся вещественными полиномами; пусть $\alpha_1 < \dots < \alpha_l$ — все вещественные корни всех ненулевых полиномов $Q_1^{\bar{x}}, \dots, Q_k^{\bar{x}}$.

Элиминация кванторов в \mathbb{R}

При фиксировании значений $\bar{x} \in \mathbb{R}^m$, $Q_1^{\bar{x}}, \dots, Q_k^{\bar{x}}$ становятся вещественными полиномами; пусть $\alpha_1 < \dots < \alpha_l$ — все вещественные корни всех ненулевых полиномов $Q_1^{\bar{x}}, \dots, Q_k^{\bar{x}}$.

Пусть $T_{\bar{x}}$ — таблица размера $k \times (2l + 1)$, строки которой помечены полиномами Q_1, \dots, Q_k , столбцы помечены интервалами

$(-\infty, \alpha_1), [\alpha_1, \alpha_1], (\alpha_1, \alpha_2), [\alpha_2, \alpha_2], \dots, [\alpha_l, \alpha_l], (\alpha_l, +\infty)$,
а любая клетка (i, j) содержит $= 0, > 0$, или < 0 , в зависимости от знака $Q_i^{\bar{x}}$ в интервале I_j .

Элиминация кванторов в \mathbb{R}

При фиксировании значений $\bar{x} \in \mathbb{R}^m$, $Q_1^{\bar{x}}, \dots, Q_k^{\bar{x}}$ становятся вещественными полиномами; пусть $\alpha_1 < \dots < \alpha_l$ — все вещественные корни всех ненулевых полиномов $Q_1^{\bar{x}}, \dots, Q_k^{\bar{x}}$.

Пусть $T_{\bar{x}}$ — таблица размера $k \times (2l + 1)$, строки которой помечены полиномами Q_1, \dots, Q_k , столбцы помечены интервалами

$(-\infty, \alpha_1), [\alpha_1, \alpha_1], (\alpha_1, \alpha_2), [\alpha_2, \alpha_2], \dots, [\alpha_l, \alpha_l], (\alpha_l, +\infty)$, а любая клетка (i, j) содержит $= 0, > 0$, или < 0 , в зависимости от знака $Q_i^{\bar{x}}$ в интервале I_j .

Определим отношение эквивалентности \sim на \mathbb{R}^m соотношением: $\bar{x} \sim \bar{y}$, если $T_{\bar{x}} = T_{\bar{y}}$. Тогда соответствующее фактор-множество конечно. Поскольку $\varphi(\bar{x})^{\mathbb{R}}$ инвариантно относительно \sim , получаем:

Элиминация кванторов в \mathbb{R}

3) Достаточно доказать, что для любых $Q_1, \dots, Q_k \in K[x]$, где $K = \mathbb{Z}[\bar{x}]$, любой класс эквивалентности $[\bar{x}]$ является полуалгебраическим множеством.

Элиминация кванторов в \mathbb{R}

3) Достаточно доказать, что для любых $Q_1, \dots, Q_k \in K[x]$, где $K = \mathbb{Z}[\bar{x}]$, любой класс эквивалентности $[\bar{x}]$ является полуалгебраическим множеством.

4) Если все классы эквивалентности для Q_1, \dots, Q_k, Q_{k+1} полуалгебраические, то и все классы эквивалентности для Q_1, \dots, Q_k полуалгебраические.

Элиминация кванторов в \mathbb{R}

3) Достаточно доказать, что для любых $Q_1, \dots, Q_k \in K[x]$, где $K = \mathbb{Z}[\bar{x}]$, любой класс эквивалентности $[\bar{x}]$ является полуалгебраическим множеством.

4) Если все классы эквивалентности для Q_1, \dots, Q_k, Q_{k+1} полуалгебраические, то и все классы эквивалентности для Q_1, \dots, Q_k полуалгебраические.

5) Пусть $[Q]$ — замыкание множества $Q = \{Q_1, \dots, Q_k\}$ относительно следующих операций на $K[x]$: взятие старшего коэффициента; вычеркивание старшего члена; взятие производной; сопоставление полиномам P, Q остатка от деления $P \cdot c^{p-q+1}$ на Q , где c — старший коэффициент Q , а $p \geq q$ — степени P и Q , соответственно. Тогда множество $[Q]$ конечно.

Элиминация кванторов в \mathbb{C}

ТЕОРЕМА. Поле $(\mathbb{C}; =, +, \cdot, 0, 1)$ комплексных чисел допускает элиминацию кванторов.

Элиминация кванторов в \mathbb{C}

ТЕОРЕМА. Поле $(\mathbb{C}; =, +, \cdot, 0, 1)$ комплексных чисел допускает элиминацию кванторов.

Доказательство разобьем на вспомогательные утверждения, в которых все формулы имеют сигнатуру $\{=, +, \cdot, 0, 1\}$, $\bar{x} = (x_1, \dots, x_m)$ — набор различных переменных, а структура из формулировки теоремы сокращенно обозначается \mathbb{C} .

Элиминация кванторов в \mathbb{C}

ТЕОРЕМА. Поле $(\mathbb{C}; =, +, \cdot, 0, 1)$ комплексных чисел допускает элиминацию кванторов.

Доказательство разобьем на вспомогательные утверждения, в которых все формулы имеют сигнатуру $\{=, +, \cdot, 0, 1\}$, $\bar{x} = (x_1, \dots, x_m)$ — набор различных переменных, а структура из формулировки теоремы сокращенно обозначается \mathbb{C} .

1) Достаточно проверить, что для любой бескванторной формулы $\theta(x, \bar{x})$ формула $\varphi(\bar{x}) = \exists x \theta(x, \bar{x})$ равносильна в \mathbb{C} подходящей бескванторной формуле.

Элиминация кванторов в \mathbb{C}

ТЕОРЕМА. Поле $(\mathbb{C}; =, +, \cdot, 0, 1)$ комплексных чисел допускает элиминацию кванторов.

Доказательство разобьем на вспомогательные утверждения, в которых все формулы имеют сигнатуру $\{=, +, \cdot, 0, 1\}$, $\bar{x} = (x_1, \dots, x_m)$ — набор различных переменных, а структура из формулировки теоремы сокращенно обозначается \mathbb{C} .

- 1) Достаточно проверить, что для любой бескванторной формулы $\theta(x, \bar{x})$ формула $\varphi(\bar{x}) = \exists x \theta(x, \bar{x})$ равносильна в \mathbb{C} подходящей бескванторной формуле.
- 2) Любая бескванторная формула $\psi(\bar{x})$ равносильна в \mathbb{C} дизъюнкции нескольких формул, каждая из которых является конъюнкцией нескольких формул вида $t = t_1$, $\neg t = t_1$.

Элиминация кванторов в \mathbb{C}

Отношение $(t = t_1)^{\mathbb{C}}$ совпадает с множеством всех решений уравнения $Q(\bar{x}) = 0$, для подходящего полинома $Q \in \mathbb{Z}[\bar{x}]$. Поэтому предикат $\psi(\bar{x})^{\mathbb{C}}$ (рассматриваемый как подмножество \mathbb{C}^m) совпадает с конечным объединением множеств всех решений системы уравнений и отрицаний уравнений указанного вида. Такие конечные объединения называются *алгебраическими множествами*.

Элиминация кванторов в \mathbb{C}

Отношение $(t = t_1)^{\mathbb{C}}$ совпадает с множеством всех решений уравнения $Q(\bar{x}) = 0$, для подходящего полинома $Q \in \mathbb{Z}[\bar{x}]$. Поэтому предикат $\psi(\bar{x})^{\mathbb{C}}$ (рассматриваемый как подмножество \mathbb{C}^m) совпадает с конечным объединением множеств всех решений системы уравнений и отрицаний уравнений указанного вида. Такие конечные объединения называются *алгебраическими множествами*.

Для бескванторной формулы $\theta(x, \bar{x})$ докажем, что формула $\varphi(\bar{x}) = \exists x \theta(x, \bar{x})$ равносильна в \mathbb{C} подходящей бескванторной формуле (т.е. $\varphi(\bar{x})^{\mathbb{C}}$ алгебраическое).

Согласно предыдущему слайду, можем найти полиномы Q_1, \dots, Q_k из кольца $\mathbb{Z}[x, \bar{x}] = K[x]$, где $K = \mathbb{Z}[\bar{x}]$, определяющие полуалгебраическое множество $\theta(x, \bar{x})^{\mathbb{C}}$, содержащееся в \mathbb{C}^{m+1} .

Элиминация кванторов в \mathbb{C}

При фиксировании значений $\bar{x} \in \mathbb{C}^m$, $Q_1^{\bar{x}}, \dots, Q_k^{\bar{x}}$ становятся комплексными полиномами; пусть $\alpha_1, \dots, \alpha_l$ — все комплексные корни всех ненулевых полиномов из $Q_1^{\bar{x}}, \dots, Q_k^{\bar{x}}$.

Элиминация кванторов в \mathbb{C}

При фиксировании значений $\bar{x} \in \mathbb{C}^m$, $Q_1^{\bar{x}}, \dots, Q_k^{\bar{x}}$ становятся комплексными полиномами; пусть $\alpha_1, \dots, \alpha_l$ — все комплексные корни всех ненулевых полиномов из $Q_1^{\bar{x}}, \dots, Q_k^{\bar{x}}$.

Пусть $T_{\bar{x}}$ — таблица размера $k \times (l + 1)$, строки которой помечены полиномами Q_1, \dots, Q_k , столбцы помечены корнями $\alpha_1, \dots, \alpha_l$ (плюс еще один столбец, соответствующий дополнению до множества всех корней), и любая клетка (i, j) содержит $= 0$ или $\neq 0$ в зависимости от значения $Q_i^{\bar{x}}$ в соответствующем корне (или в дополнении до множества всех корней).

Элиминация кванторов в \mathbb{C}

При фиксировании значений $\bar{x} \in \mathbb{C}^m$, $Q_1^{\bar{x}}, \dots, Q_k^{\bar{x}}$ становятся комплексными полиномами; пусть $\alpha_1, \dots, \alpha_l$ — все комплексные корни всех ненулевых полиномов из $Q_1^{\bar{x}}, \dots, Q_k^{\bar{x}}$.

Пусть $T_{\bar{x}}$ — таблица размера $k \times (l + 1)$, строки которой помечены полиномами Q_1, \dots, Q_k , столбцы помечены корнями $\alpha_1, \dots, \alpha_l$ (плюс еще один столбец, соответствующий дополнению до множества всех корней), и любая клетка (i, j) содержит $= 0$ или $\neq 0$ в зависимости от значения $Q_i^{\bar{x}}$ в соответствующем корне (или в дополнении до множества всех корней).

Определим отношение эквивалентности \sim на \mathbb{C}^m соотношением: $\bar{x} \sim \bar{y}$, если $T_{\bar{x}} = T_{\bar{y}}$. Тогда соответствующее фактор-множество конечно. Поскольку $\varphi(\bar{x})^{\mathbb{C}}$ инвариантно относительно \sim , получаем:

Элиминация кванторов в \mathbb{C}

3) Достаточно доказать, что для любых $Q_1, \dots, Q_k \in K[x]$, где $K = \mathbb{Z}[\bar{x}]$, любой класс эквивалентности $[\bar{x}]$ является алгебраическим множеством.

Элиминация кванторов в \mathbb{C}

3) Достаточно доказать, что для любых $Q_1, \dots, Q_k \in K[x]$, где $K = \mathbb{Z}[\bar{x}]$, любой класс эквивалентности $[\bar{x}]$ является алгебраическим множеством.

4) Если все классы эквивалентности для Q_1, \dots, Q_k, Q_{k+1} алгебраические, то и все классы эквивалентности для Q_1, \dots, Q_k алгебраические.

Элиминация кванторов в \mathbb{C}

3) Достаточно доказать, что для любых $Q_1, \dots, Q_k \in K[x]$, где $K = \mathbb{Z}[\bar{x}]$, любой класс эквивалентности $[\bar{x}]$ является алгебраическим множеством.

4) Если все классы эквивалентности для Q_1, \dots, Q_k, Q_{k+1} алгебраические, то и все классы эквивалентности для Q_1, \dots, Q_k алгебраические.

5) Пусть $[Q]$ — замыкание множества $Q = \{Q_1, \dots, Q_k\}$ относительно следующих операций на $K[x]$: взятие старшего коэффициента; вычеркивание старшего члена; взятие производной; сопоставление полиномам P, Q остатка от деления $P \cdot c^{p-q+1}$ на Q , где c — старший коэффициент Q , а $p \geq q$ — степени P и Q , соответственно. Тогда множество $[Q]$ конечно.

Основной результат ЛП

Множество всех общезначимых предложений любой конечной сигнатуры перечислимо, т.е. существует алгоритм, который перечисляет все элементы этого множества, и никакие другие предложения. Схема доказательства:

Основной результат ЛП

Множество всех общезначимых предложений любой конечной сигнатуры перечислимо, т.е. существует алгоритм, который перечисляет все элементы этого множества, и никакие другие предложения. Схема доказательства:

- 1) фиксируются некоторые конкретные простые общезначимые предложения (называемые аксиомами);
- 2) фиксируются некоторые простые правила, позволяющие чисто синтаксически выводить одни формулы из других;
- 3) доказывается, что многократное применение правил вывода к аксиомам и уже выведенным формулам порождает все общезначимые формулы.

Основной результат ЛП

Множество всех общезначимых предложений любой конечной сигнатуры перечислимо, т.е. существует алгоритм, который перечисляет все элементы этого множества, и никакие другие предложения. Схема доказательства:

- 1) фиксируются некоторые конкретные простые общезначимые предложения (называемые аксиомами);
- 2) фиксируются некоторые простые правила, позволяющие чисто синтаксически выводить одни формулы из других;
- 3) доказывается, что многократное применение правил вывода к аксиомам и уже выведенным формулам порождает все общезначимые формулы.

Глубина основного результата в том, что определение Тарского не дает никакой верхней границы для вычислительной сложности множества общезначимых предложений. Известно, что не существует логики, расширяющей ЛП и удовлетворяющей теоремам компактности и основному результату.

Исчисление предикатов $ИП_\sigma$

Аксиомы:

1) Тавтологии (формулы, получающиеся из общезначимых формул ЛВ заменой пропозициональных переменных на формулы ЛП сигнатуры σ);

Исчисление предикатов $ИП_\sigma$

Аксиомы:

1) Тавтологии (формулы, получающиеся из общезначимых формул ЛВ заменой пропозициональных переменных на формулы ЛП сигнатуры σ);

2) Кванторные аксиомы (где $\varphi(t)$ — результат подстановки терма t вместо всех свободных вхождений x в формулу $\varphi(x)$; обозначение $\varphi(t)$ применяется только при условии, что никакая переменная терма t не оказывается связанной в результате этой подстановки):

$\forall x\varphi(x) \rightarrow \varphi(t)$ и $\varphi(t) \rightarrow \exists x\varphi(x)$;

Исчисление предикатов $ИП_\sigma$

Аксиомы:

1) Тавтологии (формулы, получающиеся из общезначимых формул ЛВ заменой пропозициональных переменных на формулы ЛП сигнатуры σ);

2) Кванторные аксиомы (где $\varphi(t)$ — результат подстановки терма t вместо всех свободных вхождений x в формулу $\varphi(x)$; обозначение $\varphi(t)$ применяется только при условии, что никакая переменная терма t не оказывается связанной в результате этой подстановки):

$\forall x\varphi(x) \rightarrow \varphi(t)$ и $\varphi(t) \rightarrow \exists x\varphi(x)$;

3) Аксиомы равенства для сигнатуры σ .

Исчисление предикатов $ИП_\sigma$

Аксиомы:

1) Тавтологии (формулы, получающиеся из общезначимых формул ЛВ заменой пропозициональных переменных на формулы ЛП сигнатуры σ);

2) Кванторные аксиомы (где $\varphi(t)$ — результат подстановки терма t вместо всех свободных вхождений x в формулу $\varphi(x)$; обозначение $\varphi(t)$ применяется только при условии, что никакая переменная терма t не оказывается связанной в результате этой подстановки):

$\forall x\varphi(x) \rightarrow \varphi(t)$ и $\varphi(t) \rightarrow \exists x\varphi(x)$;

3) Аксиомы равенства для сигнатуры σ .

Правила: $\frac{\varphi, \varphi \rightarrow \psi}{\psi}$, $\frac{\psi \rightarrow \varphi(y)}{\psi \rightarrow \forall x\varphi(x)}$, $\frac{\varphi(y) \rightarrow \psi}{\exists x\varphi(x) \rightarrow \psi}$,

где y — переменная, не входящая свободно в нижнюю формулу.

Свойства аксиом и правил

- ▶ Все аксиомы общезначимы.
- ▶ Если формула получена по правилу вывода из формул, тождественно истинных в \mathbb{A} , то тогда она тождественно истинна в \mathbb{A} .
- ▶ Если в любой аксиоме (любом правиле вывода) заменить все вхождения константного символа c на переменную z , не входящую в эту аксиому (это правило вывода), то получим аксиому (правило вывода). Неформально говоря, константы похожи на “свежие” переменные.

Выводимость

Выводом формулы φ из множества формул T называется последовательность формул $\varphi_0, \dots, \varphi_n = \varphi$, где φ_i либо аксиома, либо принадлежит T , либо получается из предыдущих по одному из правил.

Формула φ *выводима* из множества формул T , если существует вывод формулы φ из T .

Обозначается $T \vdash \varphi$. При $T = \emptyset$ говорят просто о выводимости.

Выводимость

Выводом формулы φ из множества формул T называется последовательность формул $\varphi_0, \dots, \varphi_n = \varphi$, где φ_i либо аксиома, либо принадлежит T , либо получается из предыдущих по одному из правил.

Формула φ *выводима* из множества формул T , если существует вывод формулы φ из T .

Обозначается $T \vdash \varphi$. При $T = \emptyset$ говорят просто о выводимости.

Основной результат об ИП $_{\sigma}$:

φ выводимо $\iff \varphi$ общезначимо;

Более общо: $T \vdash \varphi \iff T \models \varphi$.

Пример вывода

1. $\neg\varphi(x) \rightarrow \exists x\neg\varphi(x)$ — кванторная аксиома;
2. $(\neg\varphi(x) \rightarrow \exists x\neg\varphi(x)) \rightarrow (\neg\exists x\neg\varphi(x) \rightarrow \varphi(x))$
— тавтология;
3. $\neg\exists x\neg\varphi(x) \rightarrow \varphi(x)$ — выведена из 1 и 2 по \rightarrow -правилу;
4. $\neg\exists x\neg\varphi(x) \rightarrow \forall x\varphi(x)$ — выведена из 3 по \forall -правилу;
5. $(\neg\exists x\neg\varphi(x) \rightarrow \forall x\varphi(x)) \rightarrow (\neg\forall x\varphi(x) \rightarrow \exists x\neg\varphi(x))$ — тавтология;
6. $\neg\forall x\varphi(x) \rightarrow \exists x\neg\varphi(x)$ — выведена из 4 и 5 по \rightarrow -правилу.

Свойства выводимости

1. $T \vdash (\varphi \rightarrow \psi) \iff T \cup \{\varphi\} \vdash \psi$
(φ предложение, ψ формула, T множество формул).
2. Если $\varphi \in T$, то $T \vdash \varphi$.
3. Если $T \vdash \varphi$, то $T_0 \vdash \varphi$ для подходящего конечного множества $T_0 \subseteq T$.
4. Если $S \vdash \varphi$ и все формулы множества S выводимы из T , то $T \vdash \varphi$.
5. Если $T \cup \{\varphi\} \vdash \theta$ и $T \cup \{\psi\} \vdash \theta$, то $T \cup \{\varphi \vee \psi\} \vdash \theta$ (φ и ψ — предложения).
6. Если $T \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ и $T \cup \{\varphi\} \vdash \neg\psi$, то $T \vdash \neg\varphi$ (φ — предложение).
7. $T \vdash \varphi \wedge \psi \iff T \vdash \varphi$ и $T \vdash \psi$.

Доказательство свойства 1

Пусть $T \vdash (\varphi \rightarrow \psi)$ и $\varphi_1, \dots, \varphi_k$ — вывод $(\varphi \rightarrow \psi) = \varphi_k$ из T . Тогда $\varphi_1, \dots, \varphi_k, \varphi, \psi$ — вывод ψ из $T \cup \{\varphi\}$.

Обратно, пусть $T \cup \{\varphi\} \vdash \psi$. Соотношение $T \vdash (\varphi \rightarrow \psi)$ будем доказывать индукцией по длине вывода $\varphi_1, \dots, \varphi_k$ формулы $\psi = \varphi_k$ из $T \cup \{\varphi\}$. При $k = 1$ (базис индукции) формула $\psi = \varphi_1$ либо аксиома, либо принадлежит множеству $T \cup \{\varphi\}$. В первом случае искомым выводом формулы $\varphi \rightarrow \psi$ из T является $\psi, \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi), \varphi \rightarrow \psi$. Это рассуждение проходит и в случае $\psi \in T$. Наконец, если $\psi = \varphi$, то искомым вывод состоит из единственной тавтологии $\varphi \rightarrow \varphi$.

Доказательство свойства 1

Пусть $k > 1$, и предположим, что для выводов, длина которых меньше k , утверждение $T \vdash (\varphi \rightarrow \psi)$ справедливо. При $1 \leq i < k$ последовательность $\varphi_1, \dots, \varphi_i$ есть вывод (длины i) φ_i из $T \cup \{\varphi\}$, и, по индукции, имеем $T \vdash (\varphi \rightarrow \varphi_i)$. По определению вывода, φ_k либо аксиома, либо принадлежит $T \cup \{\varphi\}$, либо выведена из предыдущих формул $\varphi_i (i < k)$ по одному из правил вывода. В первых двух случаях доказательство $T \vdash (\varphi \rightarrow \varphi_k)$ как в базисе индукции.

Пусть φ_k выведена из φ_i и φ_j по \rightarrow -правилу. Тогда $\varphi_j = \varphi_i \rightarrow \varphi_k$ и есть деревья вывода E и D формул $\varphi \rightarrow \varphi_i$ и $\varphi \rightarrow \varphi_j$ из T . Из тавтологии $A = (\varphi \rightarrow \varphi_i) \rightarrow ((\varphi \rightarrow (\varphi_i \rightarrow \varphi_k)) \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi_k))$ и деревьев E и D легко строится дерево вывода $\varphi \rightarrow \varphi_k$ из T .

Свойства непротиворечивых множеств

Множество формул T называется *противоречивым*, если из него выводима любая формула. В противном случае T называется *непротиворечивым*.

Свойства непротиворечивых множеств

Множество формул T называется *противоречивым*, если из него выводима любая формула. В противном случае T называется *непротиворечивым*.

1. T противоречиво тогда и только тогда, когда из него выводима хотя бы одна формула вида $\theta \wedge \neg\theta$.
2. Если множества формул T_n , $n \in \mathbb{N}$ непротиворечивы и $T_0 \subseteq T_1 \subseteq \dots$, то множество $\bigcup_n T_n$ непротиворечиво.
3. Если φ — предложение, T — множество формул и $T \cup \{\varphi\}$ противоречиво, то $T \vdash \neg\varphi$.
4. Если множество формул T непротиворечиво, то для любого предложения φ непротиворечиво хотя бы одно из множеств $T \cup \{\varphi\}$ и $T \cup \{\neg\varphi\}$.
5. Если множество предложений $S = T \cup \{\exists x \psi(x)\}$ непротиворечиво, то и множество $S \cup \{\psi(c)\}$ непротиворечиво для любого не входящего в формулы из S сигнатурного константного символа c .

Свойства теорий Хенкина

Множество предложений T называется *теорией Хенкина*, если T непротиворечиво, любое предложение или его отрицание выводимо из T , и для любого выводимого из T предложения вида $\exists x \psi(x)$ существует константный символ $c \in \sigma$ такой, что $T \vdash \psi(c)$.

Свойства теорий Хенкина

Множество предложений T называется *теорией Хенкина*, если T непротиворечиво, любое предложение или его отрицание выводимо из T , и для любого выводимого из T предложения вида $\exists x \psi(x)$ существует константный символ $c \in \sigma$ такой, что $T \vdash \psi(c)$.

1. $T \vdash \neg \varphi \iff T \not\vdash \varphi$.
2. $T \vdash (\varphi \vee \psi) \iff T \vdash \varphi$ или $T \vdash \psi$.
3. $T \vdash (\varphi \rightarrow \psi) \iff T \not\vdash \varphi$ или $T \vdash \psi$.
4. $T \vdash \exists x \theta(x) \iff T \vdash \theta(c)$ для некоторого $c \in \sigma$.
5. $T \vdash \forall x \theta(x) \iff T \vdash \theta(c)$ для любого $c \in \sigma$.
6. Любая непротиворечивая теория S конечной или счетной сигнатуры σ может быть расширена до теории Хенкина сигнатуры σ_C , где C — счетное множество новых константных символов.

Доказательство свойства 6

Множество всех предложений сигнатуры σ_C счетно, поэтому их можно расположить в последовательность $\varphi_n (n \in \mathbb{N})$. Определим по индукции последовательность множеств $T_n (n \in \mathbb{N})$ следующим образом: $T_0 = S$. Пусть T_n построено. Если множество $T_n \cup \{\varphi_n\}$ противоречиво, то полагаем $T_{n+1} = T_n \cup \{\neg\varphi_n\}$. Если $T_n \cup \{\varphi_n\}$ непротиворечиво и φ_n не имеет вид $\exists x\psi(x)$, то полагаем $T_{n+1} = T_n \cup \{\varphi_n\}$. Наконец, если $T_n \cup \{\varphi_n\}$ непротиворечиво и $\varphi_n = \exists x\psi(x)$, то полагаем $T_{n+1} = T_n \cup \{\varphi_n, \psi(c_k)\}$, где k — наименьшее число такое, что c_k не входит в формулы из T_n (в формулы из T_n входит лишь конечное число элементов C , поэтому такое k существует).

Легко проверить, что $\bigcup_n T_n$ — теория Хенкина, расширяющая S .

Основные результаты об $ИП_\sigma$

ТЕОРЕМА. Любое непротиворечивое множество предложений имеет модель.

Основные результаты об $ИП_\sigma$

ТЕОРЕМА. Любое непротиворечивое множество предложений имеет модель.

ТЕОРЕМА. Для любой сигнатуры σ :

σ -предложение φ выводимо $\iff \varphi$ общезначимо.

Более общо: $T \vdash \varphi \iff T \models \varphi$.

Основные результаты об $ИП_\sigma$

ТЕОРЕМА. Любое непротиворечивое множество предложений имеет модель.

ТЕОРЕМА. Для любой сигнатуры σ :

σ -предложение φ выводимо $\iff \varphi$ общезначимо.

Более общо: $T \vdash \varphi \iff T \models \varphi$.

СЛЕДСТВИЕ. Множество всех общезначимых предложений любой конечной сигнатуры перечислимо.

Более общо: Множество всех логических следствий любой перечислимой теории конечной сигнатуры перечислимо.

Доказательство

Пусть S — непротиворечивое множество предложений сигнатуры σ . Хотим показать, что S имеет модель. По теореме о компактности можем считать, что S конечна. Тогда в формулы S входит конечное подмножество символов сигнатуры σ , поэтому можно считать, что σ конечна. Тогда, по доказанному выше факту, существует теория Хенкина T сигнатуры σ_C , расширяющая S .

Доказательство

Пусть S — непротиворечивое множество предложений сигнатуры σ . Хотим показать, что S имеет модель. По теореме о компактности можем считать, что S конечна. Тогда в формулы S входит конечное подмножество символов сигнатуры σ , поэтому можно считать, что σ конечна. Тогда, по доказанному выше факту, существует теория Хенкина T сигнатуры σ_C , расширяющая S .

Пусть M — множество всех термов сигнатуры σ_C , не содержащих переменных (то есть это константы с “накрученными” на них функциональными символами). Введём на этом множестве отношение эквивалентности $s \sim t$, если $T \vdash s = t$. Из аксиом равенства вытекает, что: Если $s_1 \sim t_1, \dots, s_n \sim t_n$, и $T \vdash P(s_1, \dots, s_n)$, то $T \vdash P(t_1, \dots, t_n)$;
Если $s_1 \sim t_1, \dots, s_n \sim t_n$, то $f(s_1, \dots, s_n) \sim f(t_1, \dots, t_n)$

Доказательство

Определим σ_C -структуру $\mathbb{A} = (A, I)$: $A = M/\sim$, $c^I = [c]$,
 $f^I([t_1], \dots, [t_n]) = [f(t_1, \dots, t_n)]$,
 $P^I([t_1], \dots, [t_n]) \iff T \vdash P(t_1, \dots, t_n)$.

Доказательство

Определим σ_C -структуру $\mathbb{A} = (A, I)$: $A = M/\sim$, $c^I = [c]$,
 $f^I([t_1], \dots, [t_n]) = [f(t_1, \dots, t_n)]$,
 $P^I([t_1], \dots, [t_n]) \iff T \vdash P(t_1, \dots, t_n)$.

Индукцией по построению термов и формул проверяем, что:

Для любого терма $t = t(x_1, \dots, x_n)$ и любых $s_1, \dots, s_n \in M$ имеем $t^{\mathbb{A}}([s_1], \dots, [s_n]) = [t(s_1, \dots, s_n)]$;
Для любой формулы $g(x_1, \dots, x_n)$ и для $s_1, \dots, s_k \in M$ выполнено $\mathbb{A} \models \varphi([s_1], \dots, [s_k]) \iff T \vdash \varphi(s_1, \dots, s_k)$.

Доказательство

Определим σ_C -структуру $\mathbb{A} = (A, I)$: $A = M/\sim$, $c^I = [c]$,
 $f^I([t_1], \dots, [t_n]) = [f(t_1, \dots, t_n)]$,
 $P^I([t_1], \dots, [t_n]) \iff T \vdash P(t_1, \dots, t_n)$.

Индукцией по построению термов и формул проверяем, что:

Для любого терма $t = t(x_1, \dots, x_n)$ и любых $s_1, \dots, s_n \in M$ имеем $t^{\mathbb{A}}([s_1], \dots, [s_n]) = [t(s_1, \dots, s_n)]$;
Для любой формулы $g(x_1, \dots, x_n)$ и для $s_1, \dots, s_k \in M$ выполнено $\mathbb{A} \models \varphi([s_1], \dots, [s_k]) \iff T \vdash \varphi(s_1, \dots, s_k)$.

Из последнего свойства вытекает, что \mathbb{A} является моделью множества T , а значит и множества S .

Разрешимость и неразрешимость

Рассматриваем только теории конечной сигнатуры. Такая теория T называется разрешимой, если существует алгоритм, который по любому предложению φ определяет, следует ли φ из T .

Разрешимость и неразрешимость

Рассматриваем только теории конечной сигнатуры. Такая теория T называется разрешимой, если существует алгоритм, который по любому предложению φ определяет, следует ли φ из T .

ТЕОРЕМА. Множество всех логических следствий любой перечислимой полной теории конечной сигнатуры разрешимо.

Разрешимость и неразрешимость

Рассматриваем только теории конечной сигнатуры. Такая теория T называется разрешимой, если существует алгоритм, который по любому предложению φ определяет, следует ли φ из T .

ТЕОРЕМА. Множество всех логических следствий любой перечислимой полной теории конечной сигнатуры разрешимо.

СЛЕДСТВИЕ. Теория поля вещественных чисел, теория поля комплексных чисел, и теория порядка на рациональных числах разрешимы.

Разрешимость и неразрешимость

Рассматриваем только теории конечной сигнатуры. Такая теория T называется разрешимой, если существует алгоритм, который по любому предложению φ определяет, следует ли φ из T .

ТЕОРЕМА. Множество всех логических следствий любой перечислимой полной теории конечной сигнатуры разрешимо.

СЛЕДСТВИЕ. Теория поля вещественных чисел, теория поля комплексных чисел, и теория порядка на рациональных числах разрешимы.

К сожалению, большинство интересных математических теорий (в частности, логика предикатов достаточно богатой сигнатуры, а также теории сложения и умножения на натуральных, целых, и рациональных числах) неразрешимы. Но это уже совсем другая история...