

Задание 6. Ординалы. Применения аксиомы выбора.

1. Докажите, что: любой элемент ординала есть ординал;  
любой ординал совпадает с множеством всех меньших ординалов;  
 $(\alpha; \in) \simeq (\beta; \in) \iff \alpha = \beta$ .
2. Докажите, что: любые два ординала сравнимы по отношению  $<$ ;  
 $\alpha \subseteq \beta \iff \alpha \leq \beta$ ;  
 $\alpha + 1 = \alpha \cup \{\alpha\}$  есть наименьший ординал, больший  $\alpha$ .
3. Докажите, что любой частичный порядок на произвольном множестве содержится в некотором линейном порядке на этом множестве. Можно ли в этом утверждении заменить “линейном” на “фундированном линейном”?
4. Множество векторов в вещественном векторном пространстве называется линейно независимым, если любое его конечное подмножество линейно независимо. Базисом векторного пространства называется линейно независимое множество  $B$  векторов такое, что любой вектор можно представить конечной линейной комбинацией векторов из  $B$ . Докажите, что любое линейно независимое множество векторов содержится в некотором базисе.
5. Декартовым произведением семейства множеств  $\{A_i\}_{i \in I}$  называется множество  $\{f : I \rightarrow \bigcup_i A_i \mid \forall i \in I (f(i) \in A_i)\}$ . Докажите, что декартово произведение любого семейства непустых множеств непусто.