
A
S
F−N
F−FH
F−MR
X
IV
rrnL nad1 nad4 cox1 cob rrnS nad4l nad2 atp8 atp6
nad5 nad3 nad6 cox2 cox3
nad4l atp8 atp6 rrnL nad1 nad4 cox1 cob nad2
rrnS nad5 nad3 nad6 cox2 cox3
rrnL nad1 nad4 cox1 cob nad4l atp8 atp6 nad2
nad5 nad3 nad6 cox2 cox3*
rrnL nad1 nad4 cox1 cob nad2 nad4l atp8 atp6
nad5 nad3 nad6 cox2 cox3
rrnL nad1 nad4 cox1 cob nad4l nad2 atp8 atp6*
nad5 nad3 nad6 cox2 cox3
nad4l nad2 atp8 atp6* nad1 nad4 cox1 cob
cox3 nad5 nad3 nad6 cox2
0 5 10 15 20
Position (kb; contigs in S order, gaps between boxes not to scale)
Complex I (nad)
Complex III (cob)
Complex IV (cox)
ATP synthase (atp)
rRNA
Contig
Scaffold (contigs joined by read pairs)
B
nad1 56 52 29 63 49 35 13
nad2 81 73 35 111 76 65 21
nad3 23 23 10 22 15 12 4
nad4 108 97 58 112 79 76 29
nad4l 21 21 7 28 19 23 12
nad5 114 123 66 133 86 106 40
nad6 30 37 19 32 28 30 5
cob 32 26 13 31 23 20 11
cox1 7 12 2 13 4 10 9
cox2 19 22 11 26 14 23 11
cox3 22 11 8 17 14 8 2
atp6 19 22 7 34 29 19 9
atp8 19 19 5 20 18 15 4
X−S X−IV X−F S−IV S−F IV−F
Unique to IV
% of aligned positions differing
30
20
10