《家规试卷》10 岁（小学四年级）· 难题试卷

> 依据《生活规范以及指导家规》编写，作者一己之见仅供参考

本试卷共（10）道题，每道题（10）分，总分是（100）
考试时间：90 分钟
适用阶段：小学四年级
难度：★★★

（1）计算题（数学应用题）

1、假设中国一年出栏 1 亿头猪，一头猪 4 条腿，中国有 14 亿人口。
（1）这一年能产出多少亿条猪腿?
（2）平均每个中国人一年只能分到不到几分之几条猪腿?
（3）若一个人一年内吃了 20 条猪腿，他至少吃掉了多少个人这一年的猪腿份额？（列式计算）

2、水的重量：500ml 水重 1 斤，1L 水重 2 斤，桶装水 18L 重 36 斤。
（1）一瓶 1.5L 的矿泉水重多少斤?
（2）小明家买了 2 桶 18L 的桶装水，一共重多少斤?
（3）知道了水的重量以后，说说为什么搬运饮料、矿泉水非常耗费体力。

（2）材料分析题

3、阅读下列材料，回答问题。

材料：2012 年 5 月 20 日下午，湖南省邵阳隆回二中多名学生出现了呕吐、头晕等食物中毒现象，先后有一百多名学生被送往附近医院，而这些学生几乎都在校门口一家流动摊贩手上买过凉皮。经隆回县疾控中心检测，导致食物中毒的原因系亚硝酸盐——摊贩误把化学品”亚硝酸钠”当成味精加入了凉皮。最终确诊 85 人中毒，其中一人死亡，两名摊贩被法院判刑。

（1）这起中毒事件发生在哪一年、哪一月、哪一日?
（2）最终确诊中毒的有多少人?
（3）摊贩误把什么化学品当成了味精?
（4）这个案例告诉我们，为什么不能随便吃校门口的低价美食和流动摊贩的食物?

（3）选择题

4、关于砂锅，下列说法正确的是哪一项？（ ）
A、砂锅很厚很厚，食物降温速度很慢、温度很高，每餐都吃砂锅会严重伤害肠胃
B、砂锅里的食物是凉的
C、砂锅可以天天吃、餐餐吃
D、吃砂锅可以狼吞虎咽

邹九1069679911@qq

5、住酒店的时候，原书建议床铺可以用什么遮起来，防止针孔摄像头偷拍？（）
A、透明的纱巾
B、不透明的便携蚊帐
C、一张报纸
D、不用遮

（4）填空题

6、高温消毒：沸水煮_**分**⊠～_分钟左右，用沸水浸泡 10 分钟也行，可以灭除大部分常见的细菌真菌和孢子。

7、喝水不推荐一次性短时间内喝大量的水，一般陶瓷杯 250ml 左右，所以通常的话每次喝_ml～_ml 比较好。

（5）判断题（对的画 √，错的画 ×）

8、吃饭最好不要吃饱不要吃撑，吃到七八分饱就行了，吃太饱会把还没消化吸收完的食物提前挤出去，浪费食物。（）

（6）英语翻译题

9、将下列英语译成汉语：Don’ t take food from strangers.

（7）简答题

10、吃饭前喝杯常温水，或者吃饭前喝碗常温汤，有什么好处？

参考答案与解析

1）（1）1 亿头 ×4 条=4 亿条猪腿。（2）不到 1/3（三分之一）条。（3）20÷（1/3）=60，至少吃掉了 60 个人这一年的猪腿份额。
解析：一年只有 4 亿条猪腿，但是中国有 14 亿人口，每个人只能分到不到 1/3 条猪腿，一个人吃多了，其他某些人就没有猪腿吃了。

补充：原书用具体数据说明资源有限性：1 亿头猪 × 4 条腿 = 4 亿条猪腿，14 亿人每人不到 1/3 条，20 条猪腿就吃掉了 60 个人的份额（见原书【6.1 论资源的有限性】）

2）（1）1.5L×2 斤=3 斤。（2）36 斤 ×2=72 斤。（3）水很重，饮料、矿泉水基本都是水，500ml 的矿泉水就有 1 斤，桶装水 18L 就有 36 斤，搬运它们非常耗费体力、很费人的腰椎，所以要少喝饮料、少喝矿泉水，多喝直饮水或者常温的白开水。
解析：见原书关于水的重量的计算。

邹九1069679911@qq

补充：20 个工人干 13 个小时才产出 1000 支牙刷——超市里的每一件商品背后都凝结着大量工人的劳动时间，少买东西就是少占用他人的劳动时间（见原书【7.2 超市以及玩耍】）

3）（1）2012 年 5 月 20 日。（2）确诊中毒 85 人。（3）亚硝酸钠。（4）答：餐饮行业的食物加工要想添加一些额外的成分还是可以做到的，低价美食很危险；流动摊贩可能像案例中一样误放亚硝酸钠等危险化学品，所以我们应该注意饮食，少吃低价美食、少吃流动摊贩的食物。
解析：案例为 2012 年隆回二中学生中毒案。（见原书【8.2 注意饮食少吃低价美食】、【8.5 麻辣菜凉拌菜流动美食摊】）

4）A
解析：砂锅很厚很厚，食物降温的速度很慢，食物的温度很高，若是每餐都吃砂锅，高温烫伤，肠胃会受到严重的伤害，算是慢性自杀了；对于经常吃砂锅的人来讲，狼吞虎咽莫过于慢性自杀。

补充：超过 65℃ 的热饮被 WHO/IARC 列为 2A 类致癌物；作者自述因喝滚烫汤水拉血、马桶血红；吃饭吃水之前先放凉，可用筷子戳洞、水盆冷却、双层水冷碗加速降温（见原书【1.1 不要吃太烫的食物不喝太烫的水 · 砂锅】）

5）B
解析：酒店、厕所、浴室等都有可能存在针眼摄像头，个人觉得酒店的床铺可以用不透明的蚊帐遮起来，或者入住者自己带不透明的便携蚊帐。（见原书【6.3 提防排查隐蔽的摄像头】）

6）10；30
解析：沸水煮 10 分钟～30 分钟左右，用沸水浸泡 10 分钟也行，或者 60 摄氏度～80 摄氏度高温水浸泡 30 分钟～1 小时左右，可以灭除大部分常见的细菌真菌和孢子。

补充：高温也是有效的消毒方法——沸水煮 10 到 30 分钟就能杀灭大部分病菌；人离开厨房必须断电断火，避免烧干火灾（见原书【5.2 高温】）

7）100；200
解析：不推荐一次性短时间内喝大量的水，多次拿起水杯喝水又有分散注意力的可能，所以每次的水量也别太少，一般陶瓷杯 250ml 左右，所以通常的话 100ml～200ml。（见原书【11.6.4 什么时候喝水】）

8）√
解析：胃和肠道只能装下一定容量的食物，吃的太多太饱，会将没有完全消化吸收的食物提前排出体外，存在浪费食物的嫌疑，最好还是少吃点，最好不要吃饱不要吃撑，最好吃到七八分饱就行了。

补充：超过 65℃ 的热饮被 WHO/IARC 列为 2A 类致癌物；作者自述因喝滚烫汤水拉血、马桶血红；吃饭吃水之前先放凉，可用筷子戳洞、水盆冷却、双层水冷碗加速降温（见原书【1.12 屎臭的部分原因】）

9）不要接受陌生人给的食物。（也可译为：不要拿陌生人给的食物。）
解析：陌生人给的食物不要吃，陌生人给的饮料、水等不要喝。

补充：还要警惕无牌照车辆（远离、不坐）、不要替陌生人带路（就说不知道）、警惕免费机票/免费旅游/超低价兼职等低价诱惑（都是骗人的）（见原书【6.2 不要占便宜】）

邬力100679911@qq

10）答：吃饭前喝杯常温水或者喝碗常温汤，可以更加充分地吸收上顿饭的营养物质，甚至上上顿饭的营养物质，避免当前这顿饭将水挡住，不能渗透到远处肠道中的便便内部；也可以防止吃饭以后口渴了喝水，稀释了胃酸，降低消化的效果，减弱胃酸杀菌的效果。

补充：饭前喝水会稀释胃酸影响消化，所以饭前饭后半小时避免大量喝水；肠道菌群和放屁有关，屁多、放屁臭可能和饮食结构有关（见原书【11.6.4 什么时候喝水】）

邹九1069679911@qq