Physic formulary

School

2022.02.10

Contents

1 Constants

Bohr radius	a_0	$=$	$\frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{m_e e^2} = \frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m_e e^2} = \frac{\hbar}{m_e c\alpha} = 5.291\,772\,109\,03 \times 10^{-11}\,\mathrm{m}$
Velocity of light:	c_0	$=$	$299\,792\,458\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$
Elementary charge:	e	$=$	$1.602\,176\,634 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$
Vacuum permittivity:	ε_0	$=$	$8.854\,187\,812\,8 \times 10^{-12}\,\frac{\mathrm{F}}{\mathrm{m}}$
Permittivity of air:	ε_r	$=$	$1.000\,59$
Faraday constant	F	$=$	$96\,485.332\,123\,3\,\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{mol}}$
Acceleration due to gravity:	g	$=$	$9.806\,65\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
Gravitational constant:	G	$=$	$6.674\,30 \times 10^{-11}\,\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{kg\,s}^2}$
Planck constant:	h	$=$	$6.626\,070\,15 \times 10^{-34}\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{Hz}}$
Boltzmann constant:	k	$=$	$1.280\,649 \times 10^{-23}\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$
Electron mass:	m_e	$=$	$9.109\,383\,701\,5 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$
	m_e	$=$	$0.510\,998\,950\,00\,\frac{\mathrm{MeV}}{{c_0}^2}$
Muon mass:	m_μ	$=$	$1.883\,531\,627 \times 10^{-28}\,\mathrm{kg}$
	m_μ	$=$	$105.658\,375\,5\,\frac{\mathrm{MeV}}{{c_0}^2}$
	m_μ	$=$	$0.113\,428\,925\,9\,\mathrm{Da}$
Neutron mass:	m_n	$=$	$1.674\,927\,498\,04 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$
	m_n	$=$	$939.565\,420\,52\,\frac{\mathrm{MeV}}{{c_0}^2}$
Proton mass:	m_p	$=$	$1.672\,621\,923\,69 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$
	m_p	$=$	$938.272\,088\,16\,\frac{\mathrm{MeV}}{{c_0}^2}$
Vacuum permeability:	μ_0	$=$	$1.256\,637\,062\,12 \times 10^{-6}\,\frac{\mathrm{H}}{\mathrm{m}}$
Permeability of air:	μ_r	$=$	$1.000\,000\,37$

2 Other physical interrelationships

Visible spectrum:	$380\,\mathrm{nm}$ to $750\,\mathrm{nm}$	
Speed of sound under standart conditions:	$343\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$	
Dalton Da / unified atomic mass unit u:	$\mathrm{Da/u}$	$= 1.660\,539\,066\,60 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$
Hydrogen mass:	m_{H}	$= 1.007\,84\,\mathrm{Da}$ to $1.008\,11\,\mathrm{Da}$
Atomic mass of helium $^4\mathrm{He}$	m_{He}	$= 4.002\,603\,254\,\mathrm{Da}$
Alternate energy units:	$\mathrm{kW\,h}$	$= 3.6 \times 10^6\,\mathrm{J}$
	eV	$= 1.602\,176\,634 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$
Pressure:	$1\,\mathrm{Pa}$	$= 1\,\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2}$
	$1\,\mathrm{bar}$	$= 10^5\,\mathrm{Pa}$
Absolute zero:	$-273.15\,^\circ\mathrm{C}$	$= 0\,\mathrm{K}$

3 Energy

Kinetic Energy
$E_{\mathrm{k}} = \frac{1}{2}mv^2$

Potential Energy	
$U = mgh$	(gravitational)
$U = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$	(elastic)
$U = \frac{1}{2} \cdot C \cdot V^2$	(electric)
$U = -mB$	(magnetic)
$U = \int F(r)\, dr$	(general)

4 Motion

uniform linear motion
$s(t) = vt\ (+s_0)$
$v(t) = const.$
$a(t) = 0$

non-uniform linear motion
$s(t) = \frac{1}{2}at^2\,(+v_0\,t + s_0)$
$v(t) = at\ (+v_0)$
$a(t) = const.$

Circular motion	
$F_{\mathrm{z}} = \frac{mv^2}{r} = m\,\omega^2 r$	
$\omega = \frac{v}{r} = \frac{2\pi}{T} = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$	φ in rad
$f = \frac{1}{T}$	

5 Momentum

momentum itself	
$\vec{p} = m\vec{v}$	
$\vec{p} = \frac{\hbar}{\lambda}$	photons
$\vec{p} = \sqrt{m_0^2 c_0{}^2 + \frac{E^2}{c_0{}^2}}$	general

relations to momentum	
$\sum_i m_i\, u_i = \sum_i m_i\, v_i$	conservation of momentum
$\Delta p = F \Delta t$	
$E_\mathrm{k} = \int p\, dv$	

6 Electricity

General	
$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{\partial Q}{\partial t} = \dot{Q}$	in A
$R = \frac{U}{I} = \rho \frac{l}{A}$	in Ω
$E = U \cdot Q$	
$P = \frac{\Delta E}{\Delta t} = UI$	in W Energy flow / "Power"

7 Fields

7.1 Newtonian gravitation

Homogeneous field	
$E = mgh$	
$\vec{F_g} = m\vec{g}$	
$\vec{g} = \frac{\vec{F_g}}{m}$	
$\Delta\varphi = \frac{E}{m} = gh$	

Radial symmetric field	
$U = GMm\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$	
$U = -GMm\frac{1}{r}$	for $r_1 \to \infty$
$\vec{F_g} = -G\frac{Mm}{r^2}\hat{r}$	
$\vec{g} = \frac{\vec{F_g}}{m} = -G\frac{M}{r_2}\hat{r}$	
$\Delta\varphi = \frac{E}{m} = \gamma M\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$	

7.2 Electromagnetism

homogenous field	
$E = q\vec{\mathbf{E}}d$	
$\vec{F} = q\vec{\mathbf{E}}$	
$\vec{\mathbf{E}} = \frac{\vec{F}}{q}$	
$\mathbf{E} = \frac{U}{d}$	
$V = \frac{E}{q} = \vec{\mathbf{E}}d$	

Radial symetric field	
$U = -\frac{1}{4\pi\varepsilon}Qq\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$	
$U = \frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r}$	for $r_1 \to \infty$
$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Qq}{r^2}\hat{r}$	
$\varepsilon_0 = \frac{\sigma}{\mathbf{E}}$	const.

Index

Bibliography

1. CODATA Internationally recommended 2018 values of the Fundamental Physical Constants. May 2019. https://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html (2022).