
Analysis I

Contents

I. Irgendwas	5
1. Natürliche Zahlen und elemntare Begriffe	6
1.1. Zahlbereiche	6
1.2. Vollständige Induktion	7
1.2.1. Characterisierung der natürlichen Zahlen	9
2. Körper	12
2.1. Was sind Strukturen?	12
2.2. Körper	12
2.3. Angeordnete Körper	13
2.4. Der Betrag	14
2.5. Das Archimedische Axiom	15
2.6. Supremum, Infimum und die Supremumseigenschaft	15
3. Folgen und Konvergenz	17
3.1. Reele Folgen und Konvergenz	17
3.2. Rechenregeln für Grenzwerte	18
3.3. Stabilität der ' \leq '-Relation unter Limesbildung	20
3.4. Monotone Konvergenz, e und Wurzeln	20
3.5. Einige Grenzwerte - alt und neu	23
4. Vollständigkeit	25
4.1. ???	25
4.2. Teilfolgen undn der Satz von Bolzano-Weierstraß	26
4.3. Charakterisierung der Vollständigkeit	27
5. Reihen und deren Konvergenz	30
5.1. Reihen, Konvergenz und absolute Konvergenz	30
5.2. Konvergenzkriterien	32
5.3. Umordnung von Reihen	40
II. Funktionen und Stetigkeit	42
6. Elementare topologische Konzepte in \mathbb{R}	43
6.1. Offene und abgeschlossene Mengen	43
6.2. Kompaktheit	45
6.3. Dichtheit, \mathbb{Q} und \mathbb{R}	46

Organisation, Tipps & Tricks und Literaturhinweise

Mathe...

- ist intellektuell extrem herausfordernd
- kommt mit einem hohen Arbeitsaufwand
- oft falschen Erwartungen und
- ist wie Ausdauersport

aber dafür ist Mathe eines der schönsten Studien c:

Generelles Zeitmanagement:

- Vor- und Nachbereitung wahrscheinlich mehr als die gesetzten $14 \times 3 \text{ h} = 4.2 \cdot 10^1 \text{ h}$
- Klausurvorbereitung auch mehr als $3.9 \cdot 10^1 \text{ h}$
- Pro Woche $2 \times 1.5 \text{ h}$, $2 \times 2 \text{ h}$, 1.5 h , $1.0 \cdot 10^1 \text{ h}$
- Es gibt immer eine Aufgabe die man nicht lösen kann
- In die Vorlesungen kommen

Vorlesung:

- normal nicht alles zu verstehen
- Notizen was man nicht versteht
- Punkte konzise angehen
- **Mathe muss sich gedanklich setzen** - genügend Zeit zu verarbeiten

Übungen:

- zeitintensiv
- Ergebnisse vernünftig aufschreiben
- Weg zu einer korrekter Lösung ist sehr langwierig
- **nicht 10 Blätter Papier ab, von denen 9.5 inkonklusiv sind**
- also schön Aufschreiben

Wenn wir einen Satz gezeigt bekommen, dann bekommen wir nicht die gescheiterten Jahrelangen Versuche zur Schau, sondern nur die Ausgearbeitete Lösung → also bei uns auch langer weg, aber Aufschreiben nur klein

Übungszettel:

- 50% muss richtig sein
- bis Freitag 10:00 Uhr
- in F4
- diese Woche nicht so umfangreich, weil weniger Zeit
- auf ILIAS Terminfindung Abstimmung
- Donnerstag Einteilung in Tutorien
- Blätter tackern :c
- alle zwei Wochen Beweismechanik Aufgaben, nur digital nicht in Papier (ist dann die letzte Aufgabe)

Literaturempfehlung:

- Otto Forster: Analysis 1
 - kurz und knapp - aber konzise, und das hilft
 - ähnliche Struktur wie Vorlesung
 - weig motivation und wenige Querverbindungen
- Königsberger: Analysis 1
 - kurz - aber konzise
 - alle themen der Vorlesung, andere Struktur
 - mehr motivation und Querverbindungen
- Klaus Fritsche: Grundkurs Analysis 1
 - ausführlich
- Daniel Grieser: Analysis I
 - Ausführlich, aber mit Fokus auf das Wesentliche
 - alle Themen der Volesung enthalten, ähnliche Struktur
 - bunt??
- Harro Huser: Lehrbuch der Analysis Teil 1

-
- extrem ausführlich, dick, an einigen Stellen sehr extensiv
 - alle und mehr Themen als Vorlesung
 - Querverbindungen
 - Walter Rudin: Analysis
 - sehr knapp und elegant
 - klassiker
 - alle Themen der Vorlesung, leicht andere Struktur
 - empfehlenswertes Buch fortgeschrittene Leser*innen
 - nicht für Anfänger*innen
 - Herber amann, Joachim Escher: Analysis I
 - strikt logischer Aufbau, damit teils länglich. Großes Bild
 - alle Themen, andere Struktur
 - auch nicht für Anfänger*innen
 - Terence Tao: Analysis (englisch, aber gut)
 - Rober Denk, Reinhard Racke: Kompendium der Analysis
 - kurz und knapp, teils wie Nachschlagewerk
 - alle Themen
 - Florian Modler, Martin Kreh: Tutorium Analysis 1 und Lineare Algebra 1
 - kurz und knapp, teils wie Nachschlagewerk
 - von Studierenden für Studierende
 - aber enthält ein paar Fehler

Part I.

Irgendwas

1 Natürliche Zahlen und elemntare Begriffe

1.1 Zahlbereiche

$$\mathbb{N} := \{1, 2, 3, \dots\}$$

$$\mathbb{N}_0 := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

$$\mathbb{Z} := \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

$$\mathbb{Q} := \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N} \right\}$$

$$\mathbb{R} := \{ \text{reelle Zahlen} \}$$

Wir besprechen gar nicht was eine Menge ist, das ist zu philosophisch
Es ist schwierig Mengen zu Definieren, man kommt schnell auf logische Widersprüche

- Notation: für x schreiben wir für eine Eigenschaft A “ $A(x)$ ”, falls x A erfüllt.

→ Menge aller Objekte x mit $A(x)$

$$\{x : A(x)\}$$

→ gibt es kein x mit $A(x)$, so nennen wir die Menge leer, “ \emptyset ”

- $\exists \hat{=}$ Existenzquantor, “es existiert”
- A, B , Eig., $M := \{x : x \text{ erf. } A\}$
 $N := \{x : \text{erf. } B\}$
 $M \subset N$, falls $\forall x \in M : x \in N$
- $M = N$, falls $M \subset N \vee N \subset M$
- “Echte Teilmenge”: $M \subsetneq N$, falls $M \subset N, N \neq M$.

Example 1.1.1 (gerade Zahlen)

$$n \in \mathbb{N}_0 \text{ gerade} : \iff (\exists k \in \mathbb{N}_0 : n = 2k)$$

$$M := \{n \in \mathbb{N}_0 : \exists k \in \mathbb{N}_0 : n = 2k\} \tag{1}$$

$$= \{2k : k \in \mathbb{N}_0\} \tag{2}$$

Example 1.1 $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{N}_0 \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$

Zu $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R} : \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Widerspruchsbeweis: Ang., $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$, so $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, mit $p \in \mathbb{N}_0, q \in \mathbb{N}$.
 $(\exists p, q \text{ teilerfremd (d.h. Bruch ist vollständig gekürzt)})$. Also $p^2 = 2q^2$
 $\implies p$ ist gerade. Also $p = 2l$ mit $l \in \mathbb{N}_0$.
 $\implies 4l^2 = p^2 = 2q^2 \implies 2l^2 = q^2 \implies q$ gerade.
 $\implies p, q$ gerade. $\implies p, q$ nicht teilerfremd. ■

1.2 Vollständige Induktion

- Ziel: Beweis von Aussagen für alle $n \in \mathbb{N}_0$

Dominoprinzip: Wenn alle Steine umfallen sollen,

- müssen wir den 1. Stein umwerfen,
- muss stets der n -te Stein den $(n+1)$ -ten umwerfen.

Prinzip (vollst. Ind.) Wollen wir eine Aussage $A(n) \forall n \in \mathbb{N}$ zeigen; so zeigen wir

- (i) $A(1)$ gilt (Induktionsanfang)
- (ii) Aus $A(n)$ für $n \in \mathbb{N}$ stets $A(n+1)$ folgt. (Induktionsschritt)

Definition 1.2 Summen

Für $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ definieren wir

$$\sum_{k=1}^n x_k := x_1 + \dots + x_n$$

Example 1.3 Geometrische Summe

$\forall n \in \mathbb{N} :$

$$\underbrace{\sum_{k=0}^n x^k}_{x^0 + x^1 + \dots + x^n} = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} \quad (3)$$

I.A. $n = 1$

$$\sum_{k=0}^1 x^k = x^0 + x^1 = 1 + x = \frac{(1-x)(1+x)}{1-x} = \frac{1-x^2}{1-x}$$

I.S.

$$n \rightarrow n+1$$

Angenommen, (equation) gilt für ein $n \in \mathbb{N}$. z.z. (equation) gilt für $n+1$

$$\sum_{k=0}^{n+1} x^k = \left(\sum_{k=0}^n x^k \right) + x^{n+1} = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} + x^{n+1}$$

...

Example 1.4 Für welche $n \in \mathbb{N}$ gilt $n^2 < 2^n$?

- $n = 1 \rightarrow 1 < 2$
- $n = 2 \rightarrow n^2 = 4 \not< 4 = 2^2$
- $n = 3 \rightarrow n^2 = 9 \not< 2^3$
- $n = 4 \rightarrow n^2 = 16 \not< 16 = 2^4$
- $n = 5 \rightarrow n^2 = 25 < 32 = 2^5$

Wir versuchen die Aussage $\forall n \geq 5$ zu zeigen.

I.A.: $n = 5 : n^2 = 25 < 32 = 2^5$

I.S.: Ang., Aussage gilt für $n \geq 5$. Wir müssen zeigen:

$$(n+1)^2 < 2^{n+1}$$

$$(n+1)^2 = \underbrace{n^2}_{< 2^n} + 2n + 1 < 2^n + 2n + 1 \stackrel{?}{<} 2^{n+1} \text{ Angenommen, es gilt}$$

$$\forall n \geq 5 : 2n + 1 < 2^n \quad (4)$$

Dann: $(n+1)^2 < \dots < 2^n + 2n + 1 = 2 * 2^n = 2^{n+1}$

- Wir zeigen (4) wiederum mit voll. Ind.

I.A.: $n = 5 : 2n + 1 = 11 < 32 = 2^5$

I.S.: Ang., (4) gilt für $n \in \mathbb{N}$. Dann gilt: $2(n+1) + 1 = 2n + 3 = (2n + 1) + 2 < 2^n + 2 < 2^n + 2^n = 2 * 2^n = 2^{n+1}$.

Damit folgt (4 und damit die eigentliche Aussage ■

Definition 1.5

für $n \in \mathbb{N}_0$ definieren wir die *Fakultät* via $n! := n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1$, falls $n \geq 1$, und $0! := 1$. Für $k \in \{0, \dots, n\}$ definieren wir den *Binomialkoeffizienten*

$$\binom{n}{k} := \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Lemma 1.6

Für alle $n \in \mathbb{N}$ und alle $k \in \{1, \dots, n\}$:

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$$

Proof

$$\begin{aligned} \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} &= \frac{n! \binom{n-k+1}{k}}{k!(n-k)!(n-k+1)} + \frac{n! \binom{k}{k-1}}{(k-1)!(n-(k-1)k)!(k)} \\ &= \frac{n!n + n!}{k!(n-k+1)!} = \frac{n!(n+1)}{k!(n-k+1)!} \end{aligned} \quad \blacksquare$$

Example 1.7 (Binomische Formel)

Für $x, y \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}_0$:

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$

Sei also $x, y \in \mathbb{R}$.

I.A.: $n = 0$. $(x + y)^0 = 1 = \binom{0}{0} x^0 y^0$

I.S.: Gelte die Aussage für $n \in \mathbb{N}_0$

$$(x + y)^{n+1} = (x + y)(x + y)^n = (x + y) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k} \quad (5)$$

$$= x \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k} + y \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k} \quad (6)$$

$$= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{k+1} y^{n-k} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n+1-k} \quad (7)$$

Indexverschiebung: $l = k + 1$. $l \in \{1, \dots, n + 1\}$

$$\begin{aligned} (7) &= \underbrace{\sum_{l=1}^n \binom{n}{l-1} x^l y^{n+1-l}}_{\text{Hier Indexverschiebung}} + \underbrace{\sum_{l=0}^n \binom{n}{l} x^l y^{n+1-l}}_{\text{Hier nennen wir einfach } k = l} \\ &= \binom{n}{n} x^{n+1} y^0 + \left(\sum_{k=0}^n \left(\binom{n}{l-1} + \binom{n}{l} \right) x^l y^{n+1-l} \right) + \binom{n}{0} x^0 y^{n+1} \\ &= \binom{n+1}{n+1} x^{n+1} y^0 + \left(\sum_{l=1}^n \binom{n+1}{l} x^l y^{(n+1)-l} \right) + \binom{n+1}{0} x^0 y^{n+1} \\ &= \sum_{l=0}^{n+1} \binom{n+1}{l} x^l y^{(n+1)-l} \quad \blacksquare \end{aligned}$$

1.2.1. Charakterisierung der natürlichen Zahlen**Definition 1.2.1**

Eine Teilmenge $M \subset \mathbb{R}$ heißt induktiv, falls

- (i) $1 \in M$
- (ii) $\forall x \in M : x + 1 \in M$

Example 1.2.2

- (a) \mathbb{N} sind ind. Menge.
- (b) $A := \{2n : n \in \mathbb{N}_0\}$ nicht ind. Menge, da (i) $1 \notin A$, (ii) $2n + 1$ ist immer ungerade
- (c) $B := \{2n + 1 : n \in \mathbb{N}_0\}$ nicht ind.: (i), aber $2n + 1 + 1 = 2(n + 1)$
- (d) $\mathbb{Q}^+ := \{x \in \mathbb{Q} : x > 0\}$ ist ind. Teilmenge

- Sei $(A_i)_{i \in I}$ mit I Indexmenge eine Familie von Mengen. setze

$$\bigcap_{i \in I} := \{x : (\forall i \in I : x \in A_i)\} \quad \text{Schnitt}$$

$$\bigcup_{i \in I} := \{x : (\exists i \in I : x \in A_i)\} \quad \text{Vereinigung}$$

Proposition 1.2.3

Für eine Menge $M \subset \mathbb{R}$ sind äquivalent

- (i) $M = \mathbb{N}$
- (ii) Ist $N \subset \mathbb{R}$ induktiv, so $M \subset N$
- (iii)

$$M = \bigcap_{N \subset \mathbb{R}} N \text{ induktiv}$$

$$(i) \iff (ii) \iff (iii)$$

Proof

‘(i) \implies (ii)’: Sei $N \subset \mathbb{R}$ beliebige ind. Teilmengen von \mathbb{R} . Zu zeigen: $M \stackrel{(i)}{=} \mathbb{N} \subset N$
 Aber $1 \in \mathbb{N}$, und $1 \in N$ (da N ind.), Da N ind. ist, ist mit jeder nat. $x \in \mathbb{N}$ also auch $x \in N$. Damit $x+1 \in \mathbb{N}$ $\mathbb{N} \subset N$.

‘(ii) \implies (iii)’ Wir zeigen:

$$\bigcap_{N \text{ ind. Menge}} N$$

ist ind. Menge

$$\stackrel{(ii)}{\implies} M \stackrel{(ii)}{\subset} N \subset M. \text{ Also}$$

$$M = \bigcap_{N \text{ ind.}} N.$$

$$\bigcap_{N \text{ ind.}} N \text{ induktiv:}$$

(i)

$$(\forall N \text{ ind.: } 1 \in N) \implies 1 \in \bigcap_{N \text{ ind.}} N$$

(ii)

$$\forall x \in \mathbb{R} : x \in \bigcap_{N \text{ ind.}} N \left(\implies x \in \bigcap_{N \text{ ind.}} N \right) \stackrel{\text{DEF.}}{\implies} \forall N \text{ ind. : } x+1 \in N \implies x+1 \in \bigcap_{N \text{ ind.}}$$

‘(iii) \implies (i)’ Noch zu zeigen (blöd glaube ich oder ÜA, wir hatten auf jeden Fall keine Zeit in der Vorlesung) ■

2 Körper

2.1 Was sind Strukturen?

2.2 Körper

Definition 2.2.1 Körper

in script of Prof. and on paper

Example 2.2.2

in script of Prof. and on paper

Example 2.2.3

in script of Prof. and on paper

Lemma 2.2.4

in script of Prof. and on paper

Lemma 2.2.5

in script of Prof. and on paper

\mathbb{Q}	\mathbb{R}	
\uparrow	\uparrow	Kontinuumshypothese
abzählbar	nicht abzählbar	

Definition 2.1

In der Situation von definition 2.2.1 sei $n \in \mathbb{N}$, sowie $x_1, \dots, x_n \in K$. Wir definieren rekursiv $x_1 + \dots + x_n := (x_1 + \dots + x_{n-1}) + x_n, x_1 \cdot \dots \cdot x_n := (x_1 \cdot \dots \cdot x_{n-1}) \cdot x_n$

Definition 2.2

In der Situation von Definition 2.2.1 sei $n \in \mathbb{N}_0$ und $x \in K$. Wir definieren

$$x^0 := 1_K \text{ und } x^n := (x^{n-1} \cdot x, n \in \mathbb{N}$$

Ist $x \in K \setminus \{0\}$, so sei für $n \in \mathbb{N} : x^{-n} := (x^{-1})^n$.

Lemma 2.3

Für alle $x, y \in K, m, n \in \mathbb{N}_0$:

- i) $x^n \cdot x^m = x^{n+m},$
- ii) $(x^n)^m = x^{n \cdot m},$
- iii) $x^n \cdot y^n = (x \cdot y)^n$

Ist zudem $x, y \neq 0_K$, so gelten diese Identitäten auch für $n, m \in \mathbb{Z}$

Proof i

Fixiere $n \in \mathbb{N}_0$, nun Induktion nach m .

$$\text{I.A. } m = 0. \quad x^n \cdot x^0 \stackrel{\text{Def.}}{=} x^n \cdot 1_K \stackrel{(\text{M2})}{=} 1_K \cdot x^n \stackrel{(\text{M3})}{=} x^n = x^{n+0}$$

I.S. Gelte die Aussage für ein $m \in \mathbb{N}_0$. Zeige für $m \curvearrowright m+1$

$$x^n \cdot x^{m+1} \stackrel{\text{Def.}}{=} x^n (x^m) \cdot x \stackrel{(\text{M1})}{=} (x^n \cdot x^m) \cdot x \stackrel{\text{IV}}{=} x^{n+m} \cdot x \stackrel{\text{Def.}}{=} x^{n+m+1} \quad \blacksquare$$

2.3 Angeordnete Körper

- Ziel Vergleich von Elementen hinsichtlich “Größe”

Definition 2.3.1

Eine **Relation** auf einer Menge M ist eine Teilmenge $R \subset M \times M$. Ist $(x, y) \in R$, so schreiben wir auch xRy oder $R(x, y)$ und sagen, dass x und y über R in Relation stehen.

Example 2.3.2

$M =$ Studierende im Hörsaal,
 $(x, y) \in M \times M : xRy : \iff x$ kennt den Namen von y

- **R reflexiv?** (d.h. $\forall x \in M : xRy$) Ja
- **R symmetrisch?** (d.h. $\forall x, y \in M : xRy \iff yRx$) Nein
- **R transitiv?** (d.h. $\forall x, y, z \in M : xRy \wedge yRx \implies xRz$) **Nein**

Definition 2.3.3

Sei R eine Relation auf einem Körper K . R heißt **Ordnung** auf K , falls gilt

- Trichotomie:** $\forall x \in K : \text{Entweder } 0_K Rx, xR0_K \text{ oder } x = 0_K$
- Abgeschlossenheit bezüglich Addition** $\forall x, y \in K : 0_K Rx, 0_K Ry \implies 0_K R(x + y)$
- Abgeschlossenheit bezüglich Multiplikation** $\forall x, y \in K : 0_K Rx, 0_K Ry \implies 0_K R(x \cdot y)$

Das Tupel (K, R) heißt **angeordneter Körper**. (Schreibe auch ‘ $<$ ’ für R).

Setze für $a, b \in K$:

$$\begin{aligned} a < b &: \iff 0_K < (b - a) \\ a > b &: \iff b < a \\ a \leq b &: \iff a < b \vee a = b \\ b \geq a &: \iff a \leq b \end{aligned}$$

Lemma 2.3.4

Sei $(K, <)$ angeordneter Körper, $a, b, c \in K$

- (i) Entweder $a > b, a = b \vee a < b$.
- (ii) $a < b \wedge b < c \implies a < c$
- (iii) $(a > 0 \implies (-a) < 0) \wedge (a < 0 \implies (-a) > 0)$
- (iv) Gilt $a < b$, so ist

$$\begin{aligned} ac &< bc, & c > 0 \\ ac &> bc, & c < 0 \\ a^2 &> 0, & a \neq 0 \end{aligned}$$

$$a > 0 \implies a^{-1} > 0$$

$$a < 0 \implies a^{-1} < 0$$

$$b^{-1} < a^{-1}, \text{ falls } a > 0$$

$$a + c < b + c.$$

- (v) $a < b \implies (-a) > (-b)$

Proof (i)-(iii)

(i) Da $a < b \iff 0_K < b - a$, folgt das aus Trichotomie und Def. von ' $>$ '.

(ii) zu zeigen: $a < c$, d.h. $0_K < c - a$.

$$c - a = (c + 0_K) - a = \underbrace{(c - b)}_{>0} + \underbrace{(b - a)}_{>0} > 0, \text{ d.h. } a < c$$

(iii) $a > 0$. Angenommen, $(-a) > 0$. $\xRightarrow{\text{Abg. Add.}} 0_K = a + (-a) > 0_K \xRightarrow{\text{Trich.}} E$ Ist $-a = 0$, so $a = 0$, nach Trich. Wid. zu $a > 0$. Falls $a < 0$, analog. ■

Corollary 2.3.5

Es gibt keine Ordnung ' $<$ ' auf \mathbb{F}_2 , die \mathbb{F}_2 zu einem angeordneten Körper macht

Proof

Angenommen, ' $<$ ' sei Ordnung. Da $0_K \neq 1_K$, gilt entweder $0_K < 1_K$ oder $1_K < 0_K$ (nach Trich.). Falls $0_K < 1_K$. Dann $0_K = 1_K + 1_K$ damit $0_K = 1_K + 1_K > 0_K + 1 = 1_K$. Widerspruch für $1_K < 0_K$ argumentiere analog.

- PRINZIP: $\mathbb{R} \wedge \mathbb{Q}$ sind angeordnete Körper

2.4 Der Betrag

('Abstand zur Null')

Definition 2.4.1

Für $x \in \mathbb{R}$ definieren wir den Betrag $|x| := \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0 \end{cases}$

Lemma 2.4.2

Der in Def 2.4.1 eingeführte Betrag erfüllt

- (i) *forall* $x \in \mathbb{R} : |x| \geq 0$
- (ii) $|x| = 0 \iff x = 0$
- (iii) Multiplikativität: $\forall x, y \in \mathbb{R} : |x \cdot y| = |x| \cdot |y|$
- (iv) **Dreiecksungleichung:** $\forall x, y \in \mathbb{R} : |x + y| \leq |x| + |y|$
- (v) $\forall x \in \mathbb{R} : |-x| = |x|$
- (vi) $\forall x, y \in \mathbb{R} : y \neq 0 \implies \left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}$

2.5 Das Archimedische Axiom

PRINZIP-Arch. Axiom: $\forall x \in \mathbb{R}, x > 0 \exists n \in \mathbb{N} : x < n$

· · · · · $\left| \begin{array}{c} \cdot \\ x \end{array} \right| \cdot$
 $x \quad n$

- Das muss gefordert werden

2.6 Supremum, Infimum und die Supremumseigenschaft

- **Ziel:** Entscheidende Eigenschaft von \mathbb{R}

Definition 2.6.1

Eine nichtleere Teilmenge $A \subset \mathbb{R}$ heißt

- **nach oben beschränkt**, falls $\exists c \in \mathbb{R} \forall x \in A : x \leq c$. Ein solches c “obere Schranke”
- **nach unten beschränkt**, falls $\exists c \in \mathbb{R} \forall x \in A : c \leq x$ “untere Schranke”

Example 2.6.2

- $A = \mathbb{N}_0$ durch 0 nach unten, nach oben unbegrenzt
- $A = \{1, 2, \dots, 10\}$ durch 1 nach unten, und durch 10, 11, ... nach oben beschränkt

Definition 2.6.3

Sei $A \subset \mathbb{R}$ nichtleer

- (i) Ist A nach oben beschränkt, so heißt $s(=:\sup A)$ **Supremum** von A , falls s obere Schranke ist *und* **kleinste obere Schranke** ist d.h. $\forall c \in \mathbb{R} : c \text{ obere Schranke von } A \implies s \leq c$.
 Ist $s \in A$ Supremum von A , so heißt s **Maximum** von A .

- (ii) Ist A nach oben unbeschränkt, so sei $+\infty$ das Supremum von A .
- (iii) Ist A nach unten beschränkt, so nennen wir $s' \in \mathbb{R}$ **Infimum** von A , falls s' untere Schranke und für jede andere untere Schranke $d \in \mathbb{R}$ von A : $d \leq s'$. Ist $s' \in A$ Infimum, so heißt s' **Minimum** von A .
- (iv) Ist A nach unten unbeschränkt, so sei $-\infty$ das Infimum von A .

Schreibweise: $\sup(A), \max(A), \inf(A), \min(A)$.

Example 2.6.4

Für $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ sei $(a, b) := \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$
 Dann: $\sup((a, b)) = b \wedge \inf((a, b)) = a$.

- Obere Schranke: $\forall x \in (a, b) : x < b \implies b$ obere Schranke.
- Ist d andere obere Schranke, so $b \leq d$. Klar: $d > a$, also angenommen $a < d < b$.
 Dann $x := \frac{d+b}{2} \in (a, b), x > d \implies d$ keine obere Schranke \nexists
 Weiter $b \notin (a, b)$, also b Supremum, kein Maximum

PRINZIP (Supremumseigenschaft)

Jede nach oben beschränkte Menge $A \subset \mathbb{R}$ hat ein Supremum in \mathbb{R} **Informell:** $(1, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$ hat $\sup = \sqrt{2}$ (später). Aber $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, also gilt die Supremumseigenschaft für \mathbb{Q} nicht.

\mathbb{R} ist

- Körper
- angeordnete Körper
- bewerteter Körper
- Archimedisch angeordnete Körper
- **Supremumseigenschaft**

3 Folgen und Konvergenz

3.1 Reelle Folgen und Konvergenz

Folge $a : \mathbb{N} \ni n \mapsto a(n) \in \mathbb{R}$. Schreibweisen:

$$\left(\underbrace{a_n}_{(=a(n))} \right)_{n \in \mathbb{N}} \quad (n \text{ Laufindex}), (a_n)$$

Example 3.1.1

$a_n := 2n \rightarrow$ Folge der geraden Zahlen

$a_n := 2n + 1 \rightarrow$ Folge der ungeraden Zahlen

Definition 3.1.2 Konvergenz

Sei (a_n) eine Folge in \mathbb{R} ($(a_n) \subset \mathbb{R}$) und $a \in \mathbb{R}$. Wir sagen, dass (a_n) gegen a **konvergiert**, falls $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : |a_n - a| < \varepsilon$

Wir nennen a dann den **Grenzwert** oder **Limes** von (a_n) und schreiben

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n := a$$

Gibt es $a \in \mathbb{R}$ so, dass (a_n) gegen a konvergiert, so nennen wir (a_n) **konvergent**, andernfalls **divergent**.

Lemma 3.1.3

Sei $(a_n) \subset \mathbb{R}$ eine Folge, die gegen $a, b \in \mathbb{R}$ konvergiert. Dann $a = b$.

Proof

Sei $\varepsilon > 0$ bel.. Dann

$$\begin{aligned} \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2} \wedge |a_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} \\ \implies \forall n \geq N : |a - b| = |(a - a_n) + (a_n - b)| \leq |a_n - a| + |a_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \\ \xRightarrow{\forall \varepsilon} a = b. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Für jedes $\varepsilon > 0$: Ab irgendeinem N bleibt die Folge für immer im ε -Streifen um a .

Example 3.1.4

$(a_n)_{n \in \mathbb{N}} = \left(\frac{1}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$. Vermute: Limes $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$. Sei $\varepsilon > 0$. Mit Archimedes $\exists N \in \mathbb{N} : \frac{1}{\varepsilon} < N$. Dann $\forall n \geq N : \left|\frac{1}{n}\right| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon$. \blacksquare

Example 3.1.5

$\forall a \in \mathbb{R} : (a_n) = (a)$ (konstante Folge) konvergent gegeben a

Example 3.1.6

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2^n} = 0$. Sei $\varepsilon > 0$. Nach 1.2.3 $\forall n \geq 5 : n^2 < 2^n$. Nach Arch. $\exists N \in \mathbb{N} : N \geq 5 \wedge \frac{1}{\varepsilon} < N$. $\implies \forall n \geq N : \left| \frac{n}{2^n} - 0 \right| = \frac{n}{2^n} \stackrel{\text{Ugl}}{<} \frac{1}{n} \stackrel{n \geq N}{\leq} \frac{1}{N} < \varepsilon$ ■

Example 3.1.7

$(a_n)_{n \in \mathbb{N}} := ((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$
Beh.: $\neg \exists a \in \mathbb{R} : (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konv. gg a . Angenommen, es gäbe so ein $a \in \mathbb{R}$. Wähle $0 < \varepsilon < 1$.
 Dann $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : |(-1)^n - a| < \varepsilon$.
 Dann: $2 = |1 - (-1)| \leq \underbrace{|(1 - a)|}_{|a - (-1)^n|} \leq |(-a)^n - a| + \underbrace{|a + 1|}_{|a - (-1)^n|} < 2\varepsilon < 2$

Example 3.1.8

(a_n) reelle Folge.

- $\exists \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : |a_n - a| < \varepsilon$.
 Für $\varepsilon = 1$ erfüllt die Folge aus example 3.1.7 dies!
 Nicht äquivalent zu Konvergenz!
- $\forall \varepsilon > 0 \forall N \in \mathbb{N} \exists n \geq N : |a_n - a| < \varepsilon$
 Folge aus example 3.1.7 erfüllt dies - nicht äquivalent!

3.2 Rechenregeln für Grenzwerte**Theorem 3.2.1**

Seien $(a_n), (b_n) \subset \mathbb{R}$ konv. gegen $a \in \mathbb{R}$ bzw. $b \in \mathbb{R}$. Dann

- (i) $(a_n + b_n)$ konvergiert gegen $a + b$ $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$
- (ii) $(a_n \cdot b_n)$ konvergiert gegen $a \cdot b$
- (iii) Ist $b \neq 0$ so existiert ein $N \in \mathbb{N}$ mit $n \geq N \implies b_n \neq 0$, und es gilt:

$$\left(\frac{a_n}{b_n} \right)_{n \geq N} \text{ konv gg } \frac{a}{b}.$$

Proof

Sei $\varepsilon > 0$
 Wg. Konv. $a_n \rightarrow a \exists N_1 \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_1 : |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$
 Wg. Konv. $b_n \rightarrow b \exists N_2 \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_2 : |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$

$$(a_n), (b_n), a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b \implies a_n + b_n \rightarrow a + b$$

Definition 3.2.2

Wir sagen, dass $(a_n) \subset \mathbb{R}$ **beschränkt** ist, falls $\exists M > 0 \forall n \in \mathbb{N} : |a_n| \leq M$.

Lemma 3.2.3

Konvergente Folgen sind beschränkt.

Proof

Angenommen, (a_n) konvergiert gegen $a \in \mathbb{R}$. Mit $\varepsilon = 1$ ex. $N \in \mathbb{N}$:

$$(\forall n \geq N : |a_n - a| < 1) \implies \forall n \geq N : ||a_n| - |a|| < 1 \implies |a_n| \leq 1 + |a|$$

Setze $M := \max\{|a_1|, \dots, |a_N|, 1 + |a|\}$, so $\forall n \in \mathbb{N} : |a_n| \leq M$. ■

Zurück zum Beweis von Satz 3.2.1 (b) und (c):

Proof

(b) zu zeigen $a_n \rightarrow a \wedge b_n \rightarrow b \implies a_n b_n \rightarrow ab$

$$|a_n b_n - ab| = |(a_n b_n - ab_n) + (ab_n - ab)| \leq |b_n| \cdot |a_n - a| + |a| |b_n - b| \quad (8)$$

Sei $\varepsilon > 0$. Da (b_n) beschr., ex. nach Lemma 3.2.3 ein $M > 0 : \forall n \in \mathbb{N} : |b_n| \leq M$. Da $a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b$

$$(1) \exists N_1 \in \mathbb{N} \forall n \geq N_1 : |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2M}$$

$$(2) \exists N_2 \in \mathbb{N} \forall n \geq N_2 : |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{1+|a|}$$

$$(8) \implies \forall n \geq N := \max\{N_1, N_2\} : |a_n b_n - ab|$$

$$\stackrel{(8)}{\leq} M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} + |a| \cdot \underbrace{\frac{\varepsilon}{2(1+|a|)}}_{< \frac{\varepsilon}{2}} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Damit (b).

$$(c) a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b \neq 0 \implies \frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{a}{b}$$

$$(1) \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 : |b_n| \neq 0.$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \tilde{N} \forall n \geq \tilde{N} : |b_n - b| < \varepsilon,$$

$$\text{d.h. } |b| - \varepsilon \leq |b_n|$$

Wende Dies auf $\varepsilon = \frac{|b|}{2}$ an.

Dann $\forall n \geq \tilde{N} : 0 < \frac{|b|}{2} \leq |b_n|$. setze nun $n_0 := \tilde{N}$

$$(2) b_n \rightarrow b \neq 0, \text{ so } \frac{1}{b_n} \rightarrow \frac{1}{b}.$$

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b} \right| = \left| \frac{b - b_n}{b_n b} \right| = \frac{|b_n - b|}{|b_n| \cdot |b|} \quad (9)$$

Für $n \geq \tilde{N} : \frac{|b|}{2} < |b_n|$, also $\frac{1}{|b_n|} < \frac{2}{|b|}$, also $\frac{1}{|b_n| |b|} < \frac{2}{|b|^2}$

Sei $\varepsilon > 0$. Dann $\exists \tilde{\tilde{N}} \in \mathbb{N} : \forall n \geq \tilde{\tilde{N}} : |b_n - b| < \frac{\varepsilon |b|^2}{2} \cdot \frac{2}{|b|^2} = \varepsilon$

$$(3) a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b \neq 0 \xrightarrow{(2)} (a_n \rightarrow a, \frac{1}{b_n} \rightarrow \frac{1}{b}) \xrightarrow{(b)} \frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{a}{b} \quad \blacksquare$$

Example 3.2.4

$a, b, c, d \in \mathbb{R}, c \neq 0, d \neq 0.$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{an^2 + b}{cn^2 + d} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a + \frac{b}{n^2}}{c + \frac{d}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$$

- $\frac{A}{n} \rightarrow 0$, Thm. 3.2.1 (b) : $\frac{b}{n^2} \rightarrow 0 \cdot 0 = 0 \xrightarrow{\text{Thm. 3.2.1 (b)}} \frac{b}{2} \rightarrow 0$
 (+) Thm. 3.2.1 (a): $a + \frac{1}{n^2} \rightarrow a$
- Nenner $c + \frac{d}{n^2} \rightarrow c \xrightarrow{\text{Thm. 3.2.1 (c)}} \frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{a}{c}.$ ■

3.3 Stabilität der ‘ \leq ’-Relation unter Limesbildung**Theorem 3.3.1**

Seien $(a_n), (b_n)$ zwei konvergente Folgen in \mathbb{R} : Seien $a, b \in \mathbb{R}$

- (i) Gibt es $N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : a_n \leq a$, so $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq a$.
- (ii) Gibt es $N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : b \leq b_n$, so $b \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

Proof

Sei $\xi := \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$. Für $\varepsilon > 0$ finden wir $\tilde{N} \in \mathbb{N} : n \geq \tilde{N} : |a_n - \xi| < \varepsilon$. Damit

$$\xi = (\xi - a_n) + a_n \leq |\xi - a_n| + a_n \leq \xi + a_n \leq a + \varepsilon \implies \xi \leq a. \quad \blacksquare$$

Bemerkung: Satz falsch für ‘ $<$ ’ Bsp.

Theorem 3.3.2 Sandwich-Thm

Seien $(a_n), (c_n) \subset \mathbb{R}$ konv. Folgen: $a_n, c_n \rightarrow a \in \mathbb{R}$ Ist $(b_n) \subset \mathbb{R}$, so dass $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : a_n \leq b_n \leq c_n$, so $b_n \rightarrow a$

Proof

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}, |c_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}, \text{ Für solche } n : a - \varepsilon < a_n - \frac{\varepsilon}{2} \leq b_n - \frac{\varepsilon}{2} \leq c_n - \frac{\varepsilon}{2} < a + \varepsilon \implies b_n \rightarrow a. \quad \blacksquare$$

3.4 Monotone Konvergenz, e und Wurzeln**Definition 3.4.1**

Eine Folge (a_n) heißt

- (i) mon. wachsend $\iff \forall n \in \mathbb{N} a_n \leq a_{n+1}$
- (ii) streng mon. wachsend $\iff \forall n \in \mathbb{N} a_n < a_{n+1}$
- (iii) mon. fallend $\iff \forall n \in \mathbb{N} a_n \geq a_{n+1}$

(iv) streng mon. fallend $\iff \forall n \in \mathbb{N} a_n > a_{n+1}$

Theorem 3.4.2

Eine monotone beschränkte Folge konvergiert.

Proof

(a_n) monoton wachsend und beschränkt, also existiert nach Supremumseigenschaft $a := \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\} < \infty$

Zu zeigen $a_n \rightarrow a$. Sei $\varepsilon > 0$ bel.. Dann nach Def. des Supremums $\exists N \in \mathbb{N} : a - \varepsilon < a_N$. Für $n \geq N$ gilt $a_N \leq a_n$ wegen Monotonie $\implies |a_n - a| = a_n - a = a - a_N + \underbrace{a_N - a_n}_{\leq 0} \leq$

$a - a_N < \varepsilon$. Also $a_n \rightarrow a$. \blacksquare

Corollary 3.4.3

Der Grenzwert $e := \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n$ existiert. Wir nennen e die **Eulerische Zahl**. Es gilt $2 \leq e \leq 3$.

Lemma 3.4.4

Sei $n \in \mathbb{N}_0, x > -1$. Dann $1 + nx \leq (1 + x)^n$.

Proof Cor. 3.4.4

zu zeigen: $(a_n) = \left((1 + \frac{1}{n})^n\right)$ mon. wachsend, beschr.

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{a_{n-1}} &= \frac{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n}{\left(\frac{n}{n-1}\right)^n} \\ &\stackrel{\text{Rechnen}}{=} \left(\frac{n^2-1}{n^2}\right)^n \cdot \frac{n}{n-1} \\ &= \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n \cdot \frac{n}{n-1} \\ &\stackrel{\text{Bernoulli mit } x = -\frac{1}{n^2}}{\leq} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \frac{n}{n-1} \\ &= \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n}{n-1} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$\implies (a_n)$ mon. wachsend

Nun: (a_n) beschränkt. Bin. Formel:

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

$$|a_n| = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = \cdots \leq \frac{1}{k!}$$

$$2^{k-1} \leq k! \forall k \in \mathbb{N}$$

Damit

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \underset{\text{von davor}}{\leq} 2 + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} \leq 2 + 2 \cdot \sum_{k=2}^n n \frac{1}{2^k} \leq 2 + 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \leq 2 + 2 \cdot 1 = 4$$

\implies Zahl e existiert! (nach Thm. 3.4.2)

Wiederholung:

- Konvergent \implies Beschränkt
- Monoton + Beschränkt \implies Konvergent

Corollary 3.4.5 Existenz von Quadratwurzeln

Sei $a \geq 0$, Dann existiert ein $x \in \mathbb{R}$ mit $x^2 = a$. Speziell gilt: Ist $x_0 > 0$ so konvergiert die durch

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)$$

definierte Folge gegen die **eindeutige** positive Lösung $x \in \mathbb{R}_{>0}$ der Gleichung $x^2 = a$

Proof

(i) Beschränkt nach unten: Wir zeigen induktiv $x_1 > 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$

I.A.: $x_0 > 0$ nach Voraussetzung

I.S.: Gelte $x_n > 0$ für ein $n \in \mathbb{N}$ (I.V.). Dann ist

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(\underbrace{x_n}_{>0} + \frac{\overbrace{a}^{\geq 0}}{\underbrace{x_n}_{>0}} \right)$$

(ii) Monoton fallend:

$$\begin{aligned} x_{n+1} - x_n &= \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right) - x_n \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{a}{x_n} - x_n \right) \\ &= \frac{1}{2 \underbrace{x_n}_{>0 \text{ nach (i)}}} (a - x_n^2) \text{ für alle } n \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

Es ist

$$\begin{aligned} a - x_{n+1}^2 &= a - \frac{1}{4} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)^2 \\ &= a - \frac{1}{4} x_n^2 - \frac{1}{2} a - \frac{1}{4} \cdot \frac{a^2}{x_n^2} \\ &= \frac{1}{2} a - \frac{1}{4} \left(x_n^2 + \frac{a^2}{x_n^2} \right) \\ &= -\frac{1}{4} \left(x_n - \frac{a}{x_n} \right)^2 \leq 0 \end{aligned}$$

Also ist (x_n) monoton fallend.

(iii) Es gilt $l := \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ und $l = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1}$.

Es folgt wegen $x_n x_{n+1} = \frac{1}{2} (x_n^2 + a)$, dass $l^2 = \frac{1}{2} (l^2 + a)$ und damit $l^2 = a$.

(iv) **Eindeutigkeit:** Seien $x, y > 0$ seien zwei Lösungen zu

$$x^2 = y^2 = a$$

Dann gilt $0 = x^2 - y^2 = \underbrace{(x+y)}_{>0} (x-y)$. Also ist $x - y = 0$, ■

3.5 Einige Grenzwerte - alt und neu

- Für $k \in \mathbb{N}$ gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^k} = 0$ (Heratives Anwenden von Satz 3.2.1(i))

Definition 3.5.1 Bestimmte Divergenz

Eine Folge $(a_n) \subset \mathbb{R}$ heißt

- Bestimmt divergent gegen $+\infty$ (in Symbolen $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$), falls zu jedem $k > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ existiert mit $a_n \geq k$ für alle $n \geq N$
- Bestimmt divergent gegen $-\infty$ (in Symbolen $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$), falls zu jedem $k < 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ existiert mit $a_n \leq k$ für alle $n \geq N$.
- Ist (a_n) weder konvergent noch bestimmt divergent, so nennen wir (a_n) **unbestimmt divergent** und sagen “ $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ existiert nicht”.

- Es gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \begin{cases} +\infty & \text{falls } x > 1 \\ 1 & \text{falls } x = 1 \\ 0 & \text{falls } |x| < 1 \\ -\infty & \text{falls } x \leq -1 \end{cases}$$

- Für $x > 1$ setze $y := x - 1$, mit Bernoullischer Ungleichung:

$$x^n = (1 + y)^n \geq 1 + ny \rightarrow \infty$$

- Für $x = 1$ gilt für alle $n \in \mathbb{N}$ $x^n = 1$.

- Für $|x|^{-1} > 1$ (falls $x \neq 0$) Sei $\varepsilon > 0$

Also gilt es existiert ein $N \in \mathbb{N}$, so das für alle $n \geq N$ gilt $|x^{-n}| \geq \frac{1}{\varepsilon}$, damit $|x^n| < \varepsilon$ für alle $n \geq N$

- Rest folgt mit Beispiel 3.1.7

–

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n x^k = \begin{cases} +\infty & \text{falls } x \geq 1 \\ \frac{1}{1-x} & \text{falls } |x| < 1 \\ \text{existiert nicht} & \text{falls } x \leq -1 \end{cases}$$

4 Vollständigkeit

4.1 ???

Supremumseigenschaft zeichnet \mathbb{R} aus.

Cauchy-Folgen

In \mathbb{R} sind Cauchy-Folgen und konvergente Folgen gleich, in \mathbb{Q} z.B. nicht.

Cauchy-Folgen sind beschränkt

es ist nicht so, dass alle Beschränkte Folgen, Cauchy-Folgen sind

Definition 4.1.1 Cauchyfolge

Eine reelle Folge (a_n) heißt **Cauchy** oder **Cauchyfolge**, falls für alle $\varepsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ existiert, sodass $|a_n - a_m| < \varepsilon$ für alle $n, m \geq N$. $\boxed{\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq N : |a_n - a_m| < \varepsilon}$

Theorem 4.1.2

Sei (a_n) eine Folge in \mathbb{R} . Dann gilt:

- (i) Ist (a_n) konvergent, so ist (a_n) -Cauchy.
- (ii) Ist (a_n) Cauchy, dann ist (a_n) beschränkt.
- (iii) Ist (a_n) konvergent, so ist (a_n) beschränkt.

Proof

- (i) Sei $\varepsilon > 0$ beliebig. Da (a_n) konvergent, existiert ein $a \in \mathbb{R}$ und ein $N \in \mathbb{N}$ mit $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$.
Seien $n, m \in \mathbb{N}$, dann gilt

$$|a_n - a_m| = |(a_n - a) + (a - a_m)| \leq |a_n - a| + |a - a_m| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

- (ii) Setze $\varepsilon = 1$. Dann finden wir ein $N \in \mathbb{N}$ mit $|a_n - a_m| < 1$ für alle $n, m \geq N$.
Die Menge $\{|a_1|, \dots, |a_N|\}$ ist endlich, hat also ein Maximum, nenne dieses M .
Für alle $n \geq N$ gilt also $|a_n| \leq M$ falls $1 \leq n \leq N$,

$$|a_n| \leq |a_n - a_N| + |a_N| \leq |a_n - a_N| + |a_N| \leq 1 + M \text{ falls } n \geq N$$

Deswegen ist (a_n) durch $1 + M$ beschränkt.

- (iii) Direkt aus (i) und (ii)

Example 4.1.3 Beschränktheit und nicht Cauchy

Betrachte $(a_n) := (-1)^n$. Dann ist $|a_n| = 1$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und speziell (a_n) beschränkt.
Wähle $0 < \varepsilon < 2$. Dann gilt für bel $N \in \mathbb{N}$

$$|a_n - a_{n+1}| = 2 > \varepsilon$$

Proof

Sei $(a_n) \subset \mathbb{R}$ beschränkt. Nach Lem 4.2.7 gibt es eine monotone Teilfolge, die natürlich auch beschränkt ist. Nach dem Satz über monotone, beschränkte Folgen konvergiert diese Teilfolge. ■

Brauchen:

Proof

Sei $(a_n) \subset \mathbb{R}$ bel. Wir nennen a_{n_0} ($n_0 \in \mathbb{N}$) **Gipfelpunkt**, falls:

(i) **unendlich viele Gipfelpunkte:** Sei dann (a_{n_k}) Teilfolge der Gipfelpunkte. Dann

$$n_1 \leq n_2 \leq n_3 \leq \dots \text{ und}$$

$$a_{n_1} \geq a_{n_2} \geq a_{n_3} \geq \dots$$

Also ist (a_{n_k}) monoton fallend.

(ii) **endlich viele oder keine Gipfelpunkte:** Hier existiert

$$N \in \mathbb{N} : n \geq N \implies a_n$$

kein Gipfelpunkt. Also gilt nicht: D. h. $\exists n_1 \geq N : a_N < a_{n_1} \implies a_{n_1}$ kein Gipfelpunkt $\implies \exists N_2 \geq n_1 : a_{n_1} < a_{n_2}$, usf. Dann ist (a_{n_k}) monoton wachsend. ■

4.3 Charakterisierung der Vollständigkeit

Für $a \leq b$ sei $[a, b] := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$. Der Durchmesser von $[a, b]$: $\text{diam}([a, b]) = b - a$

Lemma 4.3.1

Sei (a_n) Cauchyfolge, die eine gegen $a \in \mathbb{R}$ konvergente Teilfolge besitzt. Dann konvergiert (a_n) gegen a .

Proof

$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n, m \geq N : |a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{2}$. Wähle zu $\varepsilon > 0$ ein solches $N \in \mathbb{N}$. Dann gibt es wegen konvergenter Teilfolge einen Index $\tilde{N} \geq N : |a - a_{\tilde{N}}| < \frac{\varepsilon}{2}$. Dann $\forall n \geq N$:

$$\begin{aligned} |a_n - a| &= |(a_n - a_{\tilde{N}}) + (a_{\tilde{N}} - a)| \\ &< \underbrace{|a_n - a_{\tilde{N}}|}_{< \frac{\varepsilon}{2}} + \underbrace{|a_{\tilde{N}} - a|}_{< \frac{\varepsilon}{2}} < \varepsilon \end{aligned}$$

Theorem 4.3.2

Die folgenden Prinzipien sind auf \mathbb{R} äquivalent:

- (i) **Supremumseigenschaft:** Jede nichtleere, nach oben beschränkte Menge hat ein Supremum.
- (ii) **Bolzano-Weierstraß-Eigenschaft:** Jede beschränkte Folge hat eine konvergente Teilfolge

(iii) **Vollständigkeit:** Jede Cauchyfolge konvergiert

(iv) **Intervallschachtelungsprinzip:** Sind $(a_n), (b_n) \subset \mathbb{R}$ mit $\forall n \in \mathbb{N} : a_n \leq b_n \wedge [a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n]$ mit $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{diam}([a_n, b_n]) = 0$, so **existiert genau ein**

$$x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n].$$

Proof

Plan: $(i) \implies (ii) \implies (iii) \implies (iv) \implies (i)$

Ad $(i) \implies (ii)$ Die Supremumseigenschaft ist die einzige Zutat, um Bolzano-Weierstraß zu zeigen. Damit folgt (ii) aus (i)

Ad $(ii) \implies (iii)$ Sei (a_n) Cauchyfolge. Nach letzter Vorlesung ist (a_n) beschränkt, und nach (ii) hat (a_n) also konvergiert Teilfolge. Nach Lem 4.3.1 konvergiert dann aber bereits $(a_n) \implies (iii)$

Ad $(iii) \implies (iv)$ Sei $([a_n, b_n])$ eine **Intervallschachtelung** mit $\text{diam}([a_n, b_n]) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$. Sei $\varepsilon > 0$. Dann

$$\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : \underbrace{\text{diam}([a_n, b_n])}_{b_n - a_n} < \varepsilon$$

. Dann $\forall n, m \geq N : a_m \in [a_n, b_n]$ (da Intervallschachtelung), also:

$$|a_n - a_m| \leq |a_n - b_n| < \varepsilon \implies (a_n) \text{ Cauchy.}$$

Ähnlich: (b_n) Cauchy $\xrightarrow{(iii)} \exists a, b \in \mathbb{R} : a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b$.

$$|a - b| = \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{|a_n - b_n|}_{\text{diam}([a_n, b_n])} = 0 \implies a = b.$$

Kurz zu

$$a \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n] : (a_n) \text{ monoton wachsend, } (b_n) \text{ monoton fallend}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Stabilität der KG-Relation} \\ \implies \left. \begin{array}{l} a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a \\ b \geq \dots \geq b_2 \geq b_1 \end{array} \right\} \end{array} \right\} \implies a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a = b \leq \dots \leq b_2 \leq b$$

hier fehlt noch was ...

Ad (iv) \implies (i) Sei $A \subset \mathbb{R}$ nichtleer und nach oben beschränkt. Zu zeigen A besitzt Supremum. Wähle $x_0 \in A$, sowie $y_0 \in \mathbb{R}$ eine obere Schranke von A . Seien für $n \in \mathbb{N}_0$ die Intervalle $[x_0, y_0], \dots, [x_n, y_n]$ definiert. Setze dann

$$x_{n+1} := \begin{cases} x_n, & \text{falls } [\frac{x_n+y_n}{2}, y_n] \cap A \neq \emptyset \\ \xi \in [\frac{x_n+y_n}{2}, y_n] \cap A & \text{sonst} \end{cases}$$

$$y_{n+1} := \begin{cases} \frac{x_n+y_n}{2}, & \text{falls } [\frac{x_n+y_n}{2}, y_n] \cap A \neq \emptyset \\ y_n & \text{sonst} \end{cases}$$

- $[x_{n+1}, y_{n+1}] \subset [x_n, y_n] : \%$ (sieht man ja)
- Beh.: $|x_n - y_n| \leq 2^{-n}|x_0 - y_0| \forall n \in \mathbb{N}_0$ (reference star)

I.A.: erfüllt.

I.S.: $n \rightsquigarrow n+1$. Gelte (star) für ein $n \in \mathbb{N}_0$. Entweder

$$(a) |x_{n+1} - y_{n+1}| = |x_n - (\frac{x_n+y_n}{2})| = \frac{1}{2}|x_n - y_n| \stackrel{IV}{\leq} 2^{-(n+1)}|x_0 - y_0|$$

$$(b) |x_{n+1} - y_{n+1}| = |\xi - y_n| = y_n - \xi \leq y_n - \frac{1}{2}(x_n + y_n) = \frac{1}{2}(x_n - y_n) \stackrel{IV}{\leq} 2^{-(n+1)}|x_0 - y_0|$$

$\implies \text{diam}([x_n, y_n]) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$. Nach (iv) $\exists! x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_0} [x_n, y_n]$. **Zeige nun:** $x = \sup(A)$. x **obere Schranke**. Hierzu: $x = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$. Also $\forall z \in A$:

$$z \leq y_n \stackrel{\forall n}{\overset{n \rightarrow \infty}{\longrightarrow}} x \implies z \leq x \implies \text{obere Schranke}$$

x **kleinste obere Schranke:** Angenommen es gäbe $x' \in \mathbb{R}, x' \not\leq x \wedge x'$ obere Schranke. Aber $x_n \rightarrow x$ Aber $\forall n \in \mathbb{N}_0 : x_n \in A$. Dann aber $\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : x' < x_n < x$. (Wähle $\varepsilon = \frac{1}{2}|x - x'|$). Widerspruch, da x' keine obere Schranke. Also gilt (i) ■

Example einfach Beispiel aus Vorlesung

Ich glaube das soll zeigen, dass irgendwas an \mathbb{R} besonders

$$[\sqrt{2} - 1, \sqrt{2} + \frac{1}{n}]$$

$$\sqrt{2} - \frac{2}{n} \leq a_n \leq \sqrt{2} - \frac{1}{n}$$

$$\sqrt{2} + \frac{1}{n} \leq b_n \leq \sqrt{2} + \frac{1}{n}$$

$$[a_n, b_n], a_n, b_n \in \mathbb{Q}$$

5 Reihen und deren Konvergenz

5.1 Reihen, Konvergenz und absolute Konvergenz

Definition 5.1.1

Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ eine Folge. Dann heißt die Folge $(s_k)_{k \in \mathbb{N}}$ mit

$$s_k := \sum_{n=1}^k a_n$$

die **Reihe** (u $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ assoziiert):

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_n.$$

Die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ heißt **konvergent**, falls die Folge $(s_k)_{k \in \mathbb{N}}$ konvergiert, und wir bezeichnen dann mit $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ auch ihren Limes. Andernfalls heißt die **Reihe divergent**.

Verschärfung:

Definition 5.1.2

Die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ heißt **absolut konvergent**, falls $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ konvergiert.

Lemma 5.1.3

Absolute Konvergenz impliziert Konvergenz.

Proof

Ist $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ konvergent, so ist $(\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|)_{k \in \mathbb{N}}$ Cauchy.

$$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 : \exists k_0 \in \mathbb{N} \forall k \geq l \geq k_0 :$$

$$\sum_{n=l+1}^k |a_n| < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \left| \sum_{n=1}^k a_n - \sum_{n=1}^l a_n \right|$$

$$= \left| \sum_{n=l+1}^k a_n \right|$$

$$\stackrel{\text{DUG}}{\leq} \sum_{n=l+1}^k |a_n| \leq \varepsilon$$

Also $\left(\sum_{n=1}^k a_n \right)_k$ Cauchy, also fertig wg Voll. ax. ■

Example 5.1.4 Geometrische Reihe

Sei $q \in \mathbb{R}$. Dann konvergiert

$$\sum_{n=1}^{\infty} q^n$$

genau dann, wenn $|q| < 1$. Aus Kapitel 1 wissen wir, dass

$$\sum_{n=0}^N q^n = \frac{1 - q^{N+1}}{1 - q}, \text{ also}$$

$$\sum_{n=1}^N q^n = \frac{q - q^{N+1}}{1 - q} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \frac{q}{1 - q}.$$

Speziell konvergiert die Reihe (absolut).

•

$$q = 1 : \sum_{n=1}^N q^n = N \rightarrow \infty, N \rightarrow \text{infity}.$$

•

$$q > 1 : \sum_{n=1}^N q^n, \text{ also } \sum_{n=1}^N \rightarrow \infty, N \rightarrow \text{infity}.$$

•

$$q \leq -1 \rightsquigarrow \text{Alternation, keine Konvergenz}$$

Example 5.1.5

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{1} + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots = \frac{\pi^2}{6}$$

•

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(n-1)} \text{ konvergiert}$$

$$\frac{1}{n(n-1)} = \frac{A}{n} + \frac{B}{n-1} = \frac{A(n-1) + Bn}{n(n-1)} = \frac{\overbrace{-A}^1 + \overbrace{(A+B)}^{=0} n}{n(n-1)}$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^N \frac{1}{n(n-1)} &= \sum_{n=2}^N \left(-\frac{1}{n} + \frac{1}{n-1} \right) \\ &= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \dots + \frac{1}{N-1} - \frac{1}{N} \\ &= 1 - \frac{1}{N} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 1. \end{aligned}$$

Damit:

$$\forall N \in \mathbb{N}, N \geq 2 : \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2} = 1 + \sum_{n=2}^N \frac{1}{n^2} \leq 1 + \underbrace{\sum_{n=2}^N \frac{1}{n(n-1)}}_{\text{beschränkt in } \mathbb{N}} \Rightarrow \left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2} \right)_{N \in \mathbb{N}} \text{ beschränkt}$$

Example 5.1.6 Harmonische Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ divergent.}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \sum_{k=0}^{\infty} \underbrace{\sum_{n=2^k+1}^{2^{k+1}} \frac{1}{n}}_{2^k \text{ - Summanden}} \leq 1 + \underbrace{\sum_{n=2^k+1}^{2^{k+1}} \frac{1}{2^{k+1}}}_{\frac{2^k}{2^{k+1}}} = 1 + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2} = \infty$$

Lemma 5.1.7

Konvergiert

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n,$$

so ist (a_n) eine Nullfolge.

Corollary 5.1.8 Trivialkriterium

Ist (a_n) **keine Nullfolge**, so divergiert

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

Proof Lem 5.1.7

Nach Voraussetzung ist

$$\left(\sum_{n=1}^k a_n \right)_{k \in \mathbb{N}}$$

Cauchy. Sei $\varepsilon > 0$ beliebig, so $\exists k_0 \in \mathbb{N} \forall k, l \geq k_0 : \left| \sum_{n=1}^k a_n - \sum_{n=1}^l a_n \right| < \varepsilon \overset{k=l+1}{\rightsquigarrow} \forall l \geq k_0 : |a_{l+1}| < \varepsilon \Rightarrow (a_n) \text{ Nullfolge}$

5.2 Konvergenzkriterien

- Leibniz \rightsquigarrow alternierende Reihen

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$$

Proposition 5.2.1 Leibnizkriterium

Ist $(a_n) \subset \mathbb{R}$ **monoton fallende Nullfolge**, so **konvergiert** die alternierende Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$$

Bemerkung: Satz 5.2.1 sagt **nichts** über absolute Konvergenz. Denn sei $(a_n) = (\frac{1}{n})$. Dann ist (a_n) monoton fallende Nullfolge

$$\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^n a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$$

Proof (Satz 5.2.1)

Für

$$k \in \mathbb{N} : s_k := \sum_{n=1}^k (-1)^n a_n$$

- **gerade Indices:** $k = 2j, j \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} s_{2j} &= -a_1 + a_2 - a_3 + a_4 - a_5 + \cdots + \overbrace{(-1)^{2j-1}}^{=-1} + a_{2j} \\ &= -a_1 + a_2 - a_3 \cdots - a_{2j-1} + a_{2j} - a_{2j+1} + \underbrace{a_{2j+2}}_{\substack{a_{2(j+1)} \\ \leq 0}} \end{aligned}$$

$$\implies s_{2j} \geq s_{2(j+1)}$$

und $s_{2j} \geq -a_1 + a_{2j}$ und $a_{2j} \rightarrow 0 \implies (s_{2j})$ nach unten beschränkt. Satz über monotone beschränkte Folgen: (s_{2j}) konvergiert $s_{2j} \rightarrow s$

- **Analog:** (s_{2j+1}) monoton wachsend und nach oben beschränkt $\implies (s_{2j+1})$ konvergiert, $s_{2j+1} \rightarrow s'$
- $S = s' : |s - s'| = \lim_{j \rightarrow \infty} \underbrace{|s_{2j+1} - s_{2j}|}_{|\sum_{k=1}^{2j+1} (-1)^k a_k - \sum_{k=1}^{2j} (-1)^k a_k|} = \lim_{j \rightarrow \infty} |(-1)^{2j+1} a_{2j+1}| = \lim_{j \rightarrow \infty} |a_{2j+1}| = 0.$

Zu zeigen : Die ganze Reihe konvergiert gegen s :

Sei $\varepsilon > 0$:

Fall 1:

$$\exists k_1 \in \mathbb{N} \forall k \geq k_1 : \left| \sum_{n=1}^k 2k(-1)^n a_n - s \right| < \varepsilon$$

Fall 2:

$$\exists k_2 \in \mathbb{N} \forall k \geq k_2 : \left| \sum_{n=1}^k 2k+1(-1)^n a_n - s \right| < \varepsilon$$

Sei nun $N := \max\{2k_1, 2k_2 + 1\}$. Dann $\forall j \geq N$:

$$\left| \sum_{n=1}^j (-1)^n a_n - s \right| < \varepsilon.$$

Damit folgt die Behauptung ■

Example 5.2.2 Alternierende harmonische Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \underbrace{\frac{1}{n}}_{a_n}$$

konvergiert nach Leibniz, da (a_n) eine monoton fallende Nullfolge

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{9n^2 - n + 100}{20n^3 + n^2 + 4}$$

dann muss man feststellen, dass gegen Null und ab einem gewissen Zeitpunkt monoton fallend

Ab jetzt: Kriterien für absolute Konvergenz**Proposition 5.2.3** (Majorantenkriterium/Minorantenkriterium)

Seien $(a_n), (b_n) \in \mathbb{R}$ so, dass

(a) $|a_n| \leq |b_n| \forall n \in \mathbb{N}$ und

$$\sum_{n=1}^{\infty} |b_n| < \infty.$$

Dann konvergiert $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ absolut.

(b) $|a_n| \leq |b_n| \forall n \in \mathbb{N}$ und

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \infty.$$

Dann divergiert $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Proof (Satz 5.2.3)

Sei $\varepsilon > 0$. Da

$$\sum_{n=1}^{\infty} |b_n| < \infty$$

gibt es

$$N \in \mathbb{N} : \forall k, m \geq N : \sum_{n=k}^m |b_n| < \varepsilon \text{ (Cauchyfolge/Partialsummen der Beträge)}$$

Daher auch

$$\sum_{n=k}^m |a_n| \stackrel{\text{Vor.}}{\leq} \sum_{n=k}^m |b_n| < \varepsilon.$$

Also ist

$$\left(\sum_{n=1}^N |a_n| \right)_{N \in \mathbb{N}}$$

Cauchy, und damit folgt (a) nach Vollständigkeit von \mathbb{R} . (b) Analog. ■

Vergleich mit geometrischen Reihen

Proposition 5.2.4 (Quotientenkriterium)

Sei $(a_n) \subset \mathbb{R}$

(a) Es gebe $0 \leq q < 1 \wedge N \in \mathbb{N}$ so, dass

$$a_n \neq 0 \wedge \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \leq q \quad \forall n \geq N$$

Dann konvergiert

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

absolut.

(b) Es gebe $1 \leq q < \infty \wedge N \in \mathbb{N}$ so, dass

$$a_n \neq 0 \wedge \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \leq q \quad \forall n \geq N$$

Dann divergiert

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Proof (Satz 5.2.4)

(a) Zuerst:

$$a_n \neq 0, \underbrace{\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \leq q (< 1)}_{|a_{n+1}| \leq q|a_n|} \quad \forall n \geq N$$

Beh.: $\forall j \in \mathbb{N}_0 : |a_{N+j}| \leq q^j |a_N|$.

I.A. $j = 0$ yus is correct

I.S. $j \leadsto j + 1$.

$$|a_{N+j+1}| \stackrel{\text{Nach Vor.}}{\leq} q|a_{N+j}| \stackrel{\text{I.V.}}{\leq} q^{j+1}|a_N|$$

■

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} a_n &= \underbrace{\sum_{n=1}^{N-1} |a_n|}_{< \infty} + \sum_{n=N}^{\infty} |a_n| \\ &= \left(\sum_{n=1}^{N-1} \right) + \sum_{j=0}^{\infty} |a_{N+j}| \\ &= \underbrace{\left(\sum_{n=1}^{N-1} \right)}_{< \infty} + \underbrace{|a_N| \sum_{j=0}^{\infty} q^j}_{< \infty \text{ } q < 1 \text{ geometrische Reihe}} \end{aligned}$$

(b) Via Induktion.: $|a_n| \neq 0, \forall j \in \mathbb{N}_0 : |a_{N+1}| \geq q^j |a_N|$

$|a_{N+1}| \geq q^j |a_N| \xrightarrow{j \rightarrow \infty} \not\rightarrow 0. \implies (a_n) \text{ keine Nullfolge} \implies [\text{Trivialkriterium}]$ ■

Corollary 5.2.5

Ist $(a_n) \subset \mathbb{R}$ so, dass $\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : a_n \neq 0$. Konvergiert

$$\left(\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \right)$$

mit

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \dots$$

Example 5.2.6

$$\sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{\frac{n!}{2^n}}_{=a_n}$$

1.

$$\forall n \in \mathbb{N} : a_n \neq 0$$

2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \dots$$

Proposition 5.2.7 (Wurzelkriterium)

Sei $(a_n) \subset \mathbb{R}$. Dann:

(i) Es gebe $0 \leq q < 1 \wedge N \in \mathbb{N}$ mit $\sqrt[n]{|a_n|} \leq q \forall n \geq N$. Dann konvergiert

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

absolut.

(ii) Es gebe $1 \leq q < \infty \wedge N \in \mathbb{N}$ mit $\sqrt[n]{|a_n|} > q \forall n \geq N$. Dann divergiert

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

Proof

Analog zum Quotientenkriterium, ab $n = N$ nutze $|a_N| \leq q^n + \text{Geom}$

Example

Konvergiert $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ vielleicht sogar absolut? Nullfolge? -> nein reihe divergent Trivialkriterium

-> ja:

Alternierende Reihe -> ja Leibniz -> konvergenz/Divergenz

-> nein: Quotient -> ja Quotientenkriterium

-> nein: Potent -> ja Wurzelkriterium

-> nein: geeignete Maj.? -> nein: Tricky

Corollary 5.2.8 Wurzelkriterium in Limesform

Ist $a_n \subset \mathbb{R}$ Folge mit

(i)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1$$

, so konvergiert

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

absolut.

(ii)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} > 1$$

, so divergiert

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

Example 5.2.9

$$\sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{\left(\frac{2n+1}{3n+2} \right)^n}_{a_n},$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{3n+2} \\ &= \frac{2}{3} < 1 \implies \text{absolute Konvergenz nach Wurzelkriterium} \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = a,$$

falls $a, a_1, \dots \in \mathbb{R}_{>0}$

Das bedeutet: Liefert das Quotientenkriterium eine Entscheidung, so auch das Wurzelkriterium. Aber **Vorsicht**, das bedeutet nicht, dass das Wurzelkriterium "leichter" anzuwenden ist.

Proposition 5.2.10 Reihenverdichtungskriterium

Sei $(a_n) \subset \mathbb{R}_{>0}$ eine monoton fallende Nullfolge. Dann konvergiert

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

genau dann, wenn

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$$

konvergiert. (verdichtete Reihe)

Proof Satz 5.2.10

$\forall N \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{2^N} a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^N \underbrace{\sum_{n=2^{k-1}+1}^{2^k} a_n}_{2^{k-1}\text{-Summanden}} \\ &\geq a_1 + \sum_{k=1}^N 2^{k-1} a_{2^k} \\ &= a_1 + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N 2^k a_{2^k}. \end{aligned}$$

\Rightarrow Konvergiert

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n,$$

so auch

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$$

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{2^N} a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^N \sum_{n=2^{k-1}+1}^{2^k} \underbrace{a_n}_{\leq a_{2^{k-1}+1}} \\
&\leq a_1 + \sum_{k=1}^N 2^{k-1} a_{2^{k-1}+1} \\
&= a_1 + a_2 + \sum_{k=2}^N 2^{k-1} a_{2^{k-1}+1} \\
&= a_1 + a_2 + \sum_{j=1}^{N-1} 2^j \underbrace{a_{2^j+1}}_{\leq a_{2^j}} \\
&\leq a_1 + a_2 + \sum_{j=1}^{N-1} 2^j a_{2^j+1}
\end{aligned}$$

\Rightarrow Konvergiert

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n},$$

so auch

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

■

Example 5.2.11

Für welche $s > 0$ konvergiert

$$\sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{\frac{1}{n^s}}_{a_n}?$$

- Quotientenkriterium: $\rightarrow 1$ FAIL
- **Reihenverdichtung:** Verdichtete Reihe:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{2^{ns}} = \sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{(2^{1-s})^n}_q.$$

Das ist eine **geometrische Reihe**, die genau für $|q| < 1$. aber $q = 2^{1-s} < 1$ genau dann wenn $s > 1$

5.3 Umordnung von Reihen

Definition 5.3.1

Wir nennen eine bijektive Abbildung $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ eine **Umordnung**. Ist $(a_n) \subset \mathbb{R}$, so heißt

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)}$$

die (zu σ gehörige) Umordnung der Reihe.

Wir nennen die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

unbedingt konvergent, falls **jede** Umordnung der Reihe gegen denselben Wert konvergiert. Konvergiert

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n,$$

aber nicht unbedingt, so heißt die Reihe **bedingt konvergent**.

Proposition 5.3.2 Dirichletscher Umordnungssatz

Eine absolut konvergente Reihe ist unbedingt konvergent.

Proof Satz 5.3.2

Sei

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

absolut konvergent und $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ bijektiv. Sei $\varepsilon > 0$

1

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

konvergiert

$$\implies \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq m \geq n_0 : \sum_{k=m}^n |a_k| < \frac{\varepsilon}{2}$$

(Partialsummen Cauchy)

2 Ist

$$s = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|,$$

so

$$\exists n_1 \geq n_0 : \left| \sum_{k=1}^{n_1} a_k - s \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

3 Wähle $m_1 \in \mathbb{N} : \{1, \dots, n_1\} \subset \{\sigma(1), \dots, \sigma(m_1)\} (\rightsquigarrow \sigma \text{ bijektiv})$

Sei $n \geq m_1$ beliebig. Dann $\exists n_2, \dots, n_l \in \mathbb{N} : n_1 < n_2 < \dots < n_l$

$$\{1, \dots, n_1, n_2, \dots, n_l\} = \{\sigma(1), \dots, \sigma(n)\}.$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \left| \sum_{k=1}^n a_{\sigma(k)} - \sum_{k=1}^{n_1} a_k \right| &= \left| \sum_{j=2}^l a_{n_j} \right| \\ &\leq \sum_{k=n_2}^{n_l} |a_k| \\ &\stackrel{1}{<} \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

Nun

$$\begin{aligned} \forall n \geq m : \left| s - \sum_{k=1}^n a_{\sigma(k)} \right| \\ \leq \underbrace{\left| s - \sum_{k=1}^n a_k \right|}_{\stackrel{2}{\leq} \frac{\varepsilon}{2}} + \underbrace{\left| \sum_{k=1}^{n_1} a_k - \sum_{k=1}^n a_{\sigma(k)} \right|}_{< \frac{\varepsilon}{2}} < \varepsilon \end{aligned} \quad \blacksquare$$

Proposition 5.3.3 Riemannscher Umordnungssatz

Sei

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

konvergent nicht absolut konvergent. Dann gibt es zu jedem $s \in \mathbb{R}$ eine Umordnung σ mit

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)} = s.$$

Teil II: Funktionen und Stetigkeit

Part II.

Funktionen und Stetigkeit

6 Elementare topologische Konzepte in \mathbb{R}

6.1 Offene und abgeschlossene Mengen

Definition 6.1.1

Eine Menge $A \subset \mathbb{R}$ heißt **abgeschlossen** falls der Grenzwert jeder konvergenten Folge $(x_n) \subset \mathbb{R}$ auch zu A gehört: $x_1, x_2, \dots \in A$ und $x_n \rightarrow x \in \mathbb{R} \implies x \in A$. Ist hingegen $\mathbb{R} \setminus A$ abgeschlossen, so heißt A **offen**.

Example 6.1.2

$a < b$, $A := [a, b] := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$ Sei $(x_n) \subset A$, d.h., $x_1, x_2, \dots \in A$ mit $x_n \rightarrow x (x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n)$

Stabilität von ' \leq ', ' \geq ' unter Limesbildung $\xRightarrow{a \leq x_n \leq b} a \leq x, x \leq b \implies x \in A \implies A$ abgeschlossen.
Setzte für $\varepsilon > 0, x \in \mathbb{R} : B_\varepsilon(x) := \{y \in \mathbb{R} : |x - y| < \varepsilon\}$ "offener ε -Ball um x "

Lemma 6.1.3

Eine Menge $A \subset \mathbb{R}$ ist offen genau dann, wenn

$$\forall x \in A \exists \varepsilon > 0 : B_\varepsilon(x) \subset A$$

Proof Lemma 6.1.3

" \implies " Angenommen $\exists x \in A \forall \varepsilon > 0 : B_\varepsilon(x) \not\subset A$
 $\implies \exists x \in A \forall n \in \mathbb{N} : \exists x_n \in B_{\frac{1}{n}}(x) \cap (\mathbb{R} \setminus A)$. $\implies (x_n) \subset \mathbb{R} \setminus A \wedge x_n \rightarrow x \in A$. Also kann $\mathbb{R} \setminus A$ nicht abgeschlossen sein, also A nicht offen. $\implies (A \text{ offen} \implies \text{Bedingung gilt})$ ■

" \impliedby " zu zeigen ... gilt $\implies A$ offen. ($\iff \mathbb{R} \setminus A$ enthalten)
Sei $(x_n) \subset \mathbb{R} \setminus A$ konvergent gegen $x \in \mathbb{R}$. Angenommen, $x \in A$. Nach Stern $\exists \varepsilon > 0 : B_\varepsilon(x) \subset A$. Da $x_n \rightarrow x : \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : x_n \in B_\varepsilon(x) \subset A$. Damit $\forall n \geq N : x_n \in A$ Widerspruch zu $x_n \in \mathbb{R} \setminus A$ ■

Theorem 6.1.4 (offene Teilmenge als Topologie)

Das System T aller offenen Teilmengen von \mathbb{R} hat folgende Eigenschaften

T1) $\emptyset, \mathbb{R} \in T$

T2) $A, B \in T \implies A \cap B \in T$

T3) Ist I eine Indexmenge und $(A_i)_{i \in I} \subset T$, so ist $\bigcup_{i \in I} A_i \in T$

Das bedeutet, dass T eine **Topologie** auf \mathbb{R} ist.

- Allgemein: Topologien $\hat{=}$ Systeme offener Mengen

Proof

Alles nach Lem. 6.1.3

(T1) $\emptyset, \mathbb{R} \in \mathcal{T}$

$$A \text{ offen} \iff \forall x \in A : \exists \varepsilon > 0 : B_\varepsilon(x) \subset A$$

$A = \emptyset$, so trivialerweise erfüllt. für $A = \mathbb{R}$:

$$\forall x \in \mathbb{R}; \forall \varepsilon > 0 : B_\varepsilon(x) \subset \mathbb{R} \implies (T1)$$

(T2) zz.: A, B offen $\implies A \cap B$ offen

$$(i) A \cap B = \emptyset \xrightarrow{(T1)} a \cap B \in T$$

$$(ii) A \cap B \neq \emptyset \implies \exists x : x \in A \wedge x \in B.$$

$$A \wedge B \text{ offen} \implies \exists \varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0 : B_{\varepsilon_1}(x) \subset A \wedge B_{\varepsilon_2}(x) \subset B.$$

$$\begin{aligned} \text{Dann } B_\varepsilon(x) &\subset B_{\varepsilon_1}(x) \subset A \wedge B_{\varepsilon_2}(x) \subset B_{\varepsilon_2}(x) \subset B \\ \implies B_\varepsilon(x) &\subset A \cap B \implies A \cap B \in \mathcal{T} \end{aligned}$$

(T3) $(A_i)_{i \in I} \in \mathcal{T}$ (d.h. $\forall i \in I : A_i$ ist offen)

zu zeigen $\bigcup_{i \in I} A_i$ offen. Sei $x \in \bigcup_{i \in I} A_i$. Dann $\exists i_0 \in I : x \in A_{i_0}$. Aber A_{i_0} offen, also $\exists \varepsilon > 0 : B_\varepsilon(x) \subset A_{i_0}$. Damit $B_\varepsilon(x) \subset A_{i_0} \subset \bigcup_{i \in I} A_i$. Also $\bigcup_{i \in I} A_i$ offen. ■

Lemma 6.1.5

Seien $-\infty \leq a \leq b \leq \infty$. Dann ist (a, b) offen und für $-\infty < a \leq b < \infty$ das Intervall $[a, b]$ abgeschlossen.

Proof Lem 6.1.5

(a, b) offen: $x \in (a, b) \varepsilon := \min\{d_1, d_2\} \implies B_\varepsilon(x) \subset (a, b)$ enthalten.
 $\implies (a, b)$ offen. $[a, b]$ abgeschlossen.: Hierzu $\mathbb{R} \setminus [a, b]$ offen. Aber $\mathbb{R} \setminus [a, b] = (-\infty, a) \cup (b, \infty)$.
 Das ist nach Thm 6.1.4 offen $\implies [a, b]$ abgeschlossen. ■

Definition 6.1.6 Häufungs-, Berührungspunkte

Sei $A \in \mathbb{R} \wedge a \in \mathbb{R}$. Wir nennen a einen

- i) **Berührungspunkt** von A , falls in jedem $B_\varepsilon(a), \varepsilon > 0$, mindestens ein Element aus A liegt.
- ii) **Häufungspunkt** von A , falls in jedem $B_\varepsilon(a), \varepsilon > 0$, unendlich viele Elemente aus A liegen

Example 6.1.7

$$A = (0, 1] \cup \{2\}$$

- Dann ist $a = 0$ Berührungspunkt und Häufungspunkt

Formal: Sei $\varepsilon > 0$ und sei $(x_n) = (\frac{1}{n})$. Dann $(x_n) \subset (0, 1]$ und $x_n \rightarrow 0$. D.h. $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : |x_n| < \varepsilon$, also $0 < x_n < \varepsilon$. Damit ist 0 Häufungspunkt von A .

- Dann ist $a = 2$ Berührungspunkt, aber kein Häufungspkt.
 Ist $0 < \varepsilon < 1$, so $B_\varepsilon(2) \cap A = \{2\}$. Also ist $a = 0$ Berührungspunkt, aber kein Häufungspunkt von A

6.2 Kompaktheit

Definition 6.2.1

Wir nennen eine Menge $A \subset \mathbb{R}$ **kompakt** falls jede Folge in A eine Teilfolge hat, die gegen ein Element aus A konvergiert. D.h.: Ist $(x_n) \subset A$, so $\exists (x_{n_k}) \subset (x_n) \exists x \in A : x = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}$.

Example 6.2.2

Wir betrachten

$$A := \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\},$$

$$B := [0, 1],$$

$$C := [0, \infty) (= \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\})$$

- A ist **nicht kompakt**: Betrachte $(x_n) = \left(\frac{1}{n}\right)$.
Per Def: $(x_n) \subset A$. Aber $x \rightarrow 0$. Jede Teilfolge von (x_n) konvergiert auch gegen $x = 0$. Aber $0 \notin A$. Damit konvergiert jede Teilfolge von (x_n) gegen $0 \notin A$, also A nicht kompakt
- B ist **kompakt**: Sei $x_n \subset [0, 1]$. Also (x_n) beschränkt. Nach Bolzano-Weierstraß hat (x_n) eine konvergente Teilfolge $(x_{n_k}) : x_{n_k} \rightarrow x \in \mathbb{R}$. Aber $[0, 1]$ ist abgeschlossen, also $x \in [0, 1]$. Da (x_n) beliebig, B kompakt
- C ist **nicht kompakt**: ($C = [0, \infty)$). Betrachte $(x_n) = (n)$. Dann $(x_n) \subset C$ und jede Teilfolge divergiert gegen $+\infty$. Also konvergiert keine Teilfolge und damit C nicht kompakt

Theorem 6.2.3 Heine-Borel

Eine Menge $A \subset \mathbb{R}$ ist genau dann kompakt, wenn sie abgeschlossen und beschränkt ist.

Proof Theorem 6.2.3

“ \Rightarrow ” zu zeigen: A kompakt $\Rightarrow A$ abgeschlossen und beschränkt

Abgeschlossen: zu zeigen $(x_n) \subset A$ konvergiert mit $x_n \rightarrow x \in \mathbb{R}$, so $x \in A$.

Sei (x_n) eine solche Folge. Dann konvergiert x_n gegen $x \in \mathbb{R}$. Nach Kompaktheit $\exists (x_{n_k}) \subset (x_n) \exists x \in A : x_{n_k} \rightarrow x$. Aber **jede** Teilfolge einer konvergenten Folge konvergiert gegen denselben Limes. Also $x_{n_k} \rightarrow x, k \rightarrow \infty$. Aber Limiten sind eindeutig, also $x = y \in A$. Also $x \in A$, also ist A abgeschlossen

Beschränkung: Angenommen, A ist nicht beschränkt, (nach oben unbeschränkt). Dann gibt es eine Folge $x_n \subset A$, die monoton gegen $+\infty$ divergiert. Dann aber auch jede Teilfolge, und damit kann keine Teilfolge konvergieren \Rightarrow Widerspruch zu Kompaktheit.
 $\Rightarrow A$ ist beschränkt

“ \Leftarrow ” Sei $A \subset \mathbb{R}$ abgeschlossen und beschränkt. Sei $(x_n) \subset A$. Da A beschränkt, ist (x_n) beschränkt. Nach Bolzano-Weierstraß $\exists (x_{n_k}) \subset (x_n) \exists x \in \mathbb{R} : x = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}$. Aber A ist abgeschlossen und damit $x \in A$. Also ist A kompakt ■

- Maximum ist Supremum, das in der Menge enthalten ist, und Minimum ist Infimum, das in der Menge enthalten ist

Theorem 6.2.4

Ist $K \subset \mathbb{R}$ kompakt, so existieren $\max(K) \wedge \min(K)$.

Proof Thm. 6.2.4

• für Maximum. Sei $m := \sup(K)$. Nach Heine-Borel: K beschränkt, also $m < \infty$. Da $m = \sup(K)$, $\exists (x_n) \subset K : x_n \rightarrow m$. Nach Heine-Borel: K abgeschlossen $\implies m = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in K$. Damit ist m Maximum. ■

- $[0, 1]$ kompakt, $\min[0, 1] = 0, \max[0, 1] = 1$.
- $(0, 1)$ nicht kompakt, $\inf(0, 1) = 0 \notin (0, 1)$
- $[0, \infty)$ nicht kompakt, $\sup[0, \infty) = \infty \notin \mathbb{R}$.

6.3 Dichtheit, \mathbb{Q} und \mathbb{R}

Dichtheit bezieht sich auf Approximierbarkeit.

informell: $B \in \mathbb{R}$ liegt **dicht** in \mathbb{R} , falls jedes Element aus \mathbb{R} durch Elemente aus B approximiert werden kann.

Definition 6.3.1

Sei $A \subset \mathbb{R}$. Eine Teilmenge $B \subset A$ heißt **dicht in** A , falls

$$\forall x \in A \forall \varepsilon > 0 \exists y \in B_\varepsilon(x) : y \in B.$$

Theorem 6.3.2 \mathbb{Q} ist dicht in \mathbb{R}

- Bereits in Kapitel 3 gesehen: $\sqrt{2}$ kann durch rationale Zahlen approximiert werden. D.h. $\exists (x_n) \subset \mathbb{Q} : x_n \rightarrow \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. (speziell \mathbb{Q} nicht abgeschlossen) Thm 6.3.2: Das geht für alle $x \in \mathbb{R}$