

---

## Übungsblatt 06

Elias Gestrich

---

### Aufgabe 6.1:

(a)

$$\sigma = (1 \ 3 \ 6 \ 9) (2 \ 8) (4 \ 7) = (1 \ 9) (1 \ 6) (1 \ 3) (2 \ 8) (4 \ 7)$$

Also

$$\text{sign}(\sigma) = -1$$

(b) Zu zeigen  $(\sigma\tau)(\alpha) = (\tau\sigma)(\alpha)$  für alle  $\alpha \in \mathbb{N}_n$ :

Für  $\sigma(\alpha) \neq \alpha$ , gilt  $\tau(\alpha) = \alpha$  und  $\sigma(\sigma(\alpha)) \neq \sigma(\alpha)$ , also  $\tau(\sigma(\alpha)) = \sigma(\alpha)$ , daraus folgt:

$$\sigma(\tau(\alpha)) = \sigma(\alpha) = \tau(\sigma(\alpha))$$

Sei  $\sigma(\alpha) = \alpha$ , zum Widerspruch

$$\sigma(\tau(\alpha)) \neq \tau(\sigma(\alpha)) = \tau(\alpha)$$

Daraus folgt aber  $\tau(\tau(\alpha)) = \tau(\alpha)$ , also auch  $\tau(\alpha) = \alpha$ , also  $\alpha = \sigma(\alpha) = \sigma(\tau(\alpha)) \neq \tau(\alpha) = \alpha$  was ein Widerspruch ist, also muss  $\sigma(\tau(\alpha)) = \tau(\sigma(\alpha))$  was zu beweisen war.

(c) Mithilfe vollständiger Induktion:

**I.A.** Für  $m = 1$  gilt  $\tau$  und  $\alpha_1$  sind genau dann disjunkt, wenn  $\tau$  und  $\alpha_1$  disjunkt sind.

**I.V.**  $\tau, \alpha_1, \dots, \alpha_m \in S_n$  mit  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  paarweise disjunkt so, dass  $\alpha_1 \cdots \alpha_m$  und  $\tau$  genau dann disjunkt, wenn für alle  $1 \leq i \leq m$  die Permutationen  $\tau$  und  $\alpha_i$  disjunkt sind.

**I.S.** Zu zeigen, wenn  $\alpha_1, \dots, \alpha_{m+1}$  paarweise disjunkt, dann ist  $\alpha_1 \cdots \alpha_{m+1}$  und  $\tau$  genau dann disjunkt, wenn für alle  $1 \leq i \leq m+1$  die Permutationen  $\tau$  und  $\alpha_i$  disjunkt sind.

Beh.  $\tau$  und  $\alpha_1 \cdots \alpha_{m+1}$  genau dann disjunkt, wenn  $\tau$  und  $\alpha_1 \cdots \alpha_m$  disjunkt und  $\tau$  und  $\alpha_{m+1}$  disjunkt.

Aus der I.V. folgt, dass  $\alpha_1 \cdots \alpha_m$  und  $\alpha_{m+1}$  disjunkt.

Sei  $\alpha_1 \cdots \alpha_{m+1}$  und  $\tau$  disjunkt, zu zeigen für all  $1 \leq i \leq m+1$  sind  $\tau$  und  $\alpha_i$  disjunkt. Zum Widerspruch:  $\exists \alpha \in \mathbb{N}_n, 1 \leq i \leq m+1 : \tau(\alpha) \neq \alpha \neq \alpha_i$ . Also

$$\prod_{j \neq i} \alpha_j$$

disjunkt zu  $\alpha_i$  aus I.V., also  $\alpha_1 \cdots \alpha_{m+1} = \alpha_i \prod_{j \neq i} \alpha_j$ , also  $\alpha_1 \cdots \alpha_{m+1}(\alpha) = \alpha_i(\alpha) \neq \alpha$ , also sind  $\alpha_1 \cdots \alpha_{m+1}$  und  $\tau$  nicht disjunkt, was ein Widerspruch ist.

Seien für alle  $1 \leq i \leq m+1$  die Permutationen  $\tau$  und  $\alpha_i$  disjunkt, zu zeigen  $\alpha_1 \cdots \alpha_{m+1}$  und  $\tau$  sind disjunkt.

Zum Widerspruch:  $\tau$  nicht disjunkt  $\alpha_1 \cdots \alpha_{m+1}$ , also existiert ein  $\alpha \in \mathbb{N}_n$  so, dass  $\tau(\alpha) \neq \alpha \neq \alpha_1 \cdots \alpha_{m+1}(\alpha)$ , also existiert ein  $1 \leq i \leq m+1$  mit  $\alpha_i(\alpha) \neq \alpha \neq \tau$ , was im Widerspruch zur Annahme steht.

## Aufgabe 6.2:

(a) Beweis durch vollständige Induktion:

**I.A.**  $|S_1| = |\{(1)\}| = 1 = 1!$

**I.V.**  $|S_n| = n!$

**I.S.** Beh.  $|S_{n+1}| = (n+1)!$ .

Beh.  $S_{n+1} = \{\sigma(i \ n+1) : \sigma \in S_n \text{ und } i \in \mathbb{N}_{n+1}\}$ , wobei  $(n+1 \ n+1) := (1)$  sein soll.

“ $\subset$ ”: Sei  $\tau \in S_{n+1}$  zu zeigen, es gibt ein  $\sigma \in S_n$  und ein  $i \in \mathbb{N}_{n+1}$  mit  $\tau = \sigma(i \ n+1)$ .

Wähle  $\sigma$  mit  $\sigma(\alpha) := \tau(\alpha)$  für  $\alpha \in \mathbb{N}_{n+1}$  mit  $\alpha \neq \tau^{-1}(n+1)$  und  $\alpha \neq n+1$ . Sei  $\sigma(\tau^{-1}(n+1)) := \tau(n+1)$  und  $\sigma(n+1) = n+1$ , und wähle  $i := \tau^{-1}(\alpha)$  so, dass  $\sigma \in S_n$  ist und  $\tau(\alpha) = \sigma(\alpha) = \sigma(\alpha)(i \ n+1)(\alpha)$  für  $i \neq \alpha \neq n+1$  und  $\tau(n+1) = \sigma(i) = \sigma(i \ n+1)(n+1)$  und  $\tau(i) = n+1 = \sigma(n+1) = \sigma(i \ n+1)(i)$ , also  $\tau = \sigma(i \ n+1)$ .

“ $\supset$ ”: Sei  $\sigma \in S_n$  und  $1 \leq i \leq n+1$ , also  $(i \ n+1) \in S_{n+1}$ , also  $\sigma(i \ n+1) \in S_{n+1}$  was zu zeigen war.

Beh.  $\forall \sigma, \tau \in S_n, i, j \in \mathbb{N}_{n+1} : \sigma(i \ n+1) = \tau(j \ n+1) \implies \sigma = \tau \wedge i = j$

Bew. durch Kontraposition  $(\sigma \neq \tau \vee i \neq j \implies \sigma(i \ n+1) \neq \tau(j \ n+1))$ :

“ $\sigma \neq \tau$ ”: “ $i = j$ ”: Es existiert  $\alpha \in \mathbb{N}_n$  so, dass  $\sigma(\alpha) \neq \tau(\alpha)$  für  $\alpha \neq i$  gilt  $\sigma(i \ n+1)(\alpha) = \sigma(\alpha) \neq \tau(\alpha) = \tau(j \ n+1)$ , für  $\alpha = i$  gilt  $\sigma(i \ n+1)(n+1) = \sigma(i) = \sigma(\alpha) \neq \tau(\alpha) = \tau(i) = \tau(j \ n+1)(n+1)$ , was zu zeigen war

“ $i \neq j$  und  $i \neq n+1$ ”: Es existiert  $\alpha \in \mathbb{N}_n$  mit  $\sigma(\alpha) \neq \tau(\alpha)$ , für  $i \neq \alpha \neq j$  gilt  $\sigma(i \ n+1)(\alpha) \neq \tau(\alpha) = \tau(j \ n+1)(i)$  für  $i = \alpha$  gilt:  $\sigma(i \ n+1)(\alpha) = \sigma(n+1) = n+1 = \tau(n+1) \neq \tau(j) = \tau(j \ n+1)(n+1) \neq \tau(j \ n+1)(\alpha)$

“ $\sigma = \tau$ ”: Damit  $\sigma \neq \tau \vee i \neq j$  gilt, muss also  $i \neq j$  gelten:  $\sigma(i \ n+1)(n+1) = \sigma(i) \neq \sigma(j) = \tau(j) = \tau(j \ n+1)(n+1)$  was zu zeigen war

Somit gilt  $|S_{n+1}| = |S_n| \cdot (n+1)$ .

(b) Zu zeigen  $(i_1 \ i_2 \ \dots \ i_m)(i_m \ i_{m-1} \ \dots \ i_1) = (1)$ . Sei hierfür  $\alpha \in \mathbb{N}_n$  gegeben mit  $\alpha \neq i_j$  für alle  $1 \leq j \leq m$ , sodass gilt:  $(i_1 \ i_2 \ \dots \ i_m)(i_m \ i_{m-1} \ \dots \ i_1)(\alpha) = \alpha$ . Sei nun  $\alpha \in \mathbb{N}_n$  mit  $\alpha = i_j$  für ein  $1 \leq j \leq m$ , so dass  $(i_1, i_2, \dots, i_m)(i_m, i_{m-1}, \dots, i_1)(\alpha) = (i_1, i_2, \dots, i_m)(i_{j-1}) = i_j$ , was zu zeigen war.

### Aufgabe 6.3:

Sei  $\sigma \in S_n$  gegeben, und seien  $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in S_n$  paarweise disjunkte Zyklen mit  $\sigma = \alpha_1 \cdots \alpha_k$  und  $\beta_1, \dots, \beta_l \in S_n$  paarweise disjunkte Zyklen mit  $\sigma = \beta_1 \cdots \beta_l$ . Da  $\alpha_1$  ein Zyklus gilt es existieren  $a_1, \dots, a_m \in S_n$ , die paarweise verschieden sind, für die gilt  $(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_m) = \alpha_1$  da  $\alpha_1, \dots, \alpha_k$  paarweise disjunkt gilt für  $1 < i \leq k, 1 \leq j \leq m$ , dass  $\alpha_i(a_j) = a_j$ , also auch  $\sigma(a_j) = \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_k(a_j) = \alpha_1(a_j) \neq a_j$ , da  $\beta_1, \dots, \beta_l$  paarweise disjunkt, sind sie nach 6.1 (b) kommutativ, also  $\beta_1(a_j) \neq a_j$ , also für  $1 < i \leq k$  gilt  $\beta_i(a_j) = a_j$ , also

$$\alpha_1(a_j) = \alpha_1 \cdots \alpha_k(a_j) = \sigma(a_j) = \beta_1 \cdots \beta_l(a_j) = \beta_1(a_j)$$

Also  $(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_m) = \beta_1$ . Führe dies für  $\alpha_2, \dots, \alpha_k$  weiter, so dass,  $\beta_i = \alpha_i$  für  $1 \leq i \leq k$ . Daraus folgt

$$\begin{aligned} \alpha_1 \cdots \alpha_k &= \beta_1 \cdots \beta_k \beta_{k+1} \cdots \beta_l \\ (1) &= \beta_{k+1} \cdots \beta_l \end{aligned}$$

Beh.  $k = l$  (sodass  $\beta_{k+1} \cdots \beta_l = (1)$ ), zum Widerspruch:  $k < l$ , Dann existiert  $\alpha \in \mathbb{N}_n$  so, dass  $\beta_{k+1}(\alpha) \neq \alpha$ , da  $\beta_{k+1}, \dots, \beta_l$  paarweise disjunkte Zyklen, gilt  $\beta_i(\alpha) = \alpha$  für  $k+1 < i \leq l$ , also  $\beta_{k+1} \cdots \beta_l(\alpha) = \beta_{k+1}(\alpha) \neq \alpha = (1)(\alpha)$ , was ein Widerspruch ist.

### Aufgabe 6.4:

Für ein Zyklus  $\sigma \in S_n$  gilt, dass  $a_1, \dots, a_m$  existieren mit  $\sigma = (a_1 \ \dots \ a_m)$ , hierfür gilt  $m \leq n$  und

$$(a_1 \ \dots \ a_m)^m(a_i) = (a_1 \ \dots \ a_m)^i(a_m) = (a_1 \ \dots \ a_m)^{i-1}(a_1) = a_i$$

und insbesondere für  $\alpha \neq a_i$  für alle  $1 \leq i \leq m$ :  $(a_1 \ \dots \ a_m)^m(\alpha) = \alpha$ . Also gilt:

$$\sigma^{n!} = (\sigma^m)^{\prod_{i \neq m} i} = \text{id}^{\prod_{i \neq m} i} = \text{id}$$

Da sich alle  $\tau \in S_n$  durch Produkt paarweise disjunkter Zyklen  $\tau_1, \dots, \tau_l$  darstellen lässt, gilt:

$$\begin{aligned} \tau^{n!} &= (\tau_1 \cdots \tau_l)^{n!} \\ &= \underbrace{(\tau_1 \cdots \tau_l) \cdots (\tau_1 \cdots \tau_l)}_{n! \text{-mal}} \\ &= \underbrace{\tau_1 (\tau_2 \cdots \tau_l) \cdots \tau_1 (\tau_2 \cdots \tau_l)}_{n! \text{-mal}} \\ &\stackrel{6.1(b) \& (c)}{=} \underbrace{\tau_1 \cdots \tau_1}_{n! \text{-mal}} (\tau_2 \cdots \tau_l)^{n!} = \cdots \\ &= \tau_1^{n!} \tau_2^{n!} \cdots \tau_l^{n!} \\ &= \text{id} \cdot \text{id} \cdots \text{id} \\ &= \text{id} \end{aligned}$$

■