

Ecuaciones y sistemas lineales

Imanol

11/3/2021

R

Sistemas compatibles determinados.

Sistemas compatibles determinados con *solve()*

```
A = rbind(c(1,1,2),c(2,4,-3),c(3,6,-5))
b = c(9,1,0)
AB = cbind(A,b) # Unimos matriz A y b

# Comprobar si es compatible determinado
qr(A)$rank==qr(AB)$rank # Compatible
```

```
## [1] TRUE
```

```
qr(A)$rank==3 # Determinado
```

```
## [1] TRUE
```

```
# Resolver el sistema
solve(A,b)
```

```
## [1] 1 2 3
```

```
# Comprobacion
solution = c(1,2,3)
A%%solution == b # Confirmado, nos da el vector de terminos independientes.
```

```
##      [,1]
## [1,] TRUE
## [2,] TRUE
## [3,] TRUE
```

Sistemas compatibles determinados con *matlib*

```
A = rbind(c(2,2),c(-1,1))
b = c(1,2)
AB = cbind(A,b) # Unimos matriz A y b

library(matlib)

# Una vez en forma de matriz se puede mostrar
showEqn(A, b)
```

```
## 2*x1 + 2*x2 = 1
## -1*x1 + 1*x2 = 2
```

```
# Calcular rango de la matriz con matlib
R(A)
```

```
## [1] 2
```

```
R(AB)
```

```
## [1] 2
```

```
# Comprobar si el sistema es compatible con matlib
all.equal(R(A),R(AB))
```

```
## [1] TRUE
```

```
# Resolver el sistema son matlib
Solve(A,b, fractions = TRUE) # En este caso es mayúscula.
```

```
## x1 = -3/4
## x2 = 5/4
```

```
# Si fractions es TRUE nos lo muestra en fracciones
```

Representación de Sistemas.

Se hace uso de la librería `matlib()` y mediante `plotEqn()` si tenemos 2 incógnitas o `plotEqn3()` si tenemos 3 incógnitas.

```
library(matlib)


# Representación con plotEqn()

## Dos Incógnitas

### Dos ecuaciones
A = rbind(c(2,2),c(-1,1))
b = c(1,2)
AB = cbind(A,b) # Unimos matriz A y b
plotEqn(A,b)
```

```
## 2*x[1] + 2*x[2] = 1
## -x[1] + x[2] = 2
```

```
points(-3/4,5/4, col = "turquoise1", pch = 19) # Para dibujar puntos con ciertas características
```




```
#### Tres ecuaciones
A = rbind(c(4,2),c(1,-2),c(3,4))
b = c(3,2,1)
showEqn(A,b)
```

```
## 4*x1 + 2*x2 = 3
## 1*x1 - 2*x2 = 2
## 3*x1 + 4*x2 = 1
```

```
plotEqn(A,b)
```

```
## 4*x[1] + 2*x[2] = 3
## x[1] - 2*x[2] = 2
## 3*x[1] + 4*x[2] = 1
```



Tres Incognitas

```
A = rbind(c(1,1,2),c(2,4,-3),c(3,6,-5))
b = c(9,1,0)
showEqn(A,b)
```

```
## 1*x1 + 1*x2 + 2*x3 = 9
## 2*x1 + 4*x2 - 3*x3 = 1
## 3*x1 + 6*x2 - 5*x3 = 0
```

```
plotEqn3d(A,b, xlim = c(-3,3), ylim = c(0,6))
```

Tema 2 Ejercicio 1.

```
A = rbind(c(4,2),c(1,-2),c(3,4))
b = c(3,2,1)
showEqn(A,b)
```

Solución (a)

```
## 4*x1 + 2*x2 = 3
## 1*x1 - 2*x2 = 2
## 3*x1 + 4*x2 = 1
```

```
AB = cbind(A,b)

all.equal(R(A),R(AB))
```

```
## [1] TRUE
```

```
# Resolvemos
Solve(A,b,fractions = T)
```

Solución (b)

```
## x1    =    1
## x2    =   -1/2
## 0     =    0
```

```
#Comprobamos
s = c(1,-1/2)
A%*%s == b # Efectivamente es la correcta
```

```
##      [,1]
## [1,] TRUE
## [2,] TRUE
## [3,] TRUE
```

Metodo de GAUSS.

```
library(matlib)
A = rbind(c(1,1,2),c(2,4,-3),c(3,6,-5))
b = c(9,1,0)
AB = cbind(A,b)
```

```
echelon(AB) # Escalona la matriz
```

```
##      b
## [1,] 1 0 0 1
## [2,] 0 1 0 2
## [3,] 0 0 1 3
```

```
echelon(AB, verbose = T, fraction = T) # Verbose = True nos da los pasos que ha hecho para escalonarla
```

```
##
## Initial matrix:
##      b
## [1,] 1 1 2 9
## [2,] 2 4 -3 1
## [3,] 3 6 -5 0
```

```

##
## row: 1
##
## exchange rows 1 and 3
##      b
## [1,] 3 6 -5 0
## [2,] 2 4 -3 1
## [3,] 1 1 2 9
##
## multiply row 1 by 1/3
##      b
## [1,] 1 2 -5/3 0
## [2,] 2 4 -3 1
## [3,] 1 1 2 9
##
## multiply row 1 by 2 and subtract from row 2
##      b
## [1,] 1 2 -5/3 0
## [2,] 0 0 1/3 1
## [3,] 1 1 2 9
##
## subtract row 1 from row 3
##      b
## [1,] 1 2 -5/3 0
## [2,] 0 0 1/3 1
## [3,] 0 -1 11/3 9
##
## row: 2
##
## exchange rows 2 and 3
##      b
## [1,] 1 2 -5/3 0
## [2,] 0 -1 11/3 9
## [3,] 0 0 1/3 1
##
## multiply row 2 by -1
##      b
## [1,] 1 2 -5/3 0
## [2,] 0 1 -11/3 -9
## [3,] 0 0 1/3 1
##
## multiply row 2 by 2 and subtract from row 1
##      b
## [1,] 1 0 17/3 18
## [2,] 0 1 -11/3 -9
## [3,] 0 0 1/3 1
##
## row: 3
##
## multiply row 3 by 3
##      b
## [1,] 1 0 17/3 18
## [2,] 0 1 -11/3 -9
## [3,] 0 0 1 3

```

```

##
## multiply row 3 by 17/3 and subtract from row 1
##          b
## [1,]    1    0    0    1
## [2,]    0    1 -11/3   -9
## [3,]    0    0    1    3
##
## multiply row 3 by 11/3 and add to row 2
##          b
## [1,]  1  0  0  1
## [2,]  0  1  0  2
## [3,]  0  0  1  3

```

Sistemas compatibles indeterminados.

La función solve no funcionara.