

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Лабораторная работа № 1 "Ряды Фурье"

по дисциплине Частотные методы

Выполнила: студентка гр. **R3238**

Нечаева А. А.

Преподаватель: *Перегудин Алексей Алексеевич*

Санкт-Петербург, 2024

1 Задание. Вещественные функции.

Придумать числа a, b, t_0, t_1, t_2 такие, что $a, b > 0$ и $t_2 > t_1 > t_0 > 0$.

Пусть $a = 1, b = 2; t_0 = \pi, t_1 = 2\pi, t_2 = 3\pi$.

Рассмотрим следующие функции $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

1.1 Квадратная волна.

Периодическая функция с периодом $T = t_2 - t_0 = 3\pi - \pi = 2\pi$ такая, что

$$f(t) = \begin{cases} a, & t \in [t_0, t_1), \\ b, & t \in [t_1, t_2) \end{cases} = \begin{cases} 1, & t \in [\pi, 2\pi), \\ 2, & t \in [2\pi, 3\pi) \end{cases} \quad (1)$$




Рис. 1. График функции $f(t)$.

Рассмотрим частичные суммы Фурье F_N и G_N вида

$$F_N(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos(\omega_n t) + b_n \sin(\omega_n t)), \quad (2)$$

$$G_N(t) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{i\omega_n t}, \quad (3)$$

где $\omega_n = 2\pi \frac{n}{T}$.

Перепишем формулы выше с учетом того, что $T = 2\pi$, следовательно $\omega_n = 2\pi \frac{n}{2\pi} = n$:

$$F_N(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt)) , \quad (4)$$

$$G_N(t) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{int} . \quad (5)$$

Перейдем к разложению по формуле 4.
 $f(x)$ определена на $[\pi, 3\pi]$, преобразуем:

$$\pi \leq t \leq 3\pi \rightarrow \pi - 2\pi \leq t - 2\pi \leq 3\pi - 2\pi \rightarrow -\pi \leq t - 2\pi \leq \pi \quad (6)$$

Новая переменная $x = t - 2\pi$. Выразим $t = x + 2\pi$ и запишем новую функцию $\phi(x) = f(x + 2\pi)$.

$$\phi(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)) , \quad (7)$$

где a_0, a_n, b_n – коэффициенты Фурье:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \phi(x) dx, \quad (8)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \phi(x) \cos(nx) dx, \quad (9)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \phi(x) \sin(nx) dx, \quad (10)$$

Проведем обратную замену $x = t - 2\pi$:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos(n(t - 2\pi)) + b_n \sin(n(t - 2\pi))) \quad (11)$$

Воспользуемся периодичностью синуса и косинуса:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt)) \quad (12)$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{\pi}^{3\pi} f(t) dt, \quad (13)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{\pi}^{3\pi} f(t) \cos(nt) dt, \quad (14)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{\pi}^{3\pi} f(t) \sin(nt) dt, \quad (15)$$

Вычислим значения коэффициентов:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \left(\int_{\pi}^{2\pi} 1 dt + \int_{2\pi}^{3\pi} 2 dt \right) = \frac{1}{\pi} (\pi + 2\pi) = 3, \quad (16)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left(\int_{\pi}^{2\pi} \cos(nt) dt + 2 \int_{2\pi}^{3\pi} \cos(nt) dt \right) \quad (17)$$

Отдельно вычислим неопределенный интеграл:

$$\int \cos(nt) dt = \left| u = nt, t = \frac{u}{n}, dt = \frac{du}{n} \right| = \int \frac{\cos(u) du}{n} = \frac{\sin u}{n} + C = \frac{\sin(nt)}{n} + C \quad (18)$$

Отсюда получим

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left(\left. \frac{\sin(nt)}{n} \right|_{\pi}^{2\pi} + 2 \left. \frac{\sin(nt)}{n} \right|_{2\pi}^{3\pi} \right) = 0 \quad (19)$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \left(\int_{\pi}^{2\pi} \sin(nt) dt + 2 \int_{2\pi}^{3\pi} \sin(nt) dt \right) = -\frac{1}{\pi} \left(\left. \frac{\cos(nt)}{n} \right|_{\pi}^{2\pi} + 2 \left. \frac{\cos(nt)}{n} \right|_{2\pi}^{3\pi} \right) = \\ &= -\frac{1}{\pi} \left(\frac{\cos(2\pi n) - \cos(\pi n)}{n} + 2 \frac{\cos(3\pi n) - \cos(2\pi n)}{n} \right) = \\ &= -\frac{1}{\pi} \left(\frac{1 - \cos(\pi n)}{n} + 2 \frac{\cos(3\pi n) - 1}{n} \right) = -\frac{1}{\pi} \left(\frac{1 - (-1)^n}{n} + 2 \frac{(-1)^n - 1}{n} \right) = \\ &= -\frac{1}{\pi} \left(\frac{(-1)^n - 1}{n} \right) = \frac{1 - (-1)^n}{\pi n} \quad (20) \end{aligned}$$

Примеры вычисления первых значений b_n :

$$b_1 = \frac{1 - (-1)^1}{\pi} = \frac{2}{\pi} \quad (21)$$

$$b_2 = \frac{1 - (-1)^2}{2\pi} = 0 \quad (22)$$

$$b_3 = \frac{1 - (-1)^3}{3\pi} = \frac{2}{3\pi} \quad (23)$$

$$b_0 = \frac{1}{\pi} \left(\int_{\pi}^{2\pi} \sin(0) dt + 2 \int_{2\pi}^{3\pi} \sin(0) dt \right) = 0 \quad (24)$$

Запишем получившуюся частичную сумму:

$$F_N(t) = \frac{3}{2} + \sum_{n=1}^N \left(\frac{1 - (-1)^n}{\pi n} \sin(nt) \right), \quad (25)$$

Перейдем к рассмотрению следующей частичной суммы:

$$G_N(t) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{int}. \quad (26)$$

Где соответствующий коэффициент:

$$c_n = \frac{1}{T} \int_h^{h+T} f(t) e^{i\omega_n t} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{\pi}^{3\pi} f(t) e^{int} dt = \frac{1}{2\pi} \left(\int_{\pi}^{2\pi} e^{int} dt + 2 \int_{2\pi}^{3\pi} e^{int} dt \right) \quad (27)$$

Отдельно вычислим неопределенный интеграл:

$$c_n = \int e^{int} dt = \frac{1}{in} \int e^{int} d(int) = \frac{e^{int}}{in} + C \quad (28)$$

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{e^{int}}{in} \Big|_{\pi}^{2\pi} + 2 \frac{e^{int}}{in} \Big|_{2\pi}^{3\pi} \right) = \frac{2e^{3in\pi} - e^{in\pi} - e^{2in\pi}}{2in\pi} \quad (29)$$

В итоге полученное разложение:

$$G_N(t) = \sum_{n=-N}^N \frac{2e^{3in\pi} - e^{in\pi} - e^{2in\pi}}{2in\pi} e^{int}. \quad (30)$$

1.2 Любая четная периодическая функция.

$$f(t) = \cos t \quad (31)$$




Рис. 2. График функции $f(t)$.

1.3 Любая нечетная периодическая функция.

$$f(t) = \sin t \quad (32)$$




Рис. 3. График функции $f(t)$.

1.4 Любая периодическая функция, график которой состоит не только из прямых линий, и которая не является ни четной, ни нечетной.

$$f(t) = \cos(t + 1) \quad (33)$$




Рис. 4. График функции $f(t)$.