

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  
образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

## Лабораторная работа № 1 "Ряды Фурье"

по дисциплине Частотные методы

Выполнила: студентка гр. **R3238**

**Нечаева А. А.**

Преподаватель: *Перегудин Алексей Алексеевич*

Санкт-Петербург, 2024

# 1 Задание. Вещественные функции.

Придумать числа  $a, b, t_0, t_1, t_2$  такие, что  $a, b > 0$  и  $t_2 > t_1 > t_0 > 0$ .

Пусть  $a = 1, b = 2; t_0 = \pi, t_1 = 2\pi, t_2 = 3\pi$ .

Рассмотрим следующие функции  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ :

## 1.1 Квадратная волна.

Периодическая функция с периодом  $T = t_2 - t_0 = 3\pi - \pi = 2\pi$  такая, что

$$f(t) = \begin{cases} a, & t \in [t_0, t_1), \\ b, & t \in [t_1, t_2) \end{cases} = \begin{cases} 1, & t \in [\pi, 2\pi), \\ 2, & t \in [2\pi, 3\pi) \end{cases} \quad (1)$$

### 1.1.1 График функции




Рис. 1. График функции  $f(t)$ .

### 1.1.2 Частичные суммы Фурье

Рассмотрим частичные суммы Фурье  $F_N$  и  $G_N$  вида

$$F_N(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos(\omega_n t) + b_n \sin(\omega_n t)) , \quad (2)$$

$$G_N(t) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{i\omega_n t}, \quad (3)$$

где  $\omega_n = 2\pi \frac{n}{T}$ .

Перепишем формулы выше с учетом того, что  $T = 2\pi$ , следовательно  $\omega_n = 2\pi \frac{n}{2\pi} = n$ :

$$F_N(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt)), \quad (4)$$

$$G_N(t) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{int}. \quad (5)$$

Перейдем к разложению по формуле 4.

$f(x)$  определена на  $[\pi, 3\pi]$ , преобразуем:

$$\pi \leq t \leq 3\pi \rightarrow \pi - 2\pi \leq t - 2\pi \leq 3\pi - 2\pi \rightarrow -\pi \leq t - 2\pi \leq \pi \quad (6)$$

Новая переменная  $x = t - 2\pi$ . Выразим  $t = x + 2\pi$  и запишем новую функцию  $\phi(x) = f(x + 2\pi)$ .

$$\phi(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)), \quad (7)$$

где  $a_0, a_n, b_n$  – коэффициенты Фурье:

### 1.1.3 Вычисление коэффициентов $a_n, b_n$ и $c_n$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \phi(x) dx, \quad (8)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \phi(x) \cos(nx) dx, \quad (9)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \phi(x) \sin(nx) dx, \quad (10)$$

Проведем обратную замену  $x = t - 2\pi$ :

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos(n(t - 2\pi)) + b_n \sin(n(t - 2\pi))) \quad (11)$$

Воспользуемся периодичностью синуса и косинуса:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt)) \quad (12)$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{\pi}^{3\pi} f(t) dt, \quad (13)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{\pi}^{3\pi} f(t) \cos(nt) dt, \quad (14)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{\pi}^{3\pi} f(t) \sin(nt) dt, \quad (15)$$

Вычислим значения коэффициентов:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \left( \int_{\pi}^{2\pi} 1 dt + \int_{2\pi}^{3\pi} 2 dt \right) = \frac{1}{\pi} (\pi + 2\pi) = 3, \quad (16)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left( \int_{\pi}^{2\pi} \cos(nt) dt + 2 \int_{2\pi}^{3\pi} \cos(nt) dt \right) \quad (17)$$

Отдельно вычислим неопределенный интеграл:

$$\int \cos(nt) dt = \left| u = nt, t = \frac{u}{n}, dt = \frac{du}{n} \right| = \int \frac{\cos(u) du}{n} = \frac{\sin u}{n} + C = \frac{\sin(nt)}{n} + C \quad (18)$$

Отсюда получим

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left( \left. \frac{\sin(nt)}{n} \right|_{\pi}^{2\pi} + 2 \left. \frac{\sin(nt)}{n} \right|_{2\pi}^{3\pi} \right) = 0 \quad (19)$$

$$\begin{aligned}
b_n &= \frac{1}{\pi} \left( \int_{\pi}^{2\pi} \sin(nt) dt + 2 \int_{2\pi}^{3\pi} \sin(nt) dt \right) = -\frac{1}{\pi} \left( \left. \frac{\cos(nt)}{n} \right|_{\pi}^{2\pi} + 2 \left. \frac{\cos(nt)}{n} \right|_{2\pi}^{3\pi} \right) = \\
&= -\frac{1}{\pi} \left( \frac{\cos(2\pi n) - \cos(\pi n)}{n} + 2 \frac{\cos(3\pi n) - \cos(2\pi n)}{n} \right) = \\
&= -\frac{1}{\pi} \left( \frac{1 - \cos(\pi n)}{n} + 2 \frac{\cos(3\pi n) - 1}{n} \right) = -\frac{1}{\pi} \left( \frac{1 - (-1)^n}{n} + 2 \frac{(-1)^n - 1}{n} \right) = \\
&= -\frac{1}{\pi} \left( \frac{(-1)^n - 1}{n} \right) = \frac{1 - (-1)^n}{\pi n} \quad (20)
\end{aligned}$$

Примеры вычисления первых значений  $b_n$ :

$$b_1 = \frac{1 - (-1)^1}{\pi} = \frac{2}{\pi} \quad (21)$$

$$b_2 = \frac{1 - (-1)^2}{2\pi} = 0 \quad (22)$$

$$b_3 = \frac{1 - (-1)^3}{3\pi} = \frac{2}{3\pi} \quad (23)$$

$$b_0 = \frac{1}{\pi} \left( \int_{\pi}^{2\pi} \sin(0) dt + 2 \int_{2\pi}^{3\pi} \sin(0) dt \right) = 0 \quad (24)$$

Запишем получившуюся частичную сумму:

$$F_N(t) = \frac{3}{2} + \sum_{n=1}^N \left( \frac{1 - (-1)^n}{\pi n} \sin(nt) \right), \quad (25)$$

Перейдем к рассмотрению следующей частичной суммы:

$$G_N(t) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{int}. \quad (26)$$

Где соответствующий коэффициент:

$$c_n = \frac{1}{T} \int_h^{h+T} f(t) e^{-i\omega_n t} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{\pi}^{3\pi} f(t) e^{-int} dt = \frac{1}{2\pi} \left( \int_{\pi}^{2\pi} e^{-int} dt + 2 \int_{2\pi}^{3\pi} e^{-int} dt \right) \quad (27)$$

При  $n = 0$  коэффициент будет равен:

$$c_0 = \frac{1}{2\pi} \left( \int_{\pi}^{2\pi} e^0 dt + 2 \int_{2\pi}^{3\pi} e^0 dt \right) = \frac{3}{2} \quad (28)$$

Отдельно вычислим неопределенный интеграл:

$$c_n = \int e^{-int} dt = \frac{-1}{in} \int e^{-int} d(-int) = -\frac{e^{-int}}{in} + C \quad (29)$$

$$c_n = -\frac{1}{2\pi} \left( \frac{e^{-int}}{in} \Big|_{\pi}^{2\pi} + 2 \frac{e^{-int}}{in} \Big|_{2\pi}^{3\pi} \right) = \frac{e^{-in\pi} + e^{-2in\pi} - 2e^{-3in\pi}}{2in\pi} \quad (30)$$

В итоге полученное разложение:

$$G_N(t) = \sum_{n=-N}^N \frac{e^{-in\pi} + e^{-2in\pi} - 2e^{-3in\pi}}{2in\pi} e^{int}. \quad (31)$$

#### 1.1.4 Построение графиков частичных сумм $F_N$ , $G_N$

...

#### 1.1.5 Равенство Парсеваля

...

## 1.2 Любая четная периодическая функция.

$$f(t) = 4 \cos \left( \sin^2 \left( \frac{t}{2} \right) \right) \quad (32)$$

### 1.2.1 График функции




Рис. 2. График функции  $f(t)$ .

### 1.2.2 Частичные суммы Фурье

Рассмотрим частичные суммы Фурье  $F_N$  и  $G_N$  вида

$$F_N(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos(\omega_n t) + b_n \sin(\omega_n t)) , \quad (33)$$

$$G_N(t) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{i\omega_n t} , \quad (34)$$

где  $\omega_n = 2\pi \frac{n}{T}$ .

Аналогично,  $T = 2\pi$ , следовательно,  $\omega_n = n$ :

$$F_N(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt)) , \quad (35)$$

$$G_N(t) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{int} , \quad (36)$$

### 1.2.3 Вычисление коэффициентов $a_n$ , $b_n$ и $c_n$

Запишем формулы для вычисления коэффициентов  $a_n$ ,  $b_n$  и  $c_n$  :

$$a_n = \frac{2}{T} \int_h^{h+T} f(t) \cos(nt) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 4 \cos\left(\sin^2\left(\frac{t}{2}\right)\right) \cos(nt) dt \quad (37)$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_h^{h+T} f(t) \sin(nt) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 4 \cos\left(\sin^2\left(\frac{t}{2}\right)\right) \sin(nt) dt \quad (38)$$

$$c_n = \frac{1}{T} \int_h^{h+T} f(t) e^{-i\omega_n t} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 4 \cos\left(\sin^2\left(\frac{t}{2}\right)\right) e^{-int} dt \quad (39)$$

Вычисление интегралов в данном случае возможно только численно, так как интегралы, содержащиеся в коэффициентах являются неберущимися. Найдем первые 3 значения:

$n = 0$  :

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 4 \cos\left(\sin^2\left(\frac{t}{2}\right)\right) dt = 6.58868 \quad (40)$$

$$b_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 4 \cos\left(\sin^2\left(\frac{t}{2}\right)\right) \sin(0 \cdot t) dt = 0 \quad (41)$$

$$c_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 4 \cos\left(\sin^2\left(\frac{t}{2}\right)\right) e^{-i \cdot 0 \cdot t} dt = 3.29434 \quad (42)$$

$n = 1$  :



$$a_1 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 4 \cos \left( \sin^2 \left( \frac{t}{2} \right) \right) \cos(t) dt = 0.929197 \quad (43)$$

$$b_1 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 4 \cos \left( \sin^2 \left( \frac{t}{2} \right) \right) \sin(t) dt = 0 \quad (44)$$

$$c_1 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 4 \cos \left( \sin^2 \left( \frac{t}{2} \right) \right) e^{-it} dt = 0.464599 \quad (45)$$

$n = 2 :$

$$a_2 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 4 \cos \left( \sin^2 \left( \frac{t}{2} \right) \right) \cos(2t) dt = -0.21486 \quad (46)$$

$$b_2 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 4 \cos \left( \sin^2 \left( \frac{t}{2} \right) \right) \sin(2t) dt = 0 \quad (47)$$

$$c_2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 4 \cos \left( \sin^2 \left( \frac{t}{2} \right) \right) e^{-2it} dt = -0.10743 \quad (48)$$

#### 1.2.4 Построение графиков частичных сумм $F_N$ , $G_N$

...

#### 1.2.5 Равенство Парсеваля

...

### 1.3 Любая нечетная периодическая функция.

$$f(t) = \begin{cases} -\pi, & t \in [-\pi, 0), \\ \pi, & t \in [0, \pi) \end{cases} \quad (49)$$

#### 1.3.1 График функции




Рис. 3. График функции  $f(t)$ .

#### 1.3.2 Частичные суммы Фурье

Рассмотрим частичные суммы Фурье  $F_N$  и  $G_N$  вида

$$F_N(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos(\omega_n t) + b_n \sin(\omega_n t)), \quad (50)$$

$$G_N(t) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{i\omega_n t}, \quad (51)$$

где  $\omega_n = 2\pi \frac{n}{T}$ .

Аналогично,  $T = 2\pi$ , следовательно,  $\omega_n = n$ :

$$F_N(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt)) , \quad (52)$$

$$G_N(t) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{int} , \quad (53)$$

### 1.3.3 Вычисление коэффициентов $a_n$ , $b_n$ и $c_n$

Запишем формулы для вычисления коэффициентов  $a_n$ ,  $b_n$  и  $c_n$  :

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_h^{h+T} f(t) dt = - \int_{-\pi}^0 1 dt + \int_0^{\pi} 1 dt = -(0 - (-\pi)) + \pi = 0 \quad (54)$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{T} \int_h^{h+T} f(t) \cos(nt) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 -\pi \cos(nt) dt + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \pi \cos(nt) dt = \\ &= - \int_{-\pi}^0 \cos(nt) dt + \int_0^{\pi} \cos(nt) dt = 0 \end{aligned} \quad (55)$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{T} \int_h^{h+T} f(t) \sin(nt) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 -\pi \sin(nt) dt + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \pi \sin(nt) dt = \\ &= - \int_{-\pi}^0 \sin(nt) dt + \int_0^{\pi} \sin(nt) dt = \end{aligned} \quad (56)$$

$$c_n = \frac{1}{T} \int_h^{h+T} f(t) e^{-i\omega_n t} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 4 \cos\left(\sin^2\left(\frac{t}{2}\right)\right) e^{-int} dt \quad (57)$$

### 1.3.4 Построение графиков частичных сумм $F_N$ , $G_N$

...

### 1.3.5 Равенство Парсеваля

...

**1.4 Любая периодическая функция, график которой состоит не только из прямых линий, и которая не является ни четной, ни нечетной.**

$$f(t) = \cos(t + 1) \quad (58)$$

#### 1.4.1 График функции




Рис. 4. График функции  $f(t)$ .

#### 1.4.2 Частичные суммы Фурье

#### 1.4.3 Вычисление коэффициентов $a_n$ , $b_n$ и $c_n$

#### 1.4.4 Построение графиков частичных сумм $F_N$ , $G_N$

...

#### 1.4.5 Равенство Парсеваля

...