Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Лабораторная работа № 5 "Связь непрерывного и дискретного "

по дисциплине Частотные методы

Выполнила: студентка гр. R3238


Нечаева А. А.

Преподаватель: Перегудин Алексей Алексеевич

1 Задание. Непрерывное и дискретное преобразование Фурье.

Рассмотрим прямоугольную функцию $\Pi: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

$$\Pi(t) = \begin{cases} 1, & |t| \le 1/2, \\ 0, & |t| > 1/2 \end{cases}$$
 (1)




 $Puc.\ 1.\ \Gamma paфик исходной функции <math>\Pi(t)$.

1.1 Истинный Фурье-образ.

Найдем аналитическое выражение для Фурье-образа

$$\hat{\Pi}(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} \Pi(t)e^{-2\pi i\nu t} dt = \int_{-0.5}^{0.5} e^{-2\pi i\nu t} dt = -\frac{e^{-2\pi i\nu t}}{2\pi i\nu} \Big|_{-0.5}^{0.5} =$$

$$= -\frac{e^{-\pi i\nu} - e^{\pi i\nu}}{2\pi i\nu} = \frac{e^{\pi i\nu} - e^{-\pi i\nu}}{2\pi i\nu} = \frac{\sin(\pi\nu)}{\pi\nu} = \sin(\pi\nu) \quad (2)$$



 $Puc.\ 2.\ \Gamma paфик\ \Phi ypьe-образа\ функции\ \Pi(t).$

1.2 Численное интегрирование

- 2 Задание. Сэмплирование.
- 2.1 Сэмплирование синусов
- 2.2 Сэмплирование sinus cardinalis