

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И
ОПТИКИ

Факультет систем управления и робототехники

Лабораторная работа № 2 "Тригонометрические ряды Фурье"

по дисциплине "Математический анализ"

Вариант № 20

Выполнила: студентка гр. **R3138**

Нечаева А. А.

Преподаватель: *Бойцев А. А.*

Санкт-Петербург, 2023

1 Аналитическая часть

Заданная функция:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1); \\ 2 - x, & x \in [1, 2]. \end{cases} \quad (1)$$

1.1 Построение общего тригонометрического ряда

Период: $T = 2l = 2 \rightarrow l = 1$. $f(x + 2l) = f(x)$ и $f(x)$ определена на $[0, 2]$. Преобразуем:

$$0 \leq x \leq 2 \rightarrow 0 \leq \pi x \leq 2\pi \rightarrow -\pi \leq \pi(x - 1) \leq \pi$$

Новая переменная $t = \pi(x - 1)$. Выразим $x = \frac{t}{\pi} + 1$ и запишем новую функцию $\phi(t) = f(\frac{t}{\pi} + 1)$. $\phi(t)$ определена на отрезке $[-\pi, \pi]$ и имеет период $T = 2\pi$.

Функция $\phi(t)$ удовлетворяет условию теоремы Дирихле о разложении периодической функции в ряд Фурье.

$$\phi(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt)),$$

где a_0, a_n, b_n — коэффициенты Фурье:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \phi(t) dt, \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \phi(t) \cos(nt) dt, \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \phi(t) \sin(nt) dt. \end{aligned}$$

Проведем обратную замену $t = \pi(x - 1)$:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(\pi n(x - 1)) + b_n \sin(\pi n(x - 1))),$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^2 f(x) \pi dx = \int_0^2 f(x) dx,$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^2 f(x) \cos(\pi n(x-1)) \pi dx = \int_0^2 f(x) \cos(\pi n(x-1)) dx,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^2 f(x) \sin(\pi n(x-1)) \pi dx = \int_0^2 f(x) \sin(\pi n(x-1)) dx.$$

Вычислим значения коэффициентов:

$$a_0 = \int_0^2 f(x) dx = \int_0^1 0 dx + \int_1^2 2-x dx = \frac{1}{2}$$

$$a_n = \int_0^2 f(x) \cos(\pi n(x-1)) dx = \int_1^2 (2-x) \cos(\pi n(x-1)) dx \quad \square$$

Вычислим неопределенный интеграл:

$$\begin{aligned} \int (2-x) \cos(\pi n(x-1)) dx &= \left\| \begin{array}{l} v = 2-x \\ du = \cos(\pi n(x-1)) dx \end{array} \quad \begin{array}{l} dv = -dx \\ u = \frac{\sin(\pi n(x-1))}{\pi n} \end{array} \right\| = \\ &= \frac{(2-x) \sin(\pi n(x-1))}{\pi n} + \frac{1}{\pi n} \int \sin(\pi n(x-1)) dx = \\ &= \frac{(2-x) \sin(\pi n(x-1))}{\pi n} - \frac{\cos(\pi n(x-1))}{(\pi n)^2} + C \end{aligned}$$

$$\square = -\frac{\cos(\pi n)}{(\pi n)^2} + \frac{\cos(0)}{(\pi n)^2} = \frac{1}{(\pi n)^2} - \frac{(-1)^n}{(\pi n)^2}$$

$$b_n = \int_0^2 f(x) \sin(\pi n(x-1)) dx = \int_1^2 (2-x) \sin(\pi n(x-1)) dx \quad \square$$

Вычислим неопределенный интеграл:

$$\begin{aligned}
 \int (2-x) \sin(\pi n(x-1)) dx &= \left\| \begin{array}{l} v = 2-x \\ du = \sin(\pi n(x-1)) dx \end{array} \quad \begin{array}{l} dv = -dx \\ u = -\frac{\cos(\pi n(x-1))}{\pi n} \end{array} \right\| = \\
 &= -\frac{(2-x) \cos(\pi n(x-1))}{\pi n} - \frac{1}{\pi n} \int \cos(\pi n(x-1)) dx = \\
 &= -\frac{(2-x) \cos(\pi n(x-1))}{\pi n} - \frac{\sin(\pi n(x-1))}{(\pi n)^2} + C \\
 &\quad \boxed{=} \frac{1}{\pi n}
 \end{aligned}$$

Запишем итоговую формулу для разложения в тригонометрический ряд Фурье:

$$f(x) = \frac{1}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\left(\frac{1}{(\pi n)^2} - \frac{(-1)^n}{(\pi n)^2} \right) \cos(\pi n(x-1)) + \left(\frac{1}{\pi n} \right) \sin(\pi n(x-1)) \right)$$

1.2 Построение ряда Фурье по синусам

1.3 Построение ряда Фурье по косинусам