

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Отчет по проектной работе

"Движение частицы с зарядом q и массой m в кулоновском поле неподвижной частицы с зарядом Q "

по дисциплине Электричество и магнетизм

Выполнили: студенты

Нечаева А. А.
Попов В. А.

Преподаватель: *Смирнов Александр Витальевич*

Санкт-Петербург, 2023-2024

1 Постановка задачи.

Рассмотреть движение частицы с зарядом q и массой m в кулоновском поле другой частицы с зарядом Q , положение которой зафиксировано. Построить траекторию движения в плоскости линии зарядов – начальная скорость частицы с заданным начальным расстоянием между зарядами и заданным вектором начальной скорости. Провести моделирование для случая зарядов одного знака и разных знаков.

2 Построение математической модели.

Движение заряженной частицы в кулоновском поле другой частицы описывается с помощью закона *Ньютона* и закона *Кулона*.

$$F = k \frac{qQ}{r^2}, \quad (1)$$

где F – сила Кулона, $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$, q – заряд первой частицы, Q – заряд второй, неподвижной, частицы, r – расстояние между ними.

В векторной форме:

$$\vec{F} = -k \frac{qQ}{r^3} \vec{r}, \quad (2)$$

Знак "минус" возникает при разноименных зарядах, которые притягиваются, действительно, сила F стремится сократить расстояние между частицами. При моделировании в случае взаимодействия частиц с одинаковым знаком заряда будем использовать аналогичную формулу, но без знака "минус".

В системе координат, начало которой привязано к телу с большой массой и зарядом Q , уравнения модели имеют вид:

$$\begin{cases} m \frac{dv_x}{dt} = -k \frac{qQx}{(x^2+y^2)^{3/2}}, & v_x = \frac{dx}{dt} \\ m \frac{dv_y}{dt} = -k \frac{qQy}{(x^2+y^2)^{3/2}}, & v_y = \frac{dy}{dt} \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} x'' + \frac{kqQ}{m} \frac{x}{(x^2+y^2)^{3/2}} = 0 \\ y'' + \frac{kqQ}{m} \frac{y}{(x^2+y^2)^{3/2}} = 0 \end{cases} \quad (4)$$

Начальные условия определяются двумя параметрами: начальной скоростью и углом α .

$$\begin{cases} x(0) = x_0 \\ y(0) = y_0 \\ v_{x0} = v_0 \cos \alpha \\ v_{y0} = v_0 \sin \alpha \end{cases} \quad (5)$$

Пусть q и Q одного знака, тогда запишем выражение для силы Кулона, действующую

Для визуализации был написан код на языке *Python*.

Код расположен на **GitHub**.