

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  
образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

## Лабораторная работа № 4 "Динамические системы"

по дисциплине Практическая линейная алгебра

Выполнила: студентка гр. **R3238**

**Нечаева А. А.**

Преподаватель: *Перегудин Алексей Алексеевич*

Санкт-Петербург, 2023-2024

*В этой лабораторной мы будем работать с непрерывными ( $t \in \mathbb{R}$ ) и дискретными ( $k \in \mathbb{Z}$ ) линейными динамическими системами второго порядка вида*

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = a_1x_1(t) + a_2x_2(t), \\ \dot{x}_2(t) = a_3x_1(t) + a_4x_2(t) \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} x_1(k+1) = a_1x_1(k) + a_2x_2(k), \\ x_2(k+1) = a_3x_1(k) + a_4x_2(k) \end{cases} \quad (2)$$

в более компактной форме:

$$\dot{x}(t) = Ax(t), \quad (3)$$

$$x(k+1) = Ax(k), \quad (4)$$

где  $x(\cdot) \in \mathbb{R}^2, \mathbb{R}^{2 \times 2}$ .

# 1 задание. Придумать непрерывное.

Зададимся двумя неколлинеарными векторами  $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^2$ , не лежащими на координатных осях:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad (5)$$

Придумаем непрерывные динамические системы:

## 1.1

*Система асимптотически устойчива, при этом если  $x(0) = v_1$ , то  $x(t) \in \text{Span}\{v_1\}$ , а если  $x(0) = v_2$ , то  $x(t) \in \text{Span}\{v_2\}$  при всех  $t \geq 0$ .*

Обратимся к уравнению  $\dot{x}(t) = Ax(t)$ ,  $x(0) = x_0$  и к его решению:  $x(t) = e^{At}x_0$ .

1. Система асимптотически устойчива, значит выполнено  $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$ .
2. Выберем матрицу с двумя совпадающими **отрицательными** собственными числами, например:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (6)$$

Собственные числа  $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$ ,  
собственные векторы  $w_1 = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $w_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix}$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ .

## 1.2

*Система неустойчива, при этом у матрицы  $A$  не существует двух неколлинеарных собственных векторов.*

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \quad (7)$$

Собственные числа:  $\lambda_1 = 4$ ,  $\lambda_2 = 4$ , собственные векторы соответственно  $w_1 = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $w_2 = \begin{pmatrix} b \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ .

### 1.3

Система неустойчива, при этом если  $x(0) = v_1$ , то  $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$ .

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -16 & 0 \end{pmatrix} \quad (8)$$

Собственные числа:  $\lambda_1 = 4$ ,  $\lambda_2 = -4$ , собственные векторы соответственно  $w_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $w_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ .

### 1.4

Система асимптотически устойчива, при этом матрица  $A \in \mathbb{R}^2$  имеет комплексные собственные вектора вида  $v_1 \pm v_2 i \in \mathbb{C}^2$ .

Сначала запишем собственные векторы искомой матрицы:

$$w_1 = \begin{pmatrix} 1 + 2i \\ 4 + 3i \end{pmatrix} \quad w_2 = \begin{pmatrix} 1 - 2i \\ 4 - 3i \end{pmatrix} \quad (9)$$

Будем искать матрицу записав ее спектральное разложение  $A = V \cdot D \cdot V^{-1}$ , где  $V$  – матрица, составленная из собственных векторов матрицы  $A$ ,  $D$  – матрица, на главной диагонали которой расположены собственные числа.

$$A = \begin{pmatrix} 1 + 2i & 1 - 2i \\ 4 + 3i & 4 - 3i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 + i & 0 \\ 0 & -1 - i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 + 2i & 1 - 2i \\ 4 + 3i & 4 - 3i \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} \quad (10)$$

Искомая матрица:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} \quad (11)$$

### 1.5

Система неустойчива, при этом матрица  $A$  имеет такие же собственные вектора, как в предыдущем пункте.

Аналогично будем искать матрицу записав ее спектральное разложение  $A = V \cdot D \cdot V^{-1}$ , где  $V$  – матрица, составленная из собственных векторов матрицы  $A$ ,  $D$  – матрица, на главной диагонали которой расположены собственные числа.

$$A = \begin{pmatrix} 1+2i & 1-2i \\ 4+3i & 4-3i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1+i & 0 \\ 0 & 1-i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1+2i & 1-2i \\ 4+3i & 4-3i \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} \quad (12)$$

Искомая матрица:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} \quad (13)$$

## 1.6

*Система не является асимптотически устойчивой, но не является и неустойчивой, при этом матрица  $A$  имеет собственные векторы такие же, как в пункте 4.*

Вновь будем искать матрицу записав ее спектральное разложение  $A = V \cdot D \cdot V^{-1}$ , где  $V$  – матрица, составленная из собственных векторов матрицы  $A$ ,  $D$  – матрица, на главной диагонали которой расположены собственные числа.

$$A = \begin{pmatrix} 1+2i & 1-2i \\ 4+3i & 4-3i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1+2i & 1-2i \\ 4+3i & 4-3i \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} \quad (14)$$

Искомая матрица:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} \quad (15)$$

## 2 задание. За моделировать непрерывное.

### 2.1

Система асимптотически устойчива, при этом если  $x(0) = v_1$ , то  $x(t) \in \text{Span}\{v_1\}$ , а если  $x(0) = v_2$ , то  $x(t) \in \text{Span}\{v_2\}$  при всех  $t \geq 0$ .

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (16)$$




Рис. 1. Моделирование при  $x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ .



Рис. 2. Моделирование при  $x_0 = \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \end{pmatrix}$ .



Рис. 3. Моделирование при  $x_0 = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \end{pmatrix}$ .




Рис. 4. Моделирование 1 при  $1: x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $2: x_0 = \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \end{pmatrix}$ ,  $3: x_0 = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \end{pmatrix}$ .

На приведенных выше графиках проиллюстрирована асимптотически устойчивая система, ведь  $\lim_{t \rightarrow \infty} x_1(t) = 0$  и  $\lim_{t \rightarrow \infty} x_2(t) = 0$ .



## 2.2

Система неустойчива, при этом у матрицы  $A$  не существует двух неколлинеарных собственных векторов.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \quad (17)$$




Рис. 5. Моделирование 2 при 1:  $x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ , 2:  $x_0 = \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \end{pmatrix}$ , 3:  $x_0 = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \end{pmatrix}$ .

Заметим, что система является неустойчивой, так как существуют такие начальные условия, что  $\lim_{t \rightarrow \infty} x_1(t) = \infty$  и  $\lim_{t \rightarrow \infty} x_2(t) = \infty$ .

## 2.3

Система неустойчива, при этом если  $x(0) = v_1$ , то  $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$ .

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -16 & 0 \end{pmatrix} \quad (18)$$



Рис. 6. Моделирование 3 при 1:  $x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ , 2:  $x_0 = \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \end{pmatrix}$ , 3:  $x_0 = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \end{pmatrix}$ .




Рис. 7. Моделирование 3 при  $x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ .

Система неустойчива в общем случае, но при  $x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$

## 2.4

Система асимптотически устойчива, при этом матрица  $A \in \mathbb{R}^2$  имеет комплексные собственные вектора вида  $v_1 \pm v_2 i \in \mathbb{C}^2$ .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} \quad (19)$$




Рис. 8. Моделирование 4 при 1:  $x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ , 2:  $x_0 = \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \end{pmatrix}$ , 3:  $x_0 = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \end{pmatrix}$ .




Рис. 9. Моделирование 4, только зависимости  $x(t)$ ,  
при 1 :  $x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ , 2 :  $x_0 = \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \end{pmatrix}$ , 3 :  $x_0 = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \end{pmatrix}$ .

Полученные графики подтверждают асимптотическую устойчивость системы,  $\lim_{t \rightarrow \infty} x_1(t) = 0$  и  $\lim_{t \rightarrow \infty} x_2(t) = 0$ .

## 2.5

Система неустойчива, при этом матрица  $A$  имеет такие же собственные вектора, как в предыдущем пункте.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} \quad (20)$$




Рис. 10. Моделирование 5 при  $1: x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $2: x_0 = \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \end{pmatrix}$ ,  $3: x_0 = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \end{pmatrix}$ .



Рис. 11. Моделирование 5, только зависимости  $x(t)$ ,  
при 1 :  $x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ , 2 :  $x_0 = \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \end{pmatrix}$ , 3 :  $x_0 = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \end{pmatrix}$ .

Заметим, что система действительно является неустойчивой, так как кривые  $x_1(t)$ ,  $x_2(t)$  стремятся к  $-\infty$  для заданных начальных условий.

## 2.6

Система не является асимптотически устойчивой, но не является и неустойчивой, при этом матрица  $A$  имеет собственные векторы такие же, как в пункте 4.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} \quad (21)$$




Рис. 12. Моделирование 6 при 1:  $x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ , 2:  $x_0 = \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \end{pmatrix}$ , 3:  $x_0 = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \end{pmatrix}$ .






Рис. 13. Моделирование 6, только зависимости  $x(t)$ ,  
при 1 :  $x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ , 2 :  $x_0 = \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \end{pmatrix}$ , 3 :  $x_0 = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \end{pmatrix}$ .




Рис. 14. Моделирование 6, только зависимости  $x_2(x_1)$ ,  
при 1:  $x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ , 2:  $x_0 = \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \end{pmatrix}$ , 3:  $x_0 = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \end{pmatrix}$ .

Система является не является ни асимптотически устойчивой, ни неустойчивой. Во-первых, функции  $x_1(t)$ ,  $x_2(t)$  не стремятся ни к нулю, ни к бесконечности при  $t \rightarrow \infty$ , а траектории  $x_2(x_1)$  замкнуты, значит система обладает просто устойчивостью.

### 3 задание. Придумать дискретное.

Придумать дискретные динамические системы, обладающие следующими собственными числами (при этом ни одна из придуманных матриц  $A$  не должна быть диагональной):

**3.1**  $\lambda_{1,2} = -1$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (22)$$



Рис. 15. Изображение собственных чисел  $w_{1,2}$  ( $\lambda_{1,2}$ ) на комплексной плоскости.

**3.2**  $\lambda_{1,2} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \pm \frac{1}{\sqrt{2}}i$

$$\left(\lambda + \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}i\right) \left(\lambda + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i\right) = 0 \quad (23)$$

$$\lambda \left(\lambda + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i\right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\lambda + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i\right) - \frac{1}{\sqrt{2}}i \left(\lambda + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i\right) = 0 \quad (24)$$

$$\lambda^2 + \frac{1}{\sqrt{2}}\lambda + \frac{1}{\sqrt{2}}i\lambda + \lambda\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}i\lambda - \frac{1}{\sqrt{2}}i\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}i\frac{1}{\sqrt{2}}i = 0 \quad (25)$$

$$\lambda^2 + \frac{2\lambda}{\sqrt{2}} + 1 = 0 \quad (26)$$

$$\left( \lambda^2 + \frac{2\lambda}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} = 0 \quad (27)$$

$$\left( \lambda + \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 + \frac{1}{2} = 0 \quad (28)$$

Искомая матрица:

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \quad (29)$$




Рис. 16. Изображение собственных чисел  $w_{1,2}$  ( $\lambda_{1,2}$ ) на комплексной плоскости.

### 3.3 $\lambda_{1,2} = \pm i$

$$(\lambda + i)(\lambda - i) = 0 \quad (30)$$

$$\lambda^2 + 1 = 0 \quad (31)$$

Пусть искомая матрица имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ 1 & b \end{pmatrix} \quad (32)$$

Тогда характеристический полином:

$$(a - \lambda)(b - \lambda) - c = 0 \quad (33)$$

$$\lambda^2 - \lambda(a + b) + ab - c = \lambda^2 + 1 = 0 \quad (34)$$

$$\begin{cases} a = -b \\ ab - c = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = -b \\ -a^2 - c = 1 \end{cases} \quad (35)$$

Пусть  $a = 1$ , тогда  $b = -1$ ,  $c = -2$ .

Искомая матрица:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (36)$$




Рис. 17. Изображение собственных чисел  $w_{1,2}$  ( $\lambda_{1,2}$ ) на комплексной плоскости.

$$3.4 \quad \lambda_{1,2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \pm \frac{1}{\sqrt{2}}i$$

$$\left(\lambda - \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}i\right) \left(\lambda - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i\right) = 0 \quad (37)$$

$$\lambda \left(\lambda - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i\right) - \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\lambda - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i\right) - \frac{1}{\sqrt{2}}i \left(\lambda - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i\right) = 0 \quad (38)$$

$$\lambda^2 - \frac{\lambda}{\sqrt{2}} + \frac{\lambda}{\sqrt{2}}i - \frac{\lambda}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i - \frac{\lambda}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{2}i + \frac{1}{2} = 0 \quad (39)$$

$$\lambda^2 - \frac{2\lambda}{\sqrt{2}} + 1 = 0 \quad (40)$$

$$\left(\lambda^2 - \frac{2\lambda}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} = 0 \quad (41)$$

$$\left(\lambda - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \frac{1}{2} = 0 \quad (42)$$

Искомая матрица:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \\ -1 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \quad (43)$$




Рис. 18. Изображение собственных чисел  $w_{1,2}$  ( $\lambda_{1,2}$ ) на комплексной плоскости.

**3.5**  $\lambda_{1,2} = 1$ 

$$(\lambda - 1)^2 = \lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0 \quad (44)$$

Пусть искомая матрица имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ 1 & b \end{pmatrix} \quad (45)$$

Тогда характеристический полином:

$$(a - \lambda)(b - \lambda) - c = 0 \quad (46)$$

$$\lambda^2 - \lambda(a + b) + ab - c = \lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0 \quad (47)$$

$$\begin{cases} a + b = 2 \\ ab - c = 1 \end{cases} \quad (48)$$

Пусть  $a = \frac{1}{2}$ ,  $b = \frac{3}{2}$ , тогда  $c = -\frac{1}{4}$ .

Искомая матрица:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ 1 & \frac{3}{2} \end{pmatrix} \quad (49)$$




Рис. 19. Изображение собственных чисел  $w_{1,2}$  ( $\lambda_{1,2}$ ) на комплексной плоскости.

Для следующих пунктов выберем константы:  $c = \frac{1}{2}$ ,  $d = 2$ .

**3.6**  $\lambda_{1,2} = -\frac{1}{2}$

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 1 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad (50)$$




Рис. 20. Изображение собственных чисел  $w_{1,2}$  ( $\lambda_{1,2}$ ) на комплексной плоскости.

**3.7**  $\lambda_{1,2} = \pm \frac{i}{2}$

$$\left(\lambda + \frac{i}{2}\right) \left(\lambda - \frac{i}{2}\right) = 0 \quad (51)$$

$$\lambda^2 + \frac{1}{4} = 0 \quad (52)$$

Пусть искомая матрица имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ 1 & b \end{pmatrix} \quad (53)$$



Тогда характеристический полином:

$$(a - \lambda)(b - \lambda) - c = 0 \quad (54)$$

$$\lambda^2 - \lambda(a + b) + ab - c = \lambda^2 + \frac{1}{4} = 0 \quad (55)$$

$$\begin{cases} a = -b \\ ab - c = \frac{1}{4} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = -b \\ -a^2 - c = \frac{1}{4} \end{cases} \quad (56)$$

Пусть  $a = 1$ , тогда  $b = -1$ ,  $c = -\frac{5}{4}$ .

Искомая матрица:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{5}{4} \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (57)$$




Рис. 21. Изображение собственных чисел  $w_{1,2}$  ( $\lambda_{1,2}$ ) на комплексной плоскости.

$$3.8 \quad \lambda_{1,2} = \frac{1}{2}$$

$$\left(\lambda - \frac{1}{2}\right)^2 = \lambda^2 - \lambda + \frac{1}{4} = 0 \quad (58)$$

Пусть искомая матрица имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ 1 & b \end{pmatrix} \quad (59)$$

Тогда характеристический полином:

$$(a - \lambda)(b - \lambda) - c = 0 \quad (60)$$

$$\lambda^2 - \lambda(a + b) + ab - c = \lambda^2 - \lambda + \frac{1}{4} = 0 \quad (61)$$

$$\begin{cases} a + b = 1 \\ ab - c = \frac{1}{4} \end{cases} \quad (62)$$

Пусть  $a = \frac{1}{4}$ ,  $b = \frac{3}{4}$ , тогда  $c = -\frac{1}{16}$ .

Искомая матрица:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{16} \\ 1 & \frac{3}{4} \end{pmatrix} \quad (63)$$




Рис. 22. Изображение собственных чисел  $w_{1,2}$  ( $\lambda_{1,2}$ ) на комплексной плоскости.

**3.9**  $\lambda_{1,2} = -2$ 

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \quad (64)$$




Рис. 23. Изображение собственных чисел  $w_{1,2}$  ( $\lambda_{1,2}$ ) на комплексной плоскости.

**3.10**  $\lambda_{1,2} = \pm 2i$ 

$$(\lambda + 2i)(\lambda - 2i) = 0 \quad (65)$$

$$\lambda^2 + 4 = 0 \quad (66)$$

Пусть искомая матрица имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ 1 & b \end{pmatrix} \quad (67)$$

Тогда характеристический полином:

$$(a - \lambda)(b - \lambda) - c = 0 \quad (68)$$

$$\lambda^2 - \lambda(a + b) + ab - c = \lambda^2 + 4 = 0 \quad (69)$$

$$\begin{cases} a = -b \\ ab - c = 4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = -b \\ -a^2 - c = 4 \end{cases} \quad (70)$$

Пусть  $a = 1$ , тогда  $b = -1$ ,  $c = -5$ .

Искомая матрица:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (71)$$




Рис. 24. Изображение собственных чисел  $w_{1,2}$  ( $\lambda_{1,2}$ ) на комплексной плоскости.

**3.11**  $\lambda_{1,2} = 2$ 

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad (72)$$




Рис. 25. Изображение собственных чисел  $w_{1,2}$  ( $\lambda_{1,2}$ ) на комплексной плоскости.

**3.12**  $\lambda_{1,2} = 0$ 

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (73)$$




Рис. 26. Изображение собственных чисел  $w_{1,2}$  ( $\lambda_{1,2}$ ) на комплексной плоскости.

## 4 задание. Замоделировать дискретное.

### 4.1 $\lambda_{1,2} = -1$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (74)$$




Рис. 27. Моделирование 1, графики зависимости  $x_1(k)$ ,  $x_2(k)$  при 1:  $x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ , 2:  $x_0 = \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \end{pmatrix}$ , 3:  $x_0 = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \end{pmatrix}$ .

$$4.2 \quad \lambda_{1,2} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \pm \frac{1}{\sqrt{2}}i$$

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \quad (75)$$




Рис. 28. Моделирование 2, графики зависимости  $x_1(k)$ ,  $x_2(k)$

при 1:  $x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ , 2:  $x_0 = \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \end{pmatrix}$ , 3:  $x_0 = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \end{pmatrix}$ .

### 4.3 $\lambda_{1,2} = \pm i$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (76)$$




Рис. 29. Моделирование 3, графики зависимости  $x_1(k)$ ,  $x_2(k)$  при 1 :  $x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ , 2 :  $x_0 = \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \end{pmatrix}$ , 3 :  $x_0 = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \end{pmatrix}$ .



$$4.4 \quad \lambda_{1,2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \pm \frac{1}{\sqrt{2}}i$$

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \\ -1 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \quad (77)$$




Рис. 30. Моделирование 4, графики зависимости  $x_1(k)$ ,  $x_2(k)$  при 1:  $x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ , 2:  $x_0 = \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \end{pmatrix}$ , 3:  $x_0 = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \end{pmatrix}$ .

4.5  $\lambda_{1,2} = 1$ 

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ 1 & \frac{3}{2} \end{pmatrix} \quad (78)$$




Рис. 31. Моделирование 5, графики зависимости  $x_1(k)$ ,  $x_2(k)$  при 1:  $x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ , 2:  $x_0 = \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \end{pmatrix}$ , 3:  $x_0 = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \end{pmatrix}$ .

**4.6**  $\lambda_{1,2} = -\frac{1}{2}$

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 1 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad (79)$$




Рис. 32. Моделирование 6, графики зависимости  $x_1(k)$ ,  $x_2(k)$  при 1:  $x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ , 2:  $x_0 = \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \end{pmatrix}$ , 3:  $x_0 = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \end{pmatrix}$ .

$$4.7 \quad \lambda_{1,2} = \pm \frac{i}{2}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{5}{4} \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (80)$$




Рис. 33. Моделирование 7, графики зависимости  $x_1(k)$ ,  $x_2(k)$  при 1:  $x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ , 2:  $x_0 = \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \end{pmatrix}$ , 3:  $x_0 = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \end{pmatrix}$ .

$$4.8 \quad \lambda_{1,2} = \frac{1}{2}$$

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{16} \\ 1 & \frac{3}{4} \end{pmatrix} \quad (81)$$




Рис. 34. Моделирование 8, графики зависимости  $x_1(k)$ ,  $x_2(k)$  при 1:  $x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ , 2:  $x_0 = \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \end{pmatrix}$ , 3:  $x_0 = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \end{pmatrix}$ .

4.9  $\lambda_{1,2} = -2$ 

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \quad (82)$$




Рис. 35. Моделирование 9, графики зависимости  $x_1(k)$ ,  $x_2(k)$  при 1 :  $x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ , 2 :  $x_0 = \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \end{pmatrix}$ , 3 :  $x_0 = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \end{pmatrix}$ .

4.10  $\lambda_{1,2} = \pm 2i$ 

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (83)$$




Рис. 36. Моделирование 10, графики зависимости  $x_1(k)$ ,  $x_2(k)$

при  $1: x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $2: x_0 = \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \end{pmatrix}$ ,  $3: x_0 = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \end{pmatrix}$ .

4.11  $\lambda_{1,2} = 2$ 

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad (84)$$




Рис. 37. Моделирование 11, графики зависимости  $x_1(k)$ ,  $x_2(k)$  при 1:  $x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ , 2:  $x_0 = \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \end{pmatrix}$ , 3:  $x_0 = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \end{pmatrix}$ .



4.12  $\lambda_{1,2} = 0$ 

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (85)$$




Рис. 38. Моделирование 12, графики зависимости  $x_1(k)$ ,  $x_2(k)$

при 1 :  $x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ , 2 :  $x_0 = \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \end{pmatrix}$ , 3 :  $x_0 = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \end{pmatrix}$ .

Графики иллюстрируют соответствие условия асимптотической устойчивости  $|\lambda| < 1$  и полученных характеристик движения систем (например, под номерами 6, 7, 8, 12).

## 5 задание. Осциллятор?

Рассмотрим непрерывную систему вида

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = ax_1 + bx_2 \end{cases} \quad (86)$$

Запишем соответствующую данной системе матрицу  $A$ :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ a & b \end{pmatrix} \quad (87)$$

И характеристический полином:

$$\lambda(\lambda - b) - a = 0 \quad (88)$$

$$\lambda^2 - b\lambda - a = 0 \quad (89)$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{b}{2} \pm \frac{\sqrt{4a - b^2}i}{2} \quad (90)$$

Проанализируем устойчивость и характер движения данной системы при

### 5.1 $a < 0, b = 0$

Соответствующий характеристический полином:

$$\lambda^2 - a = 0 \quad (91)$$

Собственные значения:  $\lambda_{1,2} = \pm\sqrt{a}i$ , система устойчива, так как  $Re(\lambda_{1,2}) = 0$ .

Физическая система: *математический маятник без трения.*

### 5.2 $a < 0, b < 0$

Система будем неустойчивой.

$$\lambda_{1,2} = \frac{b}{2} \pm \frac{\sqrt{4a - b^2}i}{2} = \frac{b}{2} \pm \frac{\sqrt{-(4|a| + b^2)}i}{2} = \frac{b}{2} \mp \frac{\sqrt{4|a| + b^2}}{2} \quad (92)$$

Отсюда  $Re(\lambda_2) = \frac{b}{2} + \frac{\sqrt{4|a| + b^2}}{2} > 0$

Физическая система: *обратный маятник без трения.*

**5.3**  $a > 0, b = 0$ 

Соответствующий характеристический полином:

$$\lambda^2 - a = 0 \quad (93)$$

Собственные значения:  $\lambda_{1,2} = \pm\sqrt{a}$ , система неустойчива, так как хотя бы один из  $\lambda > 0$ .

Физическая система: *обратный маятник без трения*.

**5.4**  $a > 0, b < 0$ 

Система будем асимптотически устойчивой, так как  $Re(\lambda_{1,2}) = \frac{b}{2} < 0$ .

Физическая система: *математический маятник с трением*.

Для визуализации был написан код на языке *Python*.

Код расположен на **GitHub**.