ISAIAS 40:11 · 이사야 40:11

Ang Kordero na Binuhat
안아 올린 양

"...kaniyang pipisanin ang mga kordero sa kaniyang kamay, at dadalhin sila sa kaniyang sinapupunan."

"어린 양을 그 품에 안으시며"



Larawan: Ipininta ni Ps. Yang Si-on · 그림: 큰소망교회 양시온 목사님 성화 | Talata: Ang Dating Biblia (1905)

Pangkalahatan · 공통 실습



Maglakad sa Bilis na Kaya Mo

- **Magsimula sa 5–10 minuto; dagdagan nang unti-unti**
- **Layunin: 30 minuto, 5 araw sa isang linggo**
- **Kaya pang magsalita habang naglalakad**

편안한 속도로 걷기

- 처음에는 5~10분부터 시작하고 조금씩 늘리기
- 목표: 하루 30분, 주 5일
- 걸으면서 말할 수 있을 정도의 속도



Indibidwal · 개인별 운동 (may payo ng doktor)

Pagsandal sa Pader (Wall Sit)

- **Sumandal sa pader; ibaluktot nang KAUNTI lamang ang tuhod, tulad sa larawan**
- **Magsimula sa 10–30 segundo; huminga nang normal**

벽에 기대어 앉기

- 벽에 기대어 그림처럼 무릎을 조금만 굽히기
- 10~30초부터 시작, 편하게 호흡

3



Mga Pag-iingat — Ligtas na Ehersisyo

- Huwag pigilin ang hininga
- Iwasang magbuhat ng sobrang bigat
- Huwag magpuwersa nang labis
- Itigil agad kung may matinding sakit ng ulo o dibdib

주의사항 — 안전하게 운동하기

- 숨 참지 않기
- 지나치게 무거운 물건 들지 않기
- 힘껏 밀거나 버티지 않기
- 심한 두통·가슴 통증 시 즉시 중단

✔ **Huwag itigil ang gamot sa altapresyon nang walang payo ng doktor; magpasukat ng presyon sa health center nang regular.**

혈압약은 임의로 중단하지 말고, 보건소에서 정기적으로 혈압을 확인하세요.

1 Pamumuhay at Pagkain — Altapresyon

생활요법 — 고혈압

PAGKAIN · 식이

- **Bawasan ang asin: patis, toyo, bagoong, tuyo, de-lata, instant noodles**
- **Dagdagan ang gulay at prutas na mayaman sa potassium (malunggay, saging, kamote) — maliban kung may sakit sa bato**
- **Limitahan ang alak**
- 소금 줄이기: 생선젓·간장·바궁·마른 생선·통조림·라면
- 칼륨이 많은 채소·과일 늘리기 (말룽가이·바나나·고구마) — 신장질환이 있으면 제외
- 음주 제한

GAWAIN · 생활습관

- **Maglakad o mag-ehersisyo nang 30 minuto, karamihan ng araw sa linggo**
- **Bawasan ang timbang kung sobra**
- **Inumin ang gamot araw-araw; magpasukat ng presyon sa health center nang regular**
- 하루 30분, 주 대부분 걷기·운동 (주 150분 이상)
- 과체중이면 체중 감량
- 혈압약 매일 복용, 보건소에서 정기적으로 혈압 측정

IWASAN · 피할 것

- **Paninigarilyo**
- **Pagnganga — kaugnay ng sakit sa puso, diabetes at maagang pagkamatay**
- **Pagtigil ng gamot nang walang payo ng doktor**
- 흡연
- 빈랑 씹기 — 심혈관질환·당뇨·조기 사망과 관련
- 의료진 상의 없이 약 끊기


⚠ **Agad magpatingin: matinding sakit ng ulo, sakit sa dibdib, hirap huminga, o panghihina ng isang bahagi ng katawan**

즉시 진료: 심한 두통, 가슴 통증, 호흡곤란, 한쪽 팔다리 마비

출처 · Sanggunian: Whelton PK et al. 2017 ACC/AHA Guideline for High Blood Pressure in Adults. Hypertension 2018;71:e13–e115 · Yamada T et al. Betel quid and metabolic/cardiovascular disease: meta-analysis. PLoS One 2013;8:e70679

2 Nahihilo Kapag Tumatayo
일어설 때 어지러움 — 대처법

1



Pangkalahatan · 공통 실습

Bumangon sa 3 Hakbang

- **Mula sa pagkakahiga, umupo muna nang mga 30 segundo. Pagkatapos, dahan-dahang tumayo habang nakahawak sa matibay na suporta. Kung nahihilo, umupo o humiga muli.**

3단계로 일어나기

- 누운 상태에서 먼저 앉아 약 30초간 기다린 후, 튼튼한 지지대를 잡고 천천히 일어나세요. 어지러우면 다시 앉거나 누우세요.

2



Pangkalahatan · 공통 실습

Unang Gawin: Umupo o Humiga

- **Kung nahihilo kapag tumatayo, umupo o humiga muna sa ligtas na lugar. Huwag piliting maglakad.**
- **Kapag ligtas na nakatayo at may hawak: ikrus ang mga binti at higpitan ang hita at pigi nang 30 segundo**

첫 번째 행동: 앉거나 눕기

- 일어설 때 어지러우면 먼저 안전한 곳에 앉거나 눕습니다. 억지로 걷지 않습니다.
- 안전하게 서서 지지대를 잡을 수 있을 때만: 다리를 꼬고 허벅지·엉덩이 근육 30초 조이기

✔ **Tandaan: Kumilos nang dahan-dahan · Huwag biglang tumayo · Uminom ng sapat na tubig (maliban kung may limitasyon sa tubig mula sa doktor — sakit sa puso o bato) · Kung sobrang hilo, umupo o humiga agad**

기억하세요: 천천히 움직이기 · 갑자기 일어서지 않기 · 물 충분히(심장·신장질환으로 수분 제한이 있으면 의료진 지시 따르기) · 많이 어지러우면 즉시 앉거나 눕기

Kung lumalala ang sakit, huminto. Kung may kakaibang sintomas, magpatingin sa health center. · 통증이 심해지면 멈춥니다. 평소와 다른 증상이 생기면 보건의료기관에서 진료받으세요.



Pangkalahatan · 공통 실습

Pagtaas ng Sakong (Heel Raise)

- Pinalalakas ang 'bomba' ng kalamnan sa binti
- 20 beses × 2 set

발뒤꿈치 들기

- 종아리 근육 펌프 강화
- 20회 × 2세트





Pangkalahatan · 공통 실습

Kumuyom at Buksan ang Kamao

- Gawin lamang habang ligtas na nakaupo o may hawak na suporta
- Kung parang mahihimatay: umupo o humiga MUNA
- Ulit-ulitin nang banayad

주먹 쥐었다 펴기

- 안전하게 앉아 있거나 지지대를 잡은 상태에서만
- 쓰러질 것 같으면 운동보다 먼저 앉거나 눕기
- 가볍게 반복

2 Pamumuhay at Pagkain — Nahihilo Kapag Tumatayo

생활요법 — 일어설 때 어지러움

PAGKAIN · 식이

- **Uminom ng sapat na tubig; 1–2 baso bago bumangon sa umaga**
- **Iwasan ang malalaking kain na maraming kanin o matamis; kumain nang kaunti pero madalas**
- **Umupo muna pagkatapos kumain bago tumayo**
- 물 충분히; 아침 기상 전 1~2잔
- 밥·단 음식이 많은 과식 피하고 조금씩 자주
- 식사 직후 잠시 앉았다가 일어나기

GAWAIN · 생활습관

- **Bumangon nang dahan-dahan, lalo na sa umaga**
- **Kapag nahihilo habang nakatayo: ikrus ang binti at higpitan ang hita — o umupo/humiga**
- **Iwasan ang init: magpahinga sa lilim, magsuot ng sombrero**
- 특히 아침에 천천히 일어나기
- 서 있다가 어지러우면 다리 꼬고 허벅지 조이기 — 또는 앉거나 눕기
- 더위 피하기: 그늘에서 쉬고 모자 쓰기

IWASAN · 피할 것


- **Alak**
- **Mabigat na trabaho sa init ng tanghali**
- **Gamot na nagpapahilo — ipaalam sa health worker para masuri**
- 술
- 한낮 더위 속 힘든 일
- 어지럼을 일으키는 약 — 보건요원에게 알려 점검

⚠ **Kung may sakit sa puso o bato na may limitasyon sa tubig o asin, sundin ang doktor · Magpatingin kung nawalan ng malay o paulit-ulit ang pagkahilo**

심장·신장질환으로 물·소금 제한이 있으면 의료진 지시에 따르기 · 실신했거나 어지럼이 반복되면 진료

출처 · Sanggunian: Gibbons CH et al. Consensus recommendations for neurogenic orthostatic hypotension. J Neurol 2017;264:1567–1582 · Freeman R et al. Consensus statement on the definition of orthostatic hypotension. Auton Neurosci 2011;161:46–48

1



Kaligtasan Muna

- **Gawin malapit sa pader o matibay na hawakan**
- **Gawin sa sahig o kama — para hindi mahulog**
- **Maraming dahilan ang pagkahilo; magpatingin muna kung hindi alam ang sanhi**

안전 수칙

- 벽이나 단단한 물건 옆에서 실시
- 바닥이나 침대 위에서 실시 — 낙상 예방
- 어지럼증은 원인이 다양하므로 원인을 모르면 먼저 진료

✔ **Kung matindi o paulit-ulit ang pagkahilo, magpatingin sa health center o doktor.**

어지럼증이 심하거나 계속되면 보건소·의료기관을 방문하세요.

Kung lumalala ang sakit, huminto. Kung may kakaibang sintomas, magpatingin sa health center. · 통증이 심해지면 멈춥니다. 평소와 다른 증상이 생기면 보건의료기관에서 진료받으세요.

3 Pamumuhay at Pagkain — Pagkahilo
생활요법 — 어지럼증

PAGKAIN · 식이

- **Kung may diabetes: huwag laktawan ang pagkain — ang mababang asukal sa dugo ay nagdudulot ng pagkahilo**
- **Uminom ng sapat na tubig**
- **Inumin ang gamot sa tamang oras; ipaalam kung may gamot na nagpapahilo**

- 당뇨가 있으면 끼니 거르지 않기 — 저혈당은 어지럼을 일으킵니다
- 물 충분히
- 약은 제때 복용하고, 어지럼을 일으키는 약은 알리기

GAWAIN · 생활습관

- **Alisin ang nakakatisod sa bahay; maglagay ng ilaw sa daan sa gabi**
- **Magsuot ng tsinelas o sapatos na may kapit; huwag maglakad nang nakayapak sa madulas**
- **Kapag nahihilo, umupo o humiga agad; huwag umakyat ng puno, bubong o matarik na daan**

- 집 안의 걸려 넘어질 물건 치우기, 밤길에 불 켜기
- 미끄럼 방지 신발 신기; 미끄러운 곳에서 맨발 금지
- 어지러우면 바로 앉거나 눕기; 나무·지붕·가파른 길 오르지 않기

IWASAN · 피할 것

- **Pag-asa lamang sa gamot kung BPPV (umiikot ang paligid sa paggalaw ng ulo) — mas mabisa ang Epley maneuver sa health center**
- **Pampatulog o pampakalma na gamot nang walang payo**
- **Pagsakay sa motor o pag-akyat sa mataas habang nahihilo**

- 이석증(BPPV)을 약으로만 버티기 — 보건소의 이석치환술(Epley)이 더 효과적
- 의료진 상의 없는 수면제·진정제
- 어지러운 상태로 오토바이 타기·높은 곳 오르기

⚠ **Agad magpatingin: hilo na may hirap magsalita, panghihina ng isang bahagi ng katawan, matinding sakit ng ulo, o hindi makalakad**


즉시 진료: 말이 어눌함, 한쪽 마비, 심한 두통이 함께 있거나 걷지 못하는 어지럼증

출처 · Sanggunian: AGS/BGS Clinical Practice Guideline for Prevention of Falls in Older Persons. J Am Geriatr Soc 2011;59:148–157 · Bhattacharyya N et al. BPPV guideline. Otolaryngol Head Neck Surg 2017;156(3S):S1–S47 · ADA Standards of Care in Diabetes—2024, Hypoglycemia · Gibbons CH et al. J Neurol 2017;264:1567

4 Sakit ng Ulo (Tension Type) — Pag-relax ng Balikat at Leeg

긴장형 두통 — 어깨·목 이완 운동

Detalye · 상세 설명



Shoulder Shrug at Relax

- **Itaas ang balikat papunta sa tainga, saka bitawan at i-relax**
- **10 beses**
- **Huwag iyuko ang ulo nang matagal; magpahinga tuwing 30 minuto**

어깨 으쓱 후 이완

- 어깨를 귀 쪽으로 올렸다가 툭 내리며 힘 빼기
- 10회
- 고개를 오래 숙이지 않기; 30분마다 쉬기



Pangkalahatan · 공통 실습

Paglapit ng mga Talim ng Balikat

- **Umupo o tumayo nang tuwid; buksan ang dibdib**
- **Pagdikitin nang BANAYAD ang mga buto ng balikat sa likod, 5 segundo**
- **10 beses; huwag itaas ang balikat**

견갑골을 가깝게 모으기

- 바르게 앉거나 서서 가슴 펴기
- 어깨뼈를 뒤로 가볍게 모아 5초 유지
- 10회, 어깨를 으쓱하지 않기

4 Pamumuhay at Pagkain — Sakit ng Ulo

생활요법 — 긴장형 두통

PAGKAIN · 식이

- **Kumain sa tamang oras — ang paglaktaw ng pagkain (pag-aayuno) ay nagdudulot ng sakit ng ulo**
- **Kung araw-araw nagkakape, huwag biglang itigil — bawasan nang unti-unti**
- **Limitahan ang alak**
- 제때 먹기 — 끼니를 거르면(공복) 두통이 생깁니다
- 매일 커피를 마신다면 갑자기 끊지 말고 서서히 줄이기
- 음주 제한

GAWAIN · 생활습관

- **Regular na oras ng tulog, 7–8 oras bawat gabi**
- **Bilangin kung ilang araw sa isang buwan sumasakit ang ulo; sabihin sa health worker**
- **Gawin ang ehersisyo sa balikat at leeg na nasa pahina 11**
- 매일 같은 시간에 7~8시간 자기
- 한 달에 며칠 두통이 있는지 세어 보건요원에게 말하기
- 11쪽의 어깨·목 운동 실천

IWASAN · 피할 것

- **Gamot sa sakit ng ulo nang 15 araw o higit bawat buwan (10 araw kung pinagsamang gamot) — nagiging sanhi ng mas madalas na sakit ng ulo**
- **Alak**
- **Puyat at hindi regular na tulog**
- 두통약을 한 달에 15일 이상(복합제는 10일 이상) 복용 — 약물과용 두통의 원인
- 술
- 수면 부족과 불규칙한 수면


⚠ **Agad magpatingin: biglang napakatinding sakit ng ulo, may lagnat at paninigas ng leeg, pagsusuka, o pagbabago sa paningin**

즉시 진료: 갑자기 시작된 극심한 두통, 발열과 목 경직, 구토, 시야 이상

출처 · Sanggunian: Headache Classification Committee of the IHS. ICHD-3. Cephalalgia 2018;38:1–211 (8.1.4, 8.2, 8.3.1, 10.5) · Rains JC. Sleep and migraine. Headache 2018;58:1074–1091

Pangangalaga sa Likod — Mga Galaw na Komportable

허리 보호 — 허리가 편안한 운동과 습관



Paglalakad na Tuwid ang Likod

- **Kumilos nang dahan-dahan; piliin ang galaw na komportable sa iyong likod**
- **Patag na daan, 20–30 minuto, sa bilis na hindi masakit**
- **Suriin ang sakit habang naglalakad, pagkatapos, at kinabukasan**

허리를 편안하게 하며 걷기

- 천천히 움직이고, 허리가 편안한 동작을 선택
- 평지에서 20~30분, 아프지 않은 속도로
- 운동 중·후·다음 날의 통증 변화 확인




Suporta sa Likod gamit ang Nakarolyong Tuwalya

- **Irolyo ang tuwalya; ilagay sa ilalim ng baywang sa taas na komportable**
- **Humiga nang nakabaluktot ang tuhod, magrelaks 1 minuto.**

수건으로 허리 받치기

- 수건을 말아 편안한 높이로 허리 아래에 받치기
- 무릎을 굽히고 1분 이완.

5 Pangangalaga sa Likod — Mga Galaw na Komportable
허리 보호 — 허리가 편안한 운동과 습관




1–2 sec × 10

Pag-angat gamit ang Braso (opsyonal)

- Para sa taong GUMIGINHAWA ang likod kapag umaarko paatras
- Dumapa; kamay sa ilalim ng balikat; itulak pataas gamit ang BRASO, relaks ang likod
- Magsimula sa siko, mababa; 1–2 segundo, ibaba; hanggang 10 beses
- Huminto kung lumalala o kumakalat sa binti ang sakit

엎드려 팔로 밀어 올리기(선택)

- 뒤로 젖힐 때 허리가 편안해지는 사람만
- 엎드려 손을 어깨 아래에; 팔로 밀고 허리 힘 빼기
- 먼저 팔꿈치로 낮게; 1~2초 유지 후 내리기, 최대 10회
- 통증이 심해지거나 다리로 퍼지면 중단



Pag-arko Paatras Habang Nakatayo (opsyonal)

- Para sa taong gumiginhawa kapag umaarko paatras
- Kamay sa ibabang likod; dahan-dahang iarko, bumalik
- Hanggang 10 beses; huminto bago lumitaw ang sakit na kumakalat sa binti
- Kung may paninikip ng daanan ng ugat sa likod (spinal stenosis), maaaring lumala — magpatingin muna

선 자세에서 뒤로 젖히기 (선택)

- 뒤로 젖힐 때 편안해지는 사람만
- 손을 허리 뒤에 대고 천천히 젖혔다 복귀
- 최대 10회; 다리로 뻗치는 통증이 생기기 전까지만
- 척추관협착증이 있으면 악화될 수 있어 먼저 진료

⚠ Hindi para sa lahat: piliin ang galaw na komportable. Itigil kung kumakalat sa binti ang sakit o pamamanhid. · 모든 사람에게 맞는 운동이 아닙니다. 편안한 동작을 선택하고, 통증·저림이 다리로 퍼지면 중단하세요.




Pangangalaga sa Likod — Ligtas na Pagbubuhat

- Ibaluktot ang tuhod at balakang; tuwid ang likod; ilapit ang bagay sa katawan
- Huwag yumuko at umikot nang sabay habang may dala
- Hatiin ang mabigat na dala; humingi ng tulong

허리 보호 — 안전하게 물건 들기

- 허리만 굽히지 말고 무릎·엉덩이를 굽혀 몸 가까이에서
- 물건을 든 채 허리를 비틀지 않기
- 무거운 짐은 나누어 들고 도움 받기



Tuwid na Pag-upo — Suporta sa Likod

- Sumandal sa upuan o pader; nakarolyong damit o tuwalya sa ibabang likod
- Tuwid ang ulo; huwag iusli ang baba pasulong (cellphone)
- Tumayo at gumalaw tuwing 30 minuto

바르게 앉기 — 목·허리 곡선 유지

- 의자나 벽에 기대고 허리에 말아 놓은 옷·수건
- 머리를 앞으로 내밀지 않기(휴대폰 볼 때)
- 30분마다 일어나 가볍게 움직이기

5-1

허리를 편안하게 하는 좋은 자세

MGA POSISYONG NAKATUTULONG SA GINHAWA NG LIKOD

1 바로 누운 자세
NAKAHIGA NANG PATIHAYA



Unan o damit sa ilalim ng tuhod, o sa ibabang likod.

무릎 아래 베개·수건, 또는 허리 아래 작은 쿠션.

Panatilihing relaks ang ulo at leeg.

머리와 목의 힘을 빼세요.

2 옆으로 누운 자세
NAKAHIGA SA TAGILIRAN



Unan o damit sa pagitan ng mga tuhod.

무릎을 굽히고 사이에 베개나 접은 옷을 끼우세요.

Suportahan ng unan ang ulo at leeg.

머리와 목도 베개로 받치세요.

Piliin ang posisyong komportable para sa iyo; alisin ang suporta kung dumagdag ang sakit. · 본인에게 편안한 자세로 조절하고, 통증이 늘면 받침을 빼세요.

5-2

사람에 따라 불편할 수 있는 자세

MGA POSISYONG MAAARING HINDI KOMPORTABLE PARA SA ILAN


1 다리를 곧게 펴고 누움
TUWID ANG MGA BINTI



Ayos kung komportable ang kurba ng likod; kung hindi, unan sa ilalim ng tuhod.

허리 곡선이 편안하면 괜찮습니다. 불편하면 무릎 아래에 베개를 받쳐보세요.

2 너무 높은 베개
SOBRANG TAAS NA UNAN



Maaaring makapagod sa leeg; gumamit ng unan na pantay ang ulo at leeg.

목에 부담을 줄 수 있어요. 머리와 목이 수평이 되는 높이의 베개를 쓰세요.

3 엎드려 눕기
NAKADAPA



Maaaring makapagod sa leeg; pero kung gumiginhawa ang likod, ayos na dumapa nang saglit.

목에 부담을 줄 수 있지만, 허리 통증이 줄어드는 사람은 짧게 엎드려 쉬어도 됩니다.


Hindi lahat ng posisyon ay masama para sa lahat; magpalit ng posisyon kung dumagdag ang sakit. · 개인마다 다르므로 통증이 늘면 자세를 바꾸세요.

5 Pangangalaga sa Likod — Bridge at Cat Stretch

허리 보호 — 허리 강화 운동 (브릿지 · 고양이 등)

7

Pangkalahatan · 공통 실습



Bridge Exercise


- **Humiga, itiklop ang tuhod; dahan-dahang iangat ang balakang**
- **Panatilihing tuwid ang balikat–balakang–tuhod, hawakan ng 5 segundo**
- **Dahan-dahang ibaba; magsimula sa 5 beses, hanggang 10 beses, 2–3 set kada araw**

브릿지 운동

- 바닥에 누워 무릎을 세운 뒤 엉덩이를 천천히 들어올리기
- 어깨–엉덩이–무릎이 일직선이 되도록 5초 유지
- 천천히 내리기; 처음 5회부터, 10회 × 1일 2~3세트

8

Pangkalahatan · 공통 실습



Cat Stretch Exercise

- **Tumayo sa apat na paa; dahan-dahang i-curve ang likod pataas, pagkatapos pababa**
- **Ulitin ng 10 beses; huwag ipilit, sa saklaw na walang sakit**

고양이 등 운동

- 네발 기기 자세에서 등을 천천히 위로 둥글게 말았다가 다시 아래로 내리기
- 10회 반복; 아프지 않은 범위에서

✔ **Tips: Magtiklop ng tuhod, huwag yumuko, kapag nagbubuhat · Sa paulit-ulit na trabaho, magpahinga at mag-inat paminsan-minsan · Kung umaabot sa puwitan o binti ang sakit o pamamanhid, magpatingin**

허리 보호 요령: 무거운 물건은 허리를 구부리지 말고 무릎을 굽혀 들기 · 반복 작업 시 중간중간 쉬면서 허리 펴기 · 통증·저림이 엉덩이나 다리까지 내려가면 진료

Kung lumalala ang sakit, huminto. Kung may kakaibang sintomas, magpatingin sa health center. · 통증이 심해지면 멈춥니다. 평소와 다른 증상이 생기면 보건의료기관에서 진료받으세요.

5 Pamumuhay at Pagkain — Sakit sa Likod
생활요법 — 허리 통증

PAGKAIN · 식이

- **Panatilihin ang tamang timbang — mas madalas at mas matagal ang sakit sa likod sa sobrang timbang**
- **Kung sobra ang timbang, bawasan nang unti-unti kasabay ng paglalakad**
- 적정 체중 유지 — 비만은 요통의 발생과 만성화 위험을 높입니다
- 과체중이면 걷기와 함께 서서히 감량

GAWAIN · 생활습관

- **Manatiling aktibo at ipagpatuloy ang pang-araw-araw na gawain — mas mabuti kaysa pahinga sa kama**
- **Pagbubuhat: ilapit ang bagay sa katawan, ibaluktot ang tuhod, huwag umikot ang baywang**
- **Hatiin ang mabigat na karga (ani, panggatong, tubig); magtulungan**
- 평소 활동을 유지하기 — 누워서 쉬는 것보다 회복이 빠릅니다
- 물건 들기: 몸 가까이, 무릎 굽히기, 허리 비틀지 않기
- 무거운 짐(수확물·땔감·물)은 나누어 들고 함께 나르기

IWASAN · 피할 것

- **Paninigarilyo — nauugnay sa mas madalas na sakit sa likod**
- **Matagal na pahinga sa kama**
- **Pagbubuhat ng mabigat habang umiikot o nakayuko**
- 흡연 — 요통 발생·만성화와 관련
- 오래 누워서만 쉬기
- 허리를 비틀거나 숙인 채 무거운 것 들기

⚠ **Agad magpatingin: sakit ng likod na may lagnat, pamamanhid sa singit, hirap umihi o dumumi, o panghihina ng binti**

즉시 진료: 발열, 사타구니 감각 저하, 소변·대변 장애, 다리 힘 빠짐이 함께 있는 요통

출처 · Sanggunian: Dahm KT et al. Bed rest vs stay active for acute LBP. Cochrane 2010;CD007612 · Shiri R et al. Smoking and LBP meta-analysis. Am J Med 2010;123:87.e7 · Shiri R et al. Obesity and LBP meta-analysis. Am J Epidemiol 2010;171:135 · Waters TR et al. Revised NIOSH lifting equation. Ergonomics 1993;36:749 · WHO guideline for chronic primary LBP, 2023

6 Sakit sa Balikat — Madaling Ehersisyo (Marahan; itigil kung masakit)

어깨 통증 — 쉬운 운동 (부드럽게, 아프면 중단)



Pangkalahatan · 공통 실습

Pendulum Swing (Maliliit na Bilog)

- Yumuko, hayaang nakalaylay ang masakit na braso
- Gumawa ng maliliit na bilog
- 20 beses bawat direksyon

진자 운동(작은 원)

- 허리를 숙이고 아픈 팔을 늘어뜨리기
- 작은 원 그리기
- 시계·반시계 방향 각 20회



Pangkalahatan · 공통 실습

Wall Finger Climb

- Humarap sa pader, 'umakyat' gamit ang mga daliri hanggang kaya
- 10 beses

벽 손가락 오르기

- 벽을 보고 서서 손가락으로 벽을 타고 최대한 높이
- 10회

✔ **Igalaw ang balikat araw-araw · Dahan-dahan at tuloy-tuloy · Huwag pigilin ang hininga · Magpatingin kung lumalala o hindi gumagaling**

매일 어깨 움직이기 · 천천히 꾸준히 · 숨 참지 않기 · 통증 악화·호전 없음 시 진료


Kung lumalala ang sakit, huminto. Kung may kakaibang sintomas, magpatingin sa health center. · 통증이 심해지면 멈춥니다. 평소와 다른 증상이 생기면 보건의료기관에서 진료받으세요.

6 Sakit sa Balikat — Rotator Cuff at Pagsusuri sa Sarili

어깨 통증 — 회전근개 강화 운동과 자가 점검

3

Indibidwal · 개인별 운동 (may payo ng doktor)



Rotator Cuff Exercise (theraband o gomang nababanat)


- **Ibaluktot ang siko ng 90°, nakadikit sa katawan; kamay nakahawak sa theraband o piraso ng goma ng gulong, palad pataas**
- **Habang hindi inaalis ang siko sa katawan, dahan-dahang ibuka ang mga kamay palabas**
- **10 beses, 2–3 set; gumamit ng magaan na banda o goma**

회전근개 강화운동 (밴드 또는 고무 튜브)

- 팔꿈치를 몸에 붙여 90°로 굽히고, 손바닥을 위로 향해 양손에 밴드·고무줄 잡기
- 팔꿈치를 붙인 채 양손을 바깥쪽으로 벌리기
- 10회 × 2~3세트; 약한 밴드부터

4

Pangkalahatan · 공통 실습



Simpleng Pagsusuri sa Sarili

- **Iangat ang braso sa harap, o ipatong sa pader at dahan-dahang i-slide pataas**
- **Kung masakit o hindi maitaas — maaaring problema sa rotator cuff: magpatingin**

간단한 자가 점검

- 팔을 앞으로 들거나 벽에 손을 대고 천천히 위로 밀어 올리기
- 아프거나 올라가지 않으면 회전근개 문제 가능 — 진료

✔ **Paalala sa trabaho: Pantay ang bigat sa magkabilang balikat kapag nagbubuhat · Iwasan ang madalas na pagtaas ng kamay sa itaas ng ulo · Huwag manatili sa isang posisyon nang matagal — mag-stretch paminsan-minsan**

작업 중 주의: 무거운 물건은 양쪽 어깨에 균등하게 · 반복적인 머리 위 동작·과도하게 팔 들기 피하기 · 같은 자세를 오래 유지하지 말고 중간중간 스트레칭

Kung lumalala ang sakit, huminto. Kung may kakaibang sintomas, magpatingin sa health center. · 통증이 심해지면 멈춥니다. 평소와 다른 증상이 생기면 보건의료기관에서 진료받으세요.

6 Pamumuhay at Pagkain — Sakit sa Balikat

생활요법 — 어깨 통증

PAGKAIN · 식이

- **Kung may diabetes, kontrolin ang asukal — 5 beses mas madalas ang frozen shoulder (paninigas ng balikat) sa may diabetes**
- **Kung may paninigas ng balikat, magpasuri ng asukal sa dugo — 3 sa 10 may diabetes**
- 당뇨가 있으면 혈당 관리 — 당뇨 환자는 오십견(유착성 관절낭염)이 5배 흔합니다
- 어깨가 굳으면 혈당 검사 받기 — 오십견 환자 10명 중 3명이 당뇨

GAWAIN · 생활습관

- **Bawasan ang trabahong nakataas ang kamay sa itaas ng balikat; magpahinga nang madalas**
- **Bawasan ang paulit-ulit na galaw ng balikat at kamay — salitan ang kanan at kaliwa**
- **Igalaw ang balikat araw-araw sa saklaw na walang sakit (ehersisyo sa pahina 20–21)**
- 어깨 위로 팔을 올리는 작업 줄이고 자주 쉬기
- 반복 동작 줄이기 — 좌우 손 번갈아 쓰기
- 아프지 않은 범위에서 매일 어깨 움직이기(20~21쪽 운동)

IWASAN · 피할 것

- **Pagbubuhat ng mahigit 20 kg nang higit sa 10 beses sa isang araw**
- **Matagal na trabaho na nakataas ang braso sa itaas ng ulo**
- **Malakas na paulit-ulit na paggamit ng kamay nang mahigit 1 oras tuloy-tuloy**
- 20kg 이상을 하루 10회 넘게 들기
- 팔을 머리 위로 든 채 오래 일하기
- 강한 손힘을 쓰는 반복 작업을 1시간 넘게 연속으로

⚠ **Magpatingin: hindi maitaas ang braso pagkatapos mahulog, pamamaga at pamumula, o sakit na umaabot sa dibdib o panga (maaaring sa puso)**

진료: 넘어진 뒤 팔을 못 듦, 붓고 붉어짐, 가슴·턱으로 번지는 어깨 통증(심장 문제 가능)

출처 · Sanggunian: Zreik NH et al. Adhesive capsulitis and diabetes: meta-analysis. Muscles Ligaments Tendons J 2016;6:26–34 · van Rijn RM et al. Work-related factors and shoulder disorders: systematic review. Scand J Work Environ Health 2010;36:189–201

7 Sakit sa Tuhod — Madaling Ehersisyo (Araw-araw, dahan-dahan)

무릎 통증 — 쉬운 운동 (매일 천천히, 부드럽게)




Straight Leg Raise

- **Ibaluktot ang isang tuhod, iunat at itaas ang kabilang binti**
- **5 segundo × 10 beses**

다리 뻗어 올리기

- 한쪽 무릎을 굽히고 다른 다리는 펴서 들어 올리기
- 5초 × 10회



Knee Extension

- **Umupo sa upuan, iunat ang binti**
- **Higpitan ang hita 5 segundo**
- **10 beses bawat binti**


무릎 펴기

- 의자에 앉아 다리 펴기
- 허벅지에 힘주고 5초
- 양쪽 10회

⚠ **Magpatingin kung: lumalala o hindi gumagaling · namamaga, namumula o mainit ang tuhod · hindi makatapak o makalakad · may lagnat**

진료가 필요한 경우: 통증 악화·호전 없음 · 무릎 부종·발적·열감 · 체중을 실을 수 없음 · 발열 동반

7 Pagbawas ng Sakit sa Tuhod — Ehersisyo Pampalakas
무릎 통증 완화 — 무릎 강화 운동



Umupo at Dahan-dahang Tumayo (Sit to Stand)

- **Pangunahing ehersisyo para sa tuhod**
- **Hawakan ang matibay na upuan kung kailangan**
- **Magsimula sa 3–5 beses nang sabay-sabay; dagdagan sa bahay hanggang 10–15**

의자에 앉았다 천천히 일어나기

- 무릎 운동의 핵심
- 필요하면 튼튼한 의자를 잡고 하기
- 처음에는 함께 3~5회; 집에서 10~15회까지 늘리기



Half Squat (opsyonal)

- **Hawak sa pader o poste; panatilihin ang natural na kurba ng likod**
- **Iusog ang balakang paatras habang dahan-dahang bumababa at tumatayo; tuhod kahanay ng daliri ng paa**
- **Gawin lamang kung hindi masakit; bawasan ang lalim kung masakit**


하프 스쿼트 (선택 운동)

- 벽·기둥을 잡고 허리의 자연스러운 곡선 유지
- 엉덩이를 뒤로 빼며 천천히 앉았다 일어나기; 무릎은 발가락 방향
- 아프지 않을 때만; 아프면 깊이 줄이기

Kung lumalala ang sakit, huminto. Kung may kakaibang sintomas, magpatingin sa health center. · 통증이 심해지면 멈춥니다. 평소와 다른 증상이 생기면 보건의료기관에서 진료받으세요.

7 Pagbawas ng Sakit sa Tuhod — Ehersisyo Pampalakas

무릎 통증 완화 — 무릎 강화 운동




Heel Raise

- Hawak sa pader, itaas ang sakong at dahan-dahang ibaba
- 15 beses

발뒤꿈치 들기

- 벽·기둥을 잡고 뒤꿈치 들었다 천천히 내리기
- 15회



Banayad na Masahe sa Paligid ng Tuhod (pantulong)

- Gamit ang mga daliri, imasahe nang pabilog ang kalamnan sa paligid ng tuhod, 1–2 minuto
- Huwag imasahe kung mainit, namamaga o namumula ang tuhod

무릎 주변 가벼운 마사지 (보조)

- 손끝으로 무릎 주변 근육을 작은 원 그리며 1~2분
- 무릎이 붓고 열감·발적이 있으면 마사지하지 않기

Kung lumalala ang sakit, huminto. Kung may kakaibang sintomas, magpatingin sa health center. · 통증이 심해지면 멈춥니다. 평소와 다른 증상이 생기면 보건의료기관에서 진료받으세요.

7 Pamumuhay at Pagkain — Sakit sa Tuhod

생활요법 — 무릎 통증

PAGKAIN · 식이

- **Bawasan ang timbang kung sobra — bawat 1 kg na nabawas ay nagbabawas ng ~4 kg na bigat sa tuhod sa bawat hakbang**
- **Pinakamabisa kapag pinagsama ang pagbabawas ng timbang at ehersisyo**
- 과체중이면 감량 — 1kg 줄이면 걸음마다 무릎 하중 약 4kg 감소
- 체중 감량과 운동을 함께 할 때 가장 효과적

GAWAIN · 생활습관

- **Gumamit ng tungkod o kahoy na pantukod sa kamay na kabila ng masakit na tuhod sa matarik o madulas na daan**
- **Umupo sa mababang bangkito sa halip na matagal na pag-iskwat o pagluhod (paglalaba, pagtatanim)**
- **Ehersisyo para sa tuhod araw-araw (pahina 23–25)**
- 가파르고 미끄러운 길에서는 아픈 무릎 반대쪽 손에 지팡이나 막대
- 빨래·모심기 때 오래 쪼그리거나 무릎 꿇지 말고 낮은 의자에 앉기
- 매일 무릎 운동(23~25쪽)

IWASAN · 피할 것

- **Matagal na pagluhod at pag-iskwat sa trabaho — 1.9 beses ang panganib ng osteoarthritis**
- **Regular na pagbubuhat ng 25 kg o higit pa**
- **Pagluhod/pag-iskwat kasama ng sobrang timbang — pinakamataas ang panganib**
- 작업 중 장시간 무릎 꿇기·쪼그려 앉기 — 무릎 관절염 위험 1.9배
- 25kg 이상을 정기적으로 들기
- 쪼그려 앉는 작업 + 비만 — 위험이 가장 높음

⚠ **Agad magpatingin: namamaga, mainit at mapula ang tuhod, may lagnat, o hindi makatapak**


즉시 진료: 무릎이 붓고 뜨겁고 붉음, 발열, 체중을 실을 수 없음

출처 · Sanggunian: Kolasinski SL et al. 2019 ACR/AF Guideline for OA of the Hand, Hip, and Knee. Arthritis Rheumatol 2020;72:220–233 · Messier SP et al. Arthritis Rheum 2005;52:2026–2032 · Coggon D et al. Occupational activities and knee OA. Arthritis Rheum 2000;43:1443–1449

8 Sakit sa Pulso — Paggalaw ng Daliri at Pag-unat
손목 통증 — 손가락 움직이기와 스트레칭

Pangkalahatan · 공통 실습

1



Prayer Stretch


- **Pagdikitin ang mga palad, ibaba ang kamay**
- **15 segundo × 3 beses**

기도 스트레칭

- 손바닥을 맞대고 손을 아래로 내리기
- 15초 × 3회

Pangkalahatan · 공통 실습

2



Wrist Circles

- **Pabilog, 10 beses bawat direksyon**

손목 돌리기

- 시계·반시계 방향 각 10회


Kung lumalala ang sakit, huminto. Kung may kakaibang sintomas, magpatingin sa health center. · 통증이 심해지면 멈춥니다. 평소와 다른 증상이 생기면 보건의료기관에서 진료받으세요.

8 Sakit sa Pulso at Siko — Pag-unat (Carpal Tunnel · Tennis Elbow)

손목·팔꿈치 통증 — 손목터널증후군·테니스 엘보 스트레칭

3

Opsyonal · 선택 운동



Median Nerve Glide


- **Itaas ang braso sa gilid, siko nakabaluktot sa 90°; itaas ang pulsuhan, nakaharap ang mga daliri sa mukha**
- **Hawakan ang balikat gamit ang kabilang kamay; unti-unting iunat ang siko**
- **5–10 beses, dahan-dahan; huminto kung namamanhid o kumikirot**

정중신경 활주운동 (선택)

- 팔을 옆으로 90° 올리고 팔꿈치를 90° 굽힌 뒤, 손목을 손등 쪽으로 굽혀 손끝이 얼굴을 향하게
- 반대 손으로 어깨를 고정하고 팔꿈치를 천천히 펴기
- 5~10회; 저림·찌릿함이 생기면 중단

4

Pangkalahatan · 공통 실습



Forearm Extensor Stretch

- **Iunat ang braso sa harap; ibaba ang pulsuhan (daliri pababa)**
- **Pindutin nang dahan-dahan ang palad gamit ang kabilang kamay; hawakan ng 10–15 segundo, 3 beses**

전완 신전근 이완 스트레칭

- 팔을 앞으로 뻗고 손목을 손바닥 쪽으로 굽혀 손끝이 아래를 향하게
- 반대 손으로 손등을 부드럽게 눌러 10~15초 유지, 3회

주의 증상: 손목 저림·힘 빠짐 · 팔꿈치 바깥쪽 찌릿한 통증 · 물건 집기·병뚜껑 돌릴 때 통증 → 진료

✔ **Paalala sa trabaho: Panatilihing tuwid ang pulsuhan sa linya ng braso · Regular na i-relax at iunat ang mga kamay · Sa paggamit ng itak, asarol, paghahabi at pagbabayo, magpahinga nang madalas**

작업 중 주의: 손목에 무리가 가지 않도록 손을 일자로 유지 · 자주 손 풀고 스트레칭 · 칼·괭이·직조·절구질 작업 시 자주 휴식

Kung lumalala ang sakit, huminto. Kung may kakaibang sintomas, magpatingin sa health center. · 통증이 심해지면 멈춥니다. 평소와 다른 증상이 생기면 보건의료기관에서 진료받으세요.

8 Pamumuhay at Pagkain — Sakit sa Pulso at Siko

생활요법 — 손목·팔꿈치 통증

PAGKAIN · 식이

- **Panatilihin ang tamang timbang — 2 beses ang panganib ng carpal tunnel sa sobrang timbang**
- **Kung may diabetes, kontrolin ang asukal — 1.7 beses ang panganib ng carpal tunnel**
- 적정 체중 유지 — 비만은 손목터널증후군 위험 2배
- 당뇨가 있으면 혈당 관리 — 손목터널증후군 위험 1.7배

GAWAIN · 생활습관

- **Sa gabi o kapag namamanhid: panatilihing tuwid ang pulso (maaaring balutin ng tela para hindi mabaluktot)**
- **Magpahinga nang madalas sa paulit-ulit at malakas na trabaho ng kamay (itak, asarol, paghahabi)**
- **Gumamit ng makapal o may balot na hawakan para hindi kailangang humigpit ang kapit**
- 밤이나 저릴 때 손목을 곧게 유지(천으로 감아 꺾이지 않게 해도 됨)
- 반복적·강한 손 작업(칼·괭이·직조)은 자주 쉬기
- 손잡이를 두껍게 하거나 감싸서 덜 꽉 쥐게 하기

IWASAN · 피할 것

- **Paulit-ulit na malakas na pagkapit at pagbaluktot ng pulso nang walang pahinga**
- **Pagtulog nang nakabaluktot ang pulso**
- **Matagal na paggamit ng makinang nanginginig (chainsaw, grass cutter)**
- 쉬지 않고 반복해서 세게 쥐고 손목 꺾기
- 손목을 꺾은 채 자기
- 진동 기계(전기톱·예초기) 장시간 사용


⚠ **Magpatingin: paulit-ulit na pamamanhid sa gabi, panghihina ng hinlalaki, o madalas na nahuhulog ang hawak**

진료: 밤마다 반복되는 손 저림, 엄지 힘 약화, 쥔 물건을 자주 떨어뜨림

출처 · Sanggunian: Shiri R et al. Excess body mass and CTS: meta-analysis. Obes Rev 2015;16:1094 · Pourmemari MH, Shiri R. Diabetes and CTS: meta-analysis. Diabet Med 2016;33:10 · AAOS Clinical Practice Guideline on CTS, 2016 · NIOSH. Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors, 1997 (97-141) · NIOSH. Simple Solutions: Ergonomics for Farm Workers, 2001 (2001-111)

9 Sakit sa Bukung-bukong — Paggaling (hindi para sa bagong pilay)

발목 통증 — 회복기 운동 (급성 손상 직후 제외)




Ankle Pumps — Paa Pataas-Pababa

- **Igalaw ang dulo ng paa pataas at pababa, 20 beses**
- **Para sa paggaling; kung bagong pilay at namamaga, magpahinga, iangat ang paa at magpatingin muna**

발목 펌프

- 발끝을 위아래로 20회
- 회복기 운동; 방금 삔 뒤 부었으면 쉬고 다리를 올린 뒤 먼저 진료



Ankle Circles

- **Pabilog na igalaw ang bukung-bukong**
- **10 beses bawat direksyon**

발목 돌리기

- 발목으로 원 그리기
- 양방향 각 10회

Magpatingin kung: matinding pamamaga o pasa na hindi gumagaling · hindi makatapak · pamamanhid o kawalan ng pakiramdam · lumalala ang sakit

진료가 필요한 경우: 심한 부종·멍이 호전되지 않음 · 체중을 실을 수 없음 · 저림·감각 소실 · 통증 악화

Kung lumalala ang sakit, huminto. Kung may kakaibang sintomas, magpatingin sa health center. · 통증이 심해지면 멈춥니다. 평소와 다른 증상이 생기면 보건의료기관에서 진료받으세요.

9 Sakit sa Bukung-bukong — Paggaling (hindi para sa bagong pilay)

발목 통증 — 회복기 운동 (급성 손상 직후 제외)



Pagtayo sa Isang Paa (may hawak)

- **HUMAWAK sa pader o matibay na upuan**
- **Bahagyang iangat ang isang paa; 10–30 segundo × 3**
- **Huwag pigilin ang hininga; huwag gawin kung namamaga o hindi matatag**

한 발 서기 (지지대 잡고)

- 벽이나 튼튼한 의자를 반드시 잡기
- 한 발을 살짝 들고 10~30초 × 3회
- 숨 참지 않기; 부어 있거나 불안정하면 하지 않기

9 Pamumuhay at Pagkain — Sakit sa Bukung-bukong

생활요법 — 발목 통증

UNANG 72 ORAS · 초기 72시간

- **Magpahinga; huwag ipilit na maglakad nang malayo**
- **Yelo (nakabalot sa tela) o malamig na basang tela, 15–20 minuto, ilang beses sa isang araw**
- **Balutin nang bahagya ng tela at iangat ang paa sa unan o nakatuping damit**
- 쉬고 발목 보호하기; 억지로 멀리 걷지 않기
- 찬물 수건이나 천에 싼 얼음을 15~20분씩 하루 여러 번
- 천으로 가볍게 감고 베개나 접은 옷 위에 발 올리기

PAGGALING · 회복기

- **Kapag humupa ang pamamaga: simulan ang magaan na paggalaw at paglalakad ayon sa kaya (optimal loading)**
- **Ehersisyo sa balanse at paggalaw ng bukung-bukong (pahina 30–31)**
- **Unti-unting bumalik sa trabaho sa bukid**
- 붓기가 가라앉으면 견딜 수 있는 만큼 가볍게 움직이고 걷기(적정 부하)
- 발목 움직임·균형 운동(30~31쪽)
- 밭일은 단계적으로 복귀

IWASAN · 피할 것

- **Sa unang 72 oras — HARM: Heat (init), Alcohol (alak), Running (pagtakbo), Massage (masahe/hilot)**
- **Mainit na pantapal o malakas na hilot sa bagong pilay**
- **Pag-akyat ng bundok o malayong paglalakad habang namamaga pa**
- 처음 72시간 피할 것 — HARM: 온열, 술, 달리기, 마사지(힐롯)
- 갓 삔 발목에 온찜질이나 세게 하는 힐롯
- 부어 있는 동안 산 오르기·먼 길 걷기

⚠ **Agad magpatingin: hindi makahakbang ng 4 na beses, masakit ang buto sa gilid ng bukung-bukong, o nag-iba ang hugis**

즉시 진료(오타와 발목 규칙): 네 걸음을 못 디딤, 복사뼈 부위 뼈 압통, 발목 모양 변형

출처 · Sanggunian: Bleakley CM et al. PRICE needs updating, should we call the POLICE? Br J Sports Med 2012;46:220–221 · ACPSM. Guidelines on the management of acute soft tissue injury using PRICE, 2011 · Bachmann LM et al. Accuracy of Ottawa ankle rules: systematic review. BMJ 2003;326:417

10 Sakit sa Itaas at Gitnang Likod (Thoracic Spine)

등 상부·중부 통증 (흉추)

Pangkalahatan · 공통 실습

1



Open Book


- **Humiga sa tagiliran, nakabaluktot ang tuhod; ibukas ang itaas na braso paatras**
- **Huwag umikot nang sobra; hanggang kaya lang, walang sakit; 15 segundo × 5 beses**

오픈 북

- 옆으로 누워 무릎을 굽히고 위쪽 팔을 뒤로 열기
- 과도하게 회전하지 않기; 통증 없는 범위에서 15초 × 5회

Pangkalahatan · 공통 실습

2



Wall Angel

- **Sumandal nang magaan sa pader; HUWAG piliting idikit ang leeg at ibabang likod**
- **Itaas-ibaba ang mga braso sa pader hanggang kaya lang, 10 beses**
- **Ibaba ang braso kung may sakit sa balikat**

월 엔젤

- 벽에 가볍게 기대기 — 목·허리를 억지로 벽에 붙이지 않기
- 팔이 벽에 닿는 높이까지만 올렸다 내리기, 10회
- 어깨가 불편하면 팔을 낮게

10 Pamumuhay at Pagkain — Sakit sa Itaas at Gitnang Likod

생활요법 — 등 통증

PAGKAIN · 식이

- **Pagkaing mayaman sa calcium: maliliit na isdang kinakain pati buto (dilis), gatas kung mayroon, malunggay at madahong gulay**
- **Bitamina D: araw sa umaga, itlog, isda**
- **Sapat na protina: isda, itlog, munggo**
- 칼슘이 많은 음식: 뼈째 먹는 작은 생선(멸치), 우유(가능하면), 말룽가이·잎채소
- 비타민 D: 아침 햇볕, 달걀, 생선
- 충분한 단백질: 생선·달걀·녹두

GAWAIN · 생활습관

- **Ehersisyong may bigat sa katawan (paglalakad) at pagpapalakas ng kalamnan ng likod araw-araw**
- **Pag-iwas sa pagkahulog: ilaw, alisin ang nakakatisod, tsinelas na may kapit**
- **Ehersisyo para sa likod sa pahina 33**
- 체중 부하 운동(걷기)과 등 근력 운동 매일
- 낙상 예방: 조명, 걸릴 물건 치우기, 미끄럼 방지 신발
- 33쪽 등 운동 실천

IWASAN · 피할 것

- **Paninigarilyo — nagpapahina ng buto**
- **Sobrang alak (3 o higit na inumin bawat araw) — nagpapahina ng buto**
- **Pagbubuhat ng mabigat habang nakayuko, lalo na sa nakatatanda at kababaihang lampas 50**
- 흡연 — 뼈를 약하게 함
- 과음(하루 3잔 이상) — 뼈를 약하게 함
- 숙인 채 무거운 것 들기, 특히 노인과 50세 이상 여성

⚠ **Agad magpatingin: sakit sa likod na may sakit sa dibdib, hirap huminga o pagpapawis, o biglang sakit pagkatapos mahulog o magbuhat sa nakatatanda**

즉시 진료: 가슴 통증·호흡곤란·식은땀이 함께 있는 등 통증, 노인이 넘어지거나 물건을 든 뒤 갑자기 생긴 통증

출처 · Sanggunian: LeBoff MS et al. The clinician's guide to prevention and treatment of osteoporosis (BHOF). Osteoporos Int 2022;33:2049–2102 · AGS/BGS falls prevention guideline. J Am Geriatr Soc 2011;59:148

Mataas o Mababang Asukal sa Dugo — Ano ang Gagawin

고혈당·저혈당일 때 — 대처법

MABABA (<70 mg/dL) · 저혈당

- **Palatandaan: panginginig, pawis, gutom, kabog ng dibdib, hilo**
- **Kumain agad ng 15 g matamis: 1 kutsarang asukal sa tubig, ½ baso ng softdrink o juice, o 3–4 kendi**
- **Maghintay ng 15 minuto; ulitin kung hindi bumuti**
- **Pagbuti, kumain ng meryenda o pagkain**
- 증상: 떨림·식은땀·배고픔·두근거림·어지럼
- 즉시 당분 15g: 설탕 1큰술 탄 물, 탄산음료·주스 반 컵, 사탕 3~4개
- 15분 뒤 안 좋아지면 반복
- 회복 후 간식·식사

MATAAS · 고혈당

- **Palatandaan: uhaw, madalas umihi, pagod, malabong paningin**
- **Uminom ng maraming tubig (hindi matamis)**
- **Huwag itigil ang gamot o insulin; kumain sa oras**
- **Magpasukat sa health center kung patuloy ang sintomas**
- 증상: 갈증·잦은 소변·피로·흐린 시야
- 물 많이 마시기 (단 음료 금지)
- 약·인슐린 중단하지 않기; 제때 식사
- 증상이 계속되면 보건소에서 혈당 측정

EMERGENCY · 응급·피할 것

- **Walang malay o hindi makalunok: HUWAG pakainin; ihiga nang nakatagilid, tumawag ng tulong**
- **Mataas na asukal + pagsusuka, sakit ng tiyan, mabilis na paghinga o antok — agad sa health center**
- **Iwasan: paglaktaw ng pagkain pagkatapos ng gamot; alak sa walang laman na tiyan**
- 의식 없거나 못 삼키면: 입에 아무것도 넣지 말고 옆으로 눕혀 도움 요청
- 고혈당 + 구토·복통·빠른 호흡·졸림 — 즉시 보건소·병원
- 피할 것: 약 복용 후 끼니 거르기, 빈속 음주

⚠ **Kung may diabetes: magdala palagi ng kendi o asukal, at ituro sa pamilya ang mga palatandaan ng mababang asukal**

당뇨가 있으면: 사탕·설탕을 항상 지니고, 가족에게 저혈당 증상을 미리 알려두기

출처 · Sanggunian: American Diabetes Association. 6. Glycemic Goals and Hypoglycemia: Standards of Care in Diabetes—2024. Diabetes Care 2024;47(Suppl 1):S111–S125 · Umpierrez GE et al. Hyperglycemic crises in adults with diabetes: a consensus report. Diabetes Care 2024;47:1257–1275



• **QR**코드를 스캔하여 다양한 언어로 제작된 건강교육 영상을 시청하세요.

• **I-scan ang QR code upang mapanood ang mga video sa iba't ibang wika.**