근골격계질환 예방 · Musculoskeletal Disorder Prevention

작업 전 1분 스트레칭

1-Minute Stretching Before Work

업무 시작 직전 · 점심 후
Before work · After lunch
작업 중에는 2시간마다 한 번
Once every 2 hours during work

1



목 옆으로 늘이기
Neck side stretch

손으로 머리를 잡고 어깨는 내린 채 천천히 기울입니다. 반동을 주지 않습니다.
Hold your head, keep shoulders down, tilt slowly. No bouncing.

15초
좌우 각각
each side

2




어깨 크게 돌리기
Shoulder rolls

양어깨를 귀까지 올렸다가 뒤로 크게 돌려 내립니다.
Lift both shoulders to your ears, then roll them back and down.

10회
뒤로
backward

3



손목·손가락 펴기 자가점검 Self-check
Wrist and finger opening

주먹을 쥐었다가 새끼손가락부터 한 개씩 2초에 걸쳐 폅니다.
Make a fist, then open one finger at a time, two seconds each.

5회
왕복
repetitions

4




허리 뒤로 젖히기
Back extension

양손을 허리에 대고 숨을 내쉬며 상체를 뒤로 젖힙니다.
Hands on your hips, exhale and lean your upper body backward.

10초
3회 반복
3 times

5



앉았다 일어서기 자가점검 Self-check
Squat and stand

포그리고 자세를 취했다가 천천히 일어섭니다.
Squat down, then rise slowly.

3회
천천히
slowly

이 신호가 오면 참지 마십시오
Do not ignore these warning signs

신호 1 · Sign 1
아침에 손가락이 걸리거나 잘 펴지지 않는다
Fingers catch or stiffen in the morning

신호 2 · Sign 2
팔을 위로 올릴 때 아프다
Pain when raising your arm

신호 3 · Sign 3
허리에서 다리로 저린 느낌이 뻗친다
Numbness spreading down into the leg

즉시 관리감독자나 보건관리자에게 알립니다. 3일이 지나도 낫지 않으면 병원 진료를 받으십시오.
Tell your supervisor or health manager right away. If it does not improve within 3 days, see a doctor.

아프다고 움직이지 않으면 몸이 굳어 회복이 더 늦어집니다. 통증이 있어도 가벼운 스트레칭은 계속하십시오.

Staying still because of pain stiffens the body and slows recovery.
Keep stretching gently even when it hurts.

작업 시작 전 스트레칭 영상
Stretching Before Work

출처 · KOSHA GUIDE H-68-2012「사업장의 근골격계질환 예방을 위한 의학적 조사에 관한 지침」, 한국산업안전보건공단
Source · KOSHA GUIDE H-68-2012, Korea Occupational Safety and Health Agency