[교회명] 긍휼사역원 의료선교팀 | 국내 의료선교 · 찾아가는 건강검진

함께 걷는 건강 이야기

건강검진 결과 안내 책자

오늘 받으신 검사 결과를 어떻게 읽고, 집에서 무엇을 실천하면 좋은지 한 권에 담았습니다.

검사 결과 해석 | 오늘부터 실천하는 생활관리 | 어르신 운동 따라하기

성 명 _____ 검진일 _____ 담당 의료진 _____

HEALTH CARE · MISSION



사랑하는 자여, 네 영혼이 잘됨 같이
네가 범사에 잘되고 강건하기를
내가 간구하노라

요한삼서 1장 2절

이 안내서는 참고용 교육자료이며 진단·처방을 대신하지 않습니다.
검사 결과에 대한 판단은 의료진과 상의하세요.

이 책자를 드리며

오늘 검진에 함께해 주셔서 감사합니다.
검사 수치는 한 번의 숫자일 뿐, 그 숫자를 알고 돌보는 일상이 건강을 지킵니다.

이 책자는 오늘 받으신 산소포화도·심전도·혈압·혈당 검사 결과를 스스로 읽을 수 있도록 돕고, 집에서 바로 실천할 수 있는 생활관리와 어르신 운동 동작을 담았습니다. 수치가 걱정되시면 책자 뒷면의 연락처로 언제든 문의해 주세요. 저희 의료진이 가까운 병원·보건소 연계를 함께 돕겠습니다.

이 책자 보는 법

1. 각 검사 페이지 맨 위 **오늘의 검사 결과** 칸에 의료진이 수치를 적어 드립니다.
2. 수치에 해당하는 **색깔 띠**를 찾아 권장 행동을 확인하세요. 빨간 띠는 진료가 필요한 단계입니다.
3. **놓치지 말아야 할 신호**가 나타나면 수치와 관계없이 119 또는 의료진에게 연락하세요.

차 례

PART 1 **검사 결과 안내 및 생활관리** 02 – 07

- 산소포화도 · 휴대용 심전도 02 – 03
- 고혈압 · 저혈압 04 – 05
- 고혈당 · 저혈당 06 – 07

PART 2 **어르신 운동 실천 안내** 08 – 12

- 근력·균형 운동 따라하기 · 어운완 핵심 08 – 09
- 운동 전 안전 점검 · 1회 구성과 12주 기록 10 – 12

PART 3 **영상 기반 부위별 쉬운 동작** 13 – 21

- 근감소 · 어깨 · 허리 · 목 · 무릎·발목 · 저항밴드 · 오십견 · 몸풀기 13 – 21

부록 **문의·연계 안내** 뒷표지

산소포화도 검사 결과 안내

SpO_2: 손가락으로 혈액의 산소포화도를 추정하는 검사

02

오늘의 검사 결과 | 산소포화도 _____ % 맥박 _____ 회/분

수치에 따라 이렇게 대처하세요

95~100%	일반적인 안정 시 참고 범위입니다. 증상이 없다면 건강습관을 유지하세요.
93~94%	손을 따뜻하게 하여 안정 후 재측정하고, 계속 낮으면 진료를 받으세요.
91~92%	반복 측정에도 낮다면 신속한 의료진 평가가 필요합니다.
90% 이하	현장에서 즉시 의료진에게 알리고 응급평가를 받으세요.

놓치지 말아야 할 신호

바로 진료 / 119가 필요한 경우

숨이 심하게 차거나 가슴이 아프고, 입술이 파래지거나 의식이 변하면 수치와 관계없이 119에 연락하세요.

정확하게 측정하려면

손을 따뜻하게, 움직임 없이 측정하세요. 매니큐어·혈액순환·피부색 등에 따라 측정 오차가 발생할 수 있습니다.

오늘부터 실천하는 건강관리

담배연기를 피하세요

금연하고 간접흡연을 피하세요.

숨이 편할 때만 움직이세요

안정 시 산소포화도 확인 후 짧게 걸으세요.

호흡기 증상은 확인하세요

숨참·기침이 지속되면 진료받으세요.

※ 수치는 참고용입니다. 만성폐질환·고지대·산소치료 중인 경우에는 개인별 목표가 다를 수 있습니다.

근거: MedlinePlus Pulse Oximetry; 미국 FDA, Pulse Oximeters(2025). · [교회명] 의료선교팀

휴대용 심전도(1유도) 결과 안내

심장이 뛰는 리듬을 짧게 기록하여 부정맥 가능성을 확인하는 검사

03

오늘의 검사 결과 | 기록 결과 ☐ 규칙적 ☐ 불규칙 ☐ 심방세동 의심 ☐ 판독 불가

검사 결과, 어떤 의미인가요?

규칙적	검사 당시 뚜렷한 리듬 이상이 관찰되지 않았다는 뜻입니다.
불규칙	부정맥 가능성이 있습니다. 기록을 의료진에게 확인받으세요.
심방세동 의심	심방세동 가능성이 있어, 의료진 판독·추가 심전도가 필요합니다.
판독 불가	움직임·손가락 접촉 등을 확인하고 다시 측정하세요.

놓치지 말아야 할 신호

바로 진료 / 119가 필요한 경우

가슴통증, 실신, 심한 호흡곤란, 한쪽 마비·말이 어눌한 증상이 나타나면 바로 119에 연락하세요.

1유도 심전도의 한계

정상 표시도 간헐적 부정맥을 배제하지 못합니다. 협심증·심근경색을 진단하는 검사가 아닙니다.

오늘부터 실천하는 건강관리

혈압·혈당을 관리하세요

기존 질환을 진료받고 약을 잘 복용하세요.

편안한 운동부터

증상 없을 때 의자 운동·가벼운 걷기.

두근거림을 기록하세요

반복되면 12유도·홀터검사를 상담하세요.

※ 기기 자동판정은 확진이 아닙니다. 특히 심방세동은 의료진의 심전도 파형 확인이 필요합니다.

근거: 2023 ACC/AHA/ACCP/HRS 심방세동 진료지침; 미국심장협회(AHA). · [교회명] 의료선교팀

고혈압 검사 결과 안내

혈압은 심장과 혈관의 건강 상태를 보여주는 중요한 지표입니다.

오늘의 검사 결과 | 혈압 _____ / _____ mmHg 측정 시각 _____

혈압 수치와 권장 행동

120/80 미만	수축기 120 미만 그리고 이완기 80 미만: 정상 범위입니다.
120~139 / 80~89	혈압상승·고혈압 전단계 가능성: 생활습관 관리와 반복 측정.
140/90 이상	수축기 또는 이완기 기준 초과: 고혈압 의심, 진료 확인.
180 또는 120 이상	수축기 180 이상 또는 이완기 120 이상: 안정 후 재측정, 즉시 의료진 상담.

놓치지 말아야 할 신호

바로 진료 / 119가 필요한 경우

혈압이 매우 높으면서 흉통·호흡곤란·심한 두통·시야변화·마비·말 어눌함이 있다면 즉시 119에 연락하세요.

정확하게 측정하려면

5분 휴식 후 앉아서 팔을 심장 높이에 두세요. 혈압은 한 번의 측정만으로 확진하지 않습니다.

오늘부터 실천하는 건강관리

짠 음식을 줄이세요

국물·젓갈·가공식품 섭취를 줄이세요.

가볍게, 꾸준히 운동

의자 운동·걷기를 무리 없이 실천하세요.

꾸준히 확인하세요

가정혈압 기록과 처방약 복용을 지속하세요.

※ 수축기와 이완기 중 하나만 기준을 넘어도 해당됩니다. 임신·기저질환 등에 따라 별도 평가가 필요합니다.

근거: 대한고혈압학회 2026 진료지침; 미국심장협회(AHA), Severe Hypertension. · [교회명] 의료선교팀

저혈압 검사 결과 안내

혈압이 낮더라도 증상이 없다면 치료가 필요하지 않을 수 있습니다.

05

오늘의 검사 결과 | 혈압 _____ / _____ mmHg 어지럼·실신 ☐ 있음 ☐ 없음

수치보다 증상 확인이 중요합니다

90/60 이상	특별한 증상이 없다면 일반적으로 저혈압 범위는 아닙니다.
90/60 미만	낮은 혈압입니다. 증상이 없다면 반복 확인하며 경과를 살피세요.
어지럼 동반	저혈압과 연관될 수 있습니다. 앉거나 누워 쉬고 진료받으세요.
실신·혼돈	심한 저혈압이나 다른 원인 가능성이 있어 응급평가가 필요합니다.

놓치지 말아야 할 신호

바로 진료 / 119가 필요한 경우

쓰러짐, 의식 변화, 가슴통증, 심한 호흡곤란, 차고 축축한 피부가 동반되면 즉시 119에 연락하세요.

낮게 측정됐다면

안정 후 다시 재고 수분 부족·복용약·발열 등을 확인하세요. 자주 어지러우면 원인을 진료받으세요.

오늘부터 실천하는 건강관리

천천히 일어나세요

누웠다 일어날 때 잠시 앉아서 움직이세요.

수분을 충분히 드세요

단, 심장·신장질환의 수분 제한은 따르세요.

앉아서 먼저 움직이세요

발목 펌프 후 천천히 일어나세요.

※ 일반적으로 90/60 mmHg 미만을 저혈압의 참고 기준으로 사용합니다. 평소 혈압과 증상을 함께 판단합니다.

근거: NHS, Low blood pressure (hypotension). · [교회명] 의료선교팀

고혈당 검사 결과 안내

손끝혈당은 선별 참고치입니다. 공복 여부를 반드시 구분하세요.

06

오늘의 검사 결과 | 혈당 _____ mg/dL ☐ 8시간 이상 공복 ☐ 식후 / 비공복

검사 상황에 따라 해석하세요

공복 100 미만	정맥혈장 기준의 정상 참고 범위입니다.
공복 100~125	공복혈당장애 가능성이 있어 정맥혈 검사로 확인하세요.
공복 126 이상	당뇨병 가능성이 있어 병원 검사·당화혈색소 확인이 필요합니다.
비공복 200 이상	식사 시점·증상을 고려해 진료받으세요. 손끝혈당만으로 확진 불가.

놓치지 말아야 할 신호

바로 진료 / 119가 필요한 경우

혈당 300 mg/dL 이상이 반복되거나 구토·복통·깊고 빠른 호흡·의식 변화가 있다면 신속한 응급평가가 필요합니다.

손끝혈당은 선별검사

당뇨병 진단에는 병원 정맥혈장 혈당·당화혈색소 등 확진검사가 필요합니다.

오늘부터 실천하는 건강관리

단 음료를 줄이세요

물·무가당 음료로 바꾸세요.

식사에 규칙을 만드세요

끼니·섭취량을 일정하게 관리하세요.

식후 가볍게 움직이세요

안정 시 5~10분 걷기로 시작하세요.

※ 공복 기준은 8시간 이상 열량 섭취가 없는 상태에서 정맥혈장 검사를 시행할 때 적용됩니다.

근거: 대한당뇨병학회 2025 진료지침 및 FAQ; 미국 CDC, Diabetic Ketoacidosis. · [교회명] 의료선교팀

저혈당 검사 결과 안내

혈당이 낮으면 즉시 대처가 필요하며, 의식 상태를 먼저 확인하세요.

07

오늘의 검사 결과 | 혈당 _____ mg/dL 현재 증상 ☐ 없음 ☐ 식은땀 / 떨림 ☐ 어지럼

혈당 수치별 대처 방법

70 이상	일반적인 저혈당 기준에 해당하지 않습니다. 증상이 있으면 상담하세요.
54~69	저혈당입니다. 의식이 있고 삼킬 수 있으면 빠른 당 15g을 섭취하세요.
54 미만	심한 저혈당 수치입니다. 즉시 의료진 도움을 받고 재측정하세요.
의식 저하	음식·음료를 입에 넣지 말고 즉시 119에 연락하세요.

놓치지 말아야 할 신호

바로 진료 / 119가 필요한 경우

의식저하·경련·삼킴곤란이 있거나 저혈당이 호전되지 않으면 119! 절대 억지로 먹이거나 마시게 하지 마세요.

의식이 뚜렷할 때: 15-15 규칙

빠르게 흡수되는 당 15g 섭취 → 15분 후 혈당 재측정 → 70 미만이면 반복.

오늘부터 실천하는 건강관리

끼니를 거르지 마세요

식사 시간을 규칙적으로 유지하세요.

약을 임의로 바꾸지 마세요

인슐린·혈당강하제는 진료로 조정하세요.

혈당부터 확인하세요

70 미만이면 운동보다 저혈당 처치 먼저.

※ 예: 포도당 정제(합계 탄수화물 15g) 또는 당 함유 음료(제품 당류 표시 확인). 회복 후 필요 시 식사·간식을 드세요.

근거: 미국당뇨병학회(ADA), Hypoglycemia - 15-15 Rule; 대한당뇨병학회 2025 진료지침. · [교회명] 의료선교팀

어르신 근력·균형 운동 따라하기

어운완의 의자·균형운동 유형을 참고하여 선별한 초보자용 동작

시작 전: 안정된 의자를 준비하세요. 무리하지 말고 천천히, 숨을 참지 않으며 움직이세요.

01 앉아서 발목 펌프



의자에 깊숙이 앉아 양발을 바닥에 둡니다. 발끝을 위로 들었다 내리고, 이어서 뒤꿈치를 들었다 내립니다. 종아리에 힘이 들어가는 것을 느끼세요.

10~15회

02 앉아서 무릎 펴기



허리를 등받이에 붙이고 앉습니다. 한쪽 무릎을 천천히 앞으로 쭉 펴서 2초 멈춘 뒤 천천히 내립니다. 허벅지 앞쪽에 힘이 들어갑니다.

좌우 8회

03 앉아서 제자리 걷기



앉은 채로 걷듯이 한쪽 무릎을 가볍게 들었다 내리고, 반대쪽도 같게 합니다. 양손은 의자 옆을 잡아 몸이 흔들리지 않게 하세요.

좌우 10회

04 가슴·어깨 펴기



허리를 펴고 앉아 양팔을 어깨 높이까지 천천히 벌립니다. 숨을 들이쉬며 가슴을 펴고, 내쉬며 팔을 내립니다. 어깨가 아프면 편한 높이까지만 올리세요.

8~10회

05 의자 잡고 발꿈치 들기



의자 뒤에 서서 양손으로 등받이를 잡습니다. 발뒤꿈치를 천천히 들어 2초 멈춘 뒤 내립니다. 몸이 흔들리지 않게 배에 힘을 주세요.

8~10회

06 의자에서 일어나기



양발을 어깨너비로 바닥에 붙이고, 상체를 살짝 앞으로 기울이며 천천히 일어납니다. 앉을 때도 털썩 앉지 말고 천천히 내려앉습니다. 힘들면 손으로 의자를 짚으세요.

5~8회

운동 중단! 흉통·심한 숨참·어지럼 / 혈당 70 mg/dL 미만 / 수축기 180 또는 이완기 120 이상 / SpO_2 92% 이하

※ 처음에는 각 동작 1세트. 컨디션이 좋으면 점차 늘리고, 보행 불안정 시 반드시 보호자의 도움을 받으세요.

근거: 보건복지부·한국건강증진개발원 「어운완」(2024); CDC 신체활동 권고(2025). 교육용 축약 구성. 사진: AI 생성 예시 이미지(Canva).

어·운·완 핵심 리플릿

집에서 할 수 있는 가벼운 근력·균형 활동을 6가지로 정리했습니다.

01 몸풀기

고개를 천천히 좌우로 돌리고, 어깨를 올렸다 내리며 몸을 깨웁니다. 숨은 편하게 쉬면서 합니다.



02 의자 근력

의자에 앉아 무릎을 펴고, 팔을 들어 올리며 팔·다리 힘을 기릅니다. 한 동작에 5~8회부터 시작합니다.



03 발목·다리

의자 등받이를 잡고 서서 뒤꿈치를 천천히 들었다 내립니다. 종아리와 발목이 튼튼해집니다.



04 균형 연습

벽이나 의자를 곁에 두고 한 줄로 천천히 걷거나 제자리 걸음을 합니다. 흔들리면 바로 잡을 수 있게 합니다.



05 짝 운동

가족·동행자가 옆에서 함께 하거나 지켜봅니다. 어지럼이나 통증이 생기면 바로 말하고 쉬세요.



06 정리 운동

운동이 끝나면 천천히 숨을 고르고, 어깨·다리를 가볍게 늘려 줍니다. 급하게 일어나지 않습니다.



안전하게 시작하세요

어지럼·가슴통증·심한 숨참이 생기면 중단 | 처음에는 짧고 천천히 | 미끄럽지 않은 신발과 안정된 의자를 준비

근거: 보건복지부·한국건강증진개발원 「어운완(어르신 운동 완전정복)」 프로그램 구성을 교육용으로 요약.

사진 출처: 「찾아가는 건강검진 | 어르신 운동교육」 원본 안내자료 8·11쪽 인용

[교회명] 의료선교팀

어운완 운영의 기본 구조

공식 운영 매뉴얼에서 확인 가능한 구성 원칙 + 출장검진 현장 적용 제안

어·운·완의 목적

근력·균형 능력을 높여 낙상 위험을 줄이고, 어르신이 일상생활에서 지속적으로 움직이도록 돕는 프로그램입니다.

세 가지 운동 유형

유형 1
적응 운동 · 공통
누구나 시작하는 기본 동작

유형 2
의자 운동
앉거나 의자를 잡고 하는 동작

유형 3
짝 운동 · 서서
동행자와 함께, 서서 하는 동작

공식 운영 기간: 최소 12주

세 단계로 서서히 늘립니다

1~4주 적응 단계
앉아서 시작 · 운동법 익히기 · 중단 신호 확인

5~8주 습관 단계
반복횟수 서서히 늘리기 · 균형운동 포함

9~12주 유지 단계
일상 속 걷기와 결합 · 기록하며 지속하기

현장 운영 예시 (출장검진)

회기당 준비 5분 → 본 운동 10~20분 → 정리 5분. 횟수·시간은 공식 고정 처방이 아닌, 체력별 조정 예시입니다.

안전하게 실천하세요

검진 결과 이상(산소포화도 저하, 증상 동반 부정맥 의심, 조절되지 않는 혈압·혈당)이 있으면 운동보다 의료진 평가가 우선입니다.

운동 시작 전, 건강·안전 점검

특히 65세 이상·낙상 경험자·만성질환자는 개별 상태를 확인합니다.

1 시작 전 확인

최근 넘어짐, 보행 보조기, 복용약, 심혈관·관절 질환, 운동 시 통증, 저혈당 경험을 확인합니다.

2 즉시 멈출 신호

가슴통증, 심한 호흡곤란, 실신 느낌, 심한 어지럼, 새로 발생한 마비·언어장애는 운동을 중단하고 응급평가합니다.

3 측정 결과 이상 시

안정시 산소포화도 저하, 증상 동반 부정맥 의심, 조절되지 않는 혈압·혈당은 운동보다 의료진 평가가 우선입니다.

4 낙상 예방 환경

미끄럽지 않은 신발, 단단한 등받이 의자, 충분한 공간과 조명을 확보하고 처음에는 보호자 가까이에서 시행합니다.

운동 강도의 기준

말을 주고받을 수 있는 강도로 시작합니다. 통증을 참거나 숨을 멈추지 말고, 운동 후 다음 날까지 통증이 심해진다면 강도를 낮추고 진료를 상담하세요.

1회 운동 구성과 12주 실천기록

준비운동 → 근력·균형 → 정리운동을 한 세트로, 무리 없이 반복합니다.

준비 5분

목을 좌우로 천천히 돌리고 어깨를 올렸다 내립니다. 이어서 발목을 돌리고 제자리에서 천천히 걸으며 몸을 데웁니다.



본운동 10~20분

의자에 앉아 무릎 펴기, 의자에서 천천히 일어서기, 등받이 잡고 뒤꿈치 들기를 차례로 합니다. 각 동작 5~10회씩, 힘들면 쉬어 갑니다.



정리 5분

천천히 숨을 고르며 팔을 옆으로 벌려 가슴을 폅니다. 의자를 잡고 종아리·허벅지를 가볍게 늘려 근육을 풀어 줍니다.



12주 실천 기록표

주 3회 목표 · 운동한 날 한 칸씩 표시하세요

01주차 ☐☐☐	02주차 ☐☐☐	03주차 ☐☐☐	04주차 ☐☐☐	05주차 ☐☐☐	06주차 ☐☐☐
07주차 ☐☐☐	08주차 ☐☐☐	09주차 ☐☐☐	10주차 ☐☐☐	11주차 ☐☐☐	12주차 ☐☐☐

시작 전후 확인: 앉았다 일어서기·보행 안정성·유연성·균형 변화 등은 다음 검진에서 의료선교팀 의료진과 함께 확인합니다. 책자를 가져오시면 상담이 쉬워집니다.

※ 주차별 체크칸은 현장용 자체 재구성 양식이며, 원본 어운완 프로그램 운영 기록지가 아닙니다.

사진 출처: 「찾아가는 건강검진 | 어르신 운동교육」 원본 안내자료 8·11쪽 인용

[교회명] 의료선교팀

근감소 예방 운동

근력 감소를 늦추는 기본 동작을 안전하게 연습합니다.

1



의자에서 발뒤꿈치 들기

의자 등받이를 양손으로 잡고 바르게 섭니다. 발뒤꿈치를 천천히 들어 2초 멈춘 뒤 내립니다. 종아리에 힘이 들어가는 것을 느끼세요.

시작: 5회부터

2



의자에 앉아 다리 들기

허리를 펴고 앉아 한쪽 무릎을 가슴 쪽으로 천천히 들었다 내립니다. 반대쪽도 같게 하며, 양손은 의자 옆을 잡습니다.

시작: 좌우 각 5회

3



지지하고 몸통 바르게 세우기

양발을 바닥에 붙이고 앉아 배에 가볍게 힘을 주고 가슴을 폅니다. 그 자세로 편하게 숨 쉬며 20초 유지합니다.

시작: 20초 편안하게

어르신 운동 안전 수칙

동작 중에는 숨을 참지 마세요. 어지럼·가슴통증·심한 숨참·팔/다리 저림·통증 악화가 있으면 중단하고 진료받으세요.

영상과 다른 점

영상에는 바닥에 누운 코어운동도 있습니다. 안내문은 어르신용으로 의자 자세로 바꾼 동작입니다.

참조: 「누구나 즐길 수 있는 근감소 예방운동」 영상; 권장 횟수는 어르신 대상 자체 재구성. 사진: 이해를 돕기 위해 AI로 생성한 예시 이미지(Canva)입니다.

어깨 통증 예방

아프지 않은 범위에서 어깨 움직임을 부드럽게 만듭니다.

1



어깨 뒤로 모으기

앉아서 양팔을 몸 옆으로 편하게 벌립니다. 등 뒤의 날개뼈를 서로 가까이 모은다는 느낌으로 2초 조였다가 풉니다.

시작: 5회부터

2



앞으로 팔 들어올리기

한쪽 팔을 앞으로 뻗어 천천히 들어 올립니다. 아프지 않은 높이까지만 올리고 2초 멈춘 뒤 천천히 내립니다. 반대쪽도 같게 합니다.

시작: 좌우 각 5회

3



의자에 앉아 가슴 펴기

앉은 자세에서 양손을 허리 뒤에 가볍게 대고 가슴을 앞으로 폅니다. 허리는 젖히지 말고, 숨을 들이쉬며 5초 유지합니다.

시작: 5초 × 3회

어르신 운동 안전 수칙

동작 중에는 숨을 참지 마세요. 어지럼·가슴통증·심한 숨참·팔/다리 저림·통증 악화가 있으면 중단하고 진료받으세요.

영상과 다른 점

영상의 T바·도구 활용 스트레칭 등은 균형 부담을 줄이도록 도구 없이 단순화했습니다.

참조: 「일상생활 속 어깨통증 개선 및 예방을 위한 건강운동」 영상; 권장 횟수는 어르신 대상 자체 재구성. 사진: 이해를 돕기 위해 AI로 생성한 예시 이미지(Canva)입니다. [교회명] 의료선교팀

허리 건강 운동

허리 통증 없이 몸통과 다리를 안정적으로 사용합니다.

1



의자에 바르게 앉기

의자 깊숙이 앉아 양발을 바닥에 붙입니다. 엉덩이를 뒤로 붙이고 허리를 세워 머리끝이 위로 당겨지는 느낌으로 앉습니다.

시작: 10~20초

2



의자에서 일어섰다 앉기

상체를 살짝 앞으로 기울이며 다리 힘으로 천천히 일어납니다. 앉을 때는 털썩 앉지 말고 천천히 내려앉습니다. 힘들면 팔걸이를 짚으세요.

시작: 3~5회

3



지지하며 뒤꿈치 들기

의자 등받이를 잡고 서서 허리를 곧게 세웁니다. 발뒤꿈치를 천천히 들었다 내리며 종아리와 허리 주변 근육을 함께 씁니다.

시작: 5회부터

어르신 운동 안전 수칙

동작 중에는 숨을 참지 마세요. 어지럼·가슴통증·심한 숨참·팔/다리 저림·통증 악화가 있으면 중단하고 진료받으세요.

영상과 다른 점

영상에는 버드독·사이드플랭크·브리지 등 난도가 높은 동작이 있으며, 여기서는 보조 동작으로 대체했습니다.

참조: 「허리 건강 운동」 영상; 권장 횟수는 어르신 대상 자체 재구성. 사진: 이해를 돕기 위해 AI로 생성한 예시 이미지(Canva)입니다.

목 스트레칭

세게 비틀지 않고 부드러운 범위에서 목을 움직입니다.

1



턱 살짝 당기기

정면을 본 채 턱을 뒤로 살짝 당겨 '이중턱'을 만드는 느낌으로 3초 유지합니다. 고개를 숙이거나 젖히지 않습니다.

시작: 3초 × 3회

2



고개 좌우 돌리기

턱 높이를 그대로 두고 고개를 오른쪽으로 천천히 돌려 3초 멈춘 뒤 돌아옵니다. 왼쪽도 같게 하며, 아프면 덜 돌리세요.

시작: 좌우 각 3회

3



어깨 힘 빼고 이완

숨을 들이쉬며 양쪽 어깨를 귀 쪽으로 올렸다가, 숨을 내쉬며 툭 떨어뜨리듯 내립니다. 어깨에 쌓인 긴장을 풀어 줍니다.

시작: 5회

어르신 운동 안전 수칙

동작 중에는 숨을 참지 마세요. 어지럼·가슴통증·심한 숨참·팔/다리 저림·통증 악화가 있으면 중단하고 진료받으세요.

주의할 점

목을 강하게 젖히거나 눌러 늘리지 않습니다. 팔 저림·어지럼증이 나타나면 중단하세요.

참조: 「3분 만에 배우는 목 스트레칭」 영상; 권장 횟수는 어르신 대상 자체 재구성. 사진: 이해를 돕기 위해 AI로 생성한 예시 이미지(Canva)입니다.

무릎·발목 강화

움직임에 필요한 다리 힘과 발목 안정성을 기릅니다.

1



의자에서 무릎 펴기

허리를 펴고 앉아 한쪽 무릎을 천천히 앞으로 쭉 폅니다. 발끝을 몸 쪽으로 당긴 채 2초 버틴 뒤 천천히 내립니다. 허벅지 앞쪽에 힘이 들어갑니다.

시작: 좌우 5회

2



의자 잡고 뒤꿈치 들기

의자 등받이를 양손으로 잡고 바르게 서서 발뒤꿈치를 천천히 들어 올립니다. 2초 멈춘 뒤 내리며, 몸이 흔들리지 않게 합니다.

시작: 5~8회

3



앉아서 발목 까딱이기

앉아서 한쪽 다리를 살짝 들고 발끝을 몸 쪽으로 당겼다가 앞으로 밉니다. 발목만 움직이며, 발목 돌리기를 더해도 좋습니다.

시작: 좌우 10회

어르신 운동 안전 수칙

동작 중에는 숨을 참지 마세요. 어지럼·가슴통증·심한 숨참·팔/다리 저림·통증 악화가 있으면 중단하고 진료받으세요.

영상과 다른 점

영상의 머신·강한 저항·밴드 스쿼트는 제외하고, 낙상 위험이 적은 의자 동작 위주로 정리했습니다.

참조: 「무릎 및 발목 강화 운동」 영상; 권장 횟수는 어르신 대상 자체 재구성. 사진: 이해를 돕기 위해 AI로 생성한 예시 이미지(Canva)입니다.

저항밴드 근력운동

약한 밴드로 가볍게 시작하고, 항상 튕김에 주의합니다.

1



앉아서 밴드 당기기

밴드 가운데를 발바닥에 걸고 양끝을 손에 잡습니다. 팔꿈치를 몸 옆에 붙인 채 뒤로 천천히 당겼다가 천천히 풀어 줍니다.

시작: 5~8회

2



발바닥으로 밴드 밀기

앉아서 밴드를 한쪽 발바닥에 걸고 양끝을 손으로 잡습니다. 밴드를 밀며 무릎을 천천히 펴고, 다시 천천히 굽힙니다. 밴드가 발에서 벗겨지지 않게 하세요.

시작: 좌우 각 5회

3



밴드 없이 무릎 펴기

밴드가 어렵거나 불안하면 밴드 없이 합니다. 앉은 채로 한쪽 무릎을 천천히 펴서 2초 멈춘 뒤 내립니다. 같은 효과를 안전하게 얻을 수 있습니다.

시작: 좌우 각 5회

어르신 운동 안전 수칙

동작 중에는 숨을 참지 마세요. 어지럼·가슴통증·심한 숨참·팔/다리 저림·통증 악화가 있으면 중단하고 진료받으세요.

밴드 사용 시 주의

영상은 밴드를 이용한 다리운동 중심입니다. 손·발에 밴드를 안정적으로 걸고 얼굴 방향으로 튀지 않도록 합니다.

참조: 「저항밴드를 이용한 근력강화운동」 영상; 권장 횟수는 어르신 대상 자체 재구성. 사진: 이해를 돕기 위해 AI로 생성한 예시 이미지(Canva)입니다.

의자로 무릎 관리

고정된 의자를 활용해 무릎 부담을 조절합니다.

1



앉았다 일어나기

의자를 벽에 붙여 밀리지 않게 합니다. 양손으로 의자 앞쪽을 짚고 상체를 조금 숙이며 천천히 일어났다가, 다시 천천히 앉습니다.

시작: 3~5회

2



앉아서 무릎 펴기

허리를 펴고 앉아 한쪽 무릎을 아프지 않은 만큼만 천천히 폅니다. 2초 멈춘 뒤 천천히 내리며, 무릎이 아프면 덜 펴세요.

시작: 좌우 각 5회

3



의자 잡고 제자리 걷기

의자 등받이를 잡고 서서 한쪽 발을 바닥에서 조금만 들었다 내립니다. 반대쪽도 같게 하며, 무릎을 높이 들 필요는 없습니다.

시작: 좌우 각 5회

어르신 운동 안전 수칙

동작 중에는 숨을 참지 마세요. 어지럼·가슴통증·심한 숨참·팔/다리 저림·통증 악화가 있으면 중단하고 진료받으세요.

영상과 다른 점


영상의 높은 발올리기·넓은 스쿼트는 제외했습니다. 무릎통증이 심해지면 반복 횟수를 줄이세요.

참조: 「의자 하나로 할 수 있는 무릎통증 개선 및 예방운동」 영상; 권장 횟수는 어르신 대상 자체 재구성. 사진: 이해를 돕기 위해 AI로 생성한 예시 이미지(Canva)입니다. [교회명] 의료선교팀

오십견·어깨 굳음

어깨가 굳었을 때 통증을 악화시키지 않는 범위에서 움직입니다.

1




팔 늘어뜨려 흔들기

한 손으로 책상이나 의자를 짚고 상체를 살짝 숙입니다. 아픈 쪽 팔을 힘을 빼고 늘어뜨린 뒤, 추처럼 앞뒤·좌우로 작게 흔듭니다.

시작: 10~20초

2



벽 따라 손가락 올리기

벽을 마주 보고 서서 손가락 끝을 벽에 댑니다. 손가락으로 벽을 타고 천천히 위로 올라가다가, 아프기 시작하는 높이에서 멈추고 내려옵니다.

시작: 좌우 3~5회

3



가볍게 팔 앞으로 올리기

앉아서 아픈 쪽 팔을 앞으로 천천히 올립니다. 힘들면 반대 손으로 팔꿈치나 손목을 받쳐 도와주고, 편한 높이에서 3초 멈춘 뒤 내립니다.

시작: 좌우 3~5회

어르신 운동 안전 수칙

동작 중에는 숨을 참지 마세요. 어지럼·가슴통증·심한 숨참·팔/다리 저림·통증 악화가 있으면 중단하고 진료받으세요.

진료가 먼저인 경우

이 운동은 원인 확인을 대신하지 않습니다. 통증이 크거나 움직임이 급격히 제한되면 진료가 먼저입니다.

참조: 「오십견인가요」 영상; 권장 횟수는 어르신 대상 자체 재구성. 사진: 이해를 돕기 위해 AI로 생성한 예시 이미지(Canva)입니다.

몸풀기·정리운동

본운동 전후 급격하지 않은 움직임으로 몸을 준비합니다.

1



양팔 벌리며 호흡

바르게 서거나 앉아 숨을 들이쉬며 양팔을 옆으로 천천히 벌리고 가슴을 폅니다. 숨을 내쉬며 팔을 내리고 어깨의 힘을 뺍니다.

시작: 3~5회

2



제자리 천천히 걷기

의자 등받이를 잡고 제자리에서 천천히 걷습니다. 발은 바닥에서 조금만 들고, 30초 동안 숨이 차지 않는 속도로 합니다.

시작: 30초

3



의자 잡고 종아리 늘리기

의자를 잡고 서서 한쪽 발을 한 걸음 뒤로 놓습니다. 뒤쪽 발뒤꿈치를 바닥에 붙인 채 앞무릎을 살짝 굽히면 종아리가 늘어납니다. 10초 유지합니다.

시작: 좌우 10초

어르신 운동 안전 수칙

동작 중에는 숨을 참지 마세요. 어지럼·가슴통증·심한 숨참·팔/다리 저림·통증 악화가 있으면 중단하고 진료받으세요.

영상과 다른 점

영상에는 플랭크·강한 동적 스트레칭도 포함됩니다. 본 안내문은 어르신용으로 대체한 안전 예시입니다.

참조: 「몸풀기 스트레칭은 운동의 시작과 끝」 영상; 권장 횟수는 어르신 대상 자체 재구성. 사진: 이해를 돕기 위해 AI로 생성한 예시 이미지(Canva)입니다.

부록 · 문의와 연계 안내

검진 이후, 이렇게 이어집니다

1 **빨간 띠에 해당하면 진료 연계**

의료진이 가까운 병·의원 또는 보건소 방문을 안내하고, 필요하면 동행·예약을 돕습니다.

2 **주황 띠는 다음 검진에서 다시 확인**

생활관리 실천 후 변화를 함께 살핍니다. 책자의 12주 기록표에 체크해 두시면 상담이 쉬워집니다.

3 **언제든 연락하세요**

수치가 걱정되거나 증상이 생기면 아래 연락처로 문의하세요. 응급 증상은 먼저 119입니다.

의료선교팀 문의

[담당자] · [연락처]

연계 기관

[관할 보건소] · [협력 병원]

본 책자는 교육·안내용 자료이며 의료진의 진단과 처방을 대신하지 않습니다. 수치 해석과 치료 결정은 반드시 의료진과 상의하세요.

우리가 드리는 마음

오늘 만난 한 분 한 분의 건강과
평안을 위해 기도합니다.
몸을 돌보는 일이 곧 삶을 돌보는 일임을
함께 기억하겠습니다.

검진 결과와 관계없이 함께 기도하길 원하시거나, 돌봄이 필요한 이웃을 알고 계시면 의료선교팀에 알려 주세요.

기도 제목 / 메모

[교회명] 긍휼사역원

의료선교팀 · 국내 의료선교 건강검진