처음 유방암 진단을 받으신 분께

유방암 수술을 앞둔 분을 위한

작은 안내서

유방암이 어떤 병인지, 수술 뒤 몸을 어떻게 돌보면 되는지
쉬운 말로 정리했습니다.

본 안내서는 부산에 위치한 대학병원의 유방외과 교수에게 받은 유방암에 대한 정보를 토대로 만들어졌습니다.

참고 · 『유방암 환자를 위한 치료 안내서』 8판
유튜브 「우유TV」 · 한국유방암학회 · 국가암정보센터

2026. 10.

들어가며

유방암은 치료가 잘 되는 암입니다

유방암은 우리나라 여성에게 가장 많은 암이지만, 진단받은 분 100명 가운데 약 94명이 5년 뒤에도 건강하게 지냅니다. 일찍 발견했다면 대부분 완전히 낫습니다.

이 소책자는 유방암이 어떤 병이고 치료가 어떤 순서로 진행되는지, 수술 뒤에 몸을 어떻게 돌보면 되는지(상처, 팔, 음식, 운동)를 쉬운 말로 정리했습니다.

꼭 기억해 주세요. 이 안내서는 누구에게나 해당되는 일반적인 내용입니다. 사람마다 암의 상태와 치료법이 다르므로, 실제 결정은 꼭 담당 의사 선생님과 상의해 주세요.

차례

1	유방암 바로 알기	3
2	진단에서 수술까지	4
3	수술 뒤 몸 돌보기 — 상처, 팔, 림프부종	6
4	수술 뒤 무엇을 먹을까요	8
5	수술 뒤 운동과 생활습관	10
6	수술 뒤에 받는 치료와 정기검진	11
7	자주 묻는 질문	13
부록	선한 목자 — 양시온 성화 작품 중 예수님과 어린 양	14

1 유방암, 어떤 병인가요

유방 속에는 젖을 만드는 샘과 젖이 흐르는 관이 있습니다. 이곳의 세포가 비정상적으로 자라서 덩어리를 만드는 병이 유방암입니다. 암이 관 안에만 있으면 **0기(아주 초기)**, 관 밖으로 조금 퍼졌으면 **1기 이상**이라고 부릅니다.

유방암에도 종류가 있어요

종류	쉬운 설명	수술 뒤 주로 받는 치료
호르몬 반응형	여성호르몬을 먹고 자라는 암(10명 중 7명)	호르몬을 막는 약 5~10년
HER2 양성형	HER2 단백질이 많은 암	항암주사 + 표적치료
삼중음성형	위 두 특징이 모두 없는 암	항암주사 중심

병기(몇 기인지)는 어떻게 정하나요

암의 크기, 겨드랑이 림프절로 퍼졌는지, 다른 장기로 퍼졌는지를 보고 0~4기로 정합니다. 우리나라 환자 10명 중 9명은 0~2기, 즉 **초기 단계**에서 발견됩니다.

병기	쉬운 설명	5년 생존율(대략)
0기	암이 관 안에만 있음	거의 100%
1기	2cm 이하, 림프절에 퍼지지 않음	약 98%
2기	2~5cm 또는 림프절 1~3개	약 95%
3기	5cm 넘거나 림프절에 많이 퍼짐	약 80%
4기	뼈·폐·간 등 다른 장기로 퍼짐	약 40%

꼭 기억하세요. 수술 전에 들은 병기는 '예상'이고, 수술 뒤 조직검사로 '확정'됩니다. 대부분의 유방암은 완치를 목표로 치료합니다.

출처: 한국유방암학회 『유방암 백서』 · 국가암등록통계 · 『유방암 환자를 위한 치료 안내서』 8판

2 진단에서 수술까지

수술 → 남은 암세포를 없애는 추가 치료 → 정기검진

유방암 치료는 위 순서로 진행됩니다. 수술과 추가 치료까지 6개월~1년, 호르몬 약까지 포함하면 5~10년이 걸립니다. 길어 보이지만 대부분은 약을 먹으며 평소처럼 생활하는 기간입니다.

수술 전에 받는 검사

1. **유방촬영과 유방초음파** — 암의 크기와 위치, 몇 개인지 봅니다.
2. **조직검사** — 가는 바늘로 암 조직을 조금 떼어 어떤 종류의 암인지 확인합니다.
3. **유방 MRI** — 반대쪽 유방이나 숨은 병이 있는지 봅니다(필요한 경우에만).
4. **전신 검사** — 가슴 CT, 뼈 사진, 간 초음파 등으로 다른 장기에 퍼졌는지 확인합니다.
5. **기본 검사** — 피검사, 심전도, 가슴 X선 등 마취를 안전하게 하기 위한 검사입니다.

수술 전에 준비할 것

- 수술은 전신마취로 1~3시간 걸리고, 보통 2~5일 입원합니다.
- 먹고 있는 약(아스피린, 혈액을 묽게 하는 약, 건강식품 포함)을 모두 의료진에게 알려주세요.
- 수술 전날 밤부터 아무것도 먹지 않습니다(병원 안내에 따릅니다).
- 앞이 트인 편한 옷과 와이어 없는 부드러운 속옷을 준비합니다.
- 궁금한 것은 미리 적어 두었다가 의사 회진 때 물어보세요.

출처: 국가암정보센터 · 『유방암 환자를 위한 치료 안내서』 8판 · 「우유TV」

수술은 어떻게 하나요

수술은 두 가지를 정합니다. 하나는 "유방을 얼마나 떼어낼지", 다른 하나는 "겨드랑이 림프절을 어떻게 할지"입니다.

수술 이름	쉬운 설명	언제 하나요
부분절제 (보존수술)	암과 그 주변만 떼어내고 유방 모양은 남깁니다	암이 작고 한 곳일 때. 수술 뒤 방사선치료를 함께 합니다
전절제	유방을 전부 떼어냅니다	암이 크거나 여러 곳일 때. 가슴 모양을 다시 만드는 재건수술도 가능
감시림프절 검사	암이 가장 먼저 퍼지는 림프절 1~3개만 떼어 검사합니다	림프절에 퍼지지 않았을 것으로 보일 때(대부분 이 방법)
림프절 절제	겨드랑이 림프절을 넓게 떼어냅니다	림프절에 이미 퍼진 것이 확인됐을 때

부분절제와 전절제는 생존율이 같습니다. "다 떼어내야 안전하다"는 생각은 사실이 아닙니다. 부분절제 뒤에는 방사선치료를 함께 하기 때문에 재발 위험도 비슷합니다. 어느 쪽을 할지는 암의 상태와 본인의 바람을 함께 생각해 의사 선생님과 정합니다.

수술 뒤에 듣는 최종 결과

수술로 떼어낸 조직을 자세히 검사해서 **몇 기인지, 어떤 종류의 암인지**가 최종 결정됩니다. 결과는 보통 수술 1~2주 뒤 외래에서 듣게 되고, 이때 앞으로 어떤 치료를 받을지 정해집니다.

출처: 국가암정보센터 유방암 치료방법 · 삼성서울병원 유방암 수술 안내 · 『유방암 환자를 위한 치료 안내서』 8판

3 수술 뒤 몸 돌보기

수술 뒤 2~4주는 **상처가 아물고 팔을 다시 움직이는 시기**입니다. 무리하지는 않되, 가만히 누워만 있지도 않는 것이 가장 빨리 회복하는 길입니다.

상처와 피주머니(배액관) 관리

- 고인 피와 진물을 빼내는 가느다란 관이 1~2개 달려 있습니다. 하루 나오는 양이 30mL 보다 적어지면 뺍니다(보통 5~10일).
- 관이 달려 있는 동안은 통에 모인 양과 색을 매일 적고, 통은 가슴보다 아래에 둡니다.
- 샤워는 관을 뺀 뒤 의사가 허락하면 할 수 있습니다. 상처는 문지르지 말고 물만 흘린 뒤 가볍게 눌러 말립니다.
- 가슴이나 겨드랑이가 당기고 저린 것은 신경이 회복되는 과정입니다. 몇 달에 걸쳐 천천히 좋아집니다.
- **상처가 빨갛게 붓거나, 뜨겁거나, 고름이 나오거나, 열이 38도를 넘으면 바로 병원에 연락하세요.**

팔과 어깨 운동

수술한 쪽 팔은 **수술 다음 날부터** 조금씩 움직여야 어깨가 굳지 않습니다. 아프지 않은 만큼만, 하루 3번, 한 번에 10회씩 합니다.

시기	하는 운동	주의할 점
수술 1~3일	주먹 쥐었다 펴기, 손목·팔꿈치 굽히기, 어깨 으쓱하기	팔은 어깨 높이보다 높이 들지 않기
관을 뺀 뒤	벽 짚고 손가락으로 기어오르기, 머리 빗기, 등 뒤로 손 보내기	당기는 느낌까지만. 아프면 멈추기
2~4주	팔을 머리 위로 올리기, 어깨 돌리기, 가벼운 집안일	무거운 것은 들지 않기
4~6주 뒤	수영, 요가 등 평소 운동	의사에게 확인한 뒤 시작

출처: 삼성서울병원 「수술 직후 증상 관리」 · 『유방암 환자를 위한 치료 안내서』 8판

팔이 붓는 것(림프부종) 막기

겨드랑이 림프절을 떼어낸 뒤에는 수술한 쪽 팔이 부을 수 있습니다. 림프절 몇 개만 뗀 경우 20명 중 1명, 넓게 뗀 경우 5명 중 1명에게 생깁니다. 한번 생기면 완전히 없애기 어려우니 **평생 조심하는 것이 중요**합니다.

수술한 쪽 팔에서 하지 말아야 할 것

- 혈압 재기, 피 뽑기, 주사, 링거 맞기
- 꽉 끼는 옷·시계·반지, 무거운 가방 메기
- 쌀 한 포대처럼 5kg 넘는 것 들기, 같은 동작 오래 반복하기
- 사우나·찜질방, 아주 뜨거운 물에 오래 담그기
- 상처, 벌레 물림, 화상(설거지·요리할 때 고무장갑 끼기)

도움이 되는 것

- 쉴 때 수술한 팔을 베개 위에 올려 가슴보다 높게 두기
- 로션으로 피부를 촉촉하게 하고 손톱을 짧게 깎아 상처 막기
- 꾸준한 팔 운동과 걷기, 적당한 몸무게 유지
- 비행기를 오래 탈 때는 압박 소매 착용(의사와 상의)

팔이 무겁거나 붓고, 반지나 소매가 꽉 끼는 느낌이 들면 **바로 병원에 가세요.** 일찍 치료할수록 쉽게 좋아집니다.

4 수술 뒤 무엇을 먹을까요

유방암이라고 해서 **꼭 먹어야 하는 음식도, 절대 먹으면 안 되는 음식도 거의 없습니다.** 골고루, 적당히, 때맞춰 먹고 몸무게를 알맞게 유지하는 것이 가장 좋은 식사법입니다.

여섯 가지 기본 원칙

① 하루 세끼 거르지 않기
밥, 단백질 반찬, 채소 반찬

② 채소·과일은 끼니마다
과일 1~2개, 채소 반찬 2~3가지

③ 단백질은 꼭 챙기기
생선·닭·달걀·두부 손바닥만큼

④ 잡곡밥 먹기
흰쌀밥보다 현미·잡곡밥

⑤ 기름은 식물성으로
올리브유, 들기름, 견과류

⑥ 물 충분히 마시기
하루 6~8잔

먹어도 되는 것, 줄일 것, 피할 것

종류	자주 먹으세요	줄이세요	피하세요
밥·빵	현미, 잡곡, 통밀빵, 고구마	흰쌀밥, 흰 빵, 떡	—
단백질	생선, 닭고기, 달걀, 두부, 콩	소·돼지고기(주 2회까지)	햄, 소시지, 베이컨
채소·과일	채소, 제철 과일, 버섯, 해조류	과일주스, 말린 과일	—
유제품	저지방 우유, 플레인 요거트	치즈, 아이스크림	—
마실 것	물, 보리차, 녹차	커피(하루 2잔), 탄산음료	**술(모든 종류)**

출처: 국가암정보센터 「암 환자 식생활」 · 세계암연구기금(WCRF) 암 예방 권고

음식에 대해 자주 묻는 질문

콩, 두부는 먹어도 되나요? 네, 됩니다. 콩에 든 성분이 여성호르몬과 비슷하다고 걱정하시는데, 콩 음식은 유방암을 나쁘게 하지 않습니다. 오히려 재발을 줄인다는 연구가 많습니다. 다만 콩 성분을 농축한 알약이나 보충제는 피하세요.

고기는 끊어야 하나요? 아닙니다. 단백질이 부족하면 회복이 늦어집니다. 소고기·돼지고기를 줄이고 생선, 닭고기, 두부를 더 먹는 정도면 충분합니다.

술은요? 술은 유방암을 일으키고 재발시키는 것이 확실하게 밝혀진 몇 안 되는 음식입니다. 종류와 양에 상관없이 **끊는 것이 원칙**입니다.

설탕이 암을 키우나요? 설탕이 암세포를 직접 키우지는 않습니다. 하지만 단 음식은 살을 찌우고, 살이 찌면 재발 위험이 올라가니 줄이는 것이 좋습니다.

건강식품·민간요법은 조심하세요. 홍삼, 상황버섯, 개똥쑥, 고용량 비타민, 효소 같은 것들은 효과가 증명되지 않았고, 어떤 것은 항암제나 호르몬 약의 효과를 떨어뜨리기도 합니다. 무엇이든 먹기 전에 의사에게 먼저 알려 주세요. 주변의 권유로 병원 치료를 미루거나 끊는 일은 절대 없어야 합니다.

항암주사를 맞는 동안 먹기(해당되는 분만)

- 속이 울렁거리면 차갑고 담백한 음식(과일, 죽, 요거트)을 조금씩 자주 먹습니다.
- 입맛이 없어도 달걀, 두부, 생선 같은 단백질은 꼭 챙깁니다.
- 백혈구가 떨어진 시기에는 회, 육회, 생굴 같은 날것은 피하고 모두 익혀 먹습니다.
- 입안이 헐면 뜨겁고 맵고 짠 음식을 피하고, 소금물이나 생리식염수로 자주 헹굽니다.
- 비타민 D는 부족한 분이 많으니 피검사 뒤 필요하면 처방받아 드세요.

5 수술 뒤 운동과 생활습관

꾸준한 운동은 재발 위험을 **약 20~30% 줄여 줍니다.** 피로, 우울한 기분, 팔 붓는 것도 줄여 주어 약만큼 효과가 확인된 치료법입니다.

150분
일주일 걷기 목표
하루 30분 × 5일

2번
일주일 근력운동
3개월 뒤부터 가볍게

18.5~23
체질량지수 목표
160cm라면 47~59kg

시기	하는 운동	얼마나
수술 뒤 1~2주	병실·집 안 걷기, 팔 운동(3장)	하루 10~15분, 나누어서
2~6주	평지 걷기 20~30분, 스트레칭	약간 숨이 찰 정도
6주 뒤	빠르게 걷기, 자전거, 수영, 요가	하루 30분, 일주일 5일
3개월 뒤	근력운동(밴드, 1~2kg 아령부터)	일주일 2~3번, 천천히 늘리기

- 항암·방사선 치료 중에도 **가볍게 걷는 것은 계속**하세요. 피로가 줄어듭니다.
- 낮잠은 30분 안으로, 밤에는 7~8시간 자도록 합니다.
- **담배는 꼭 끊고**, 여성호르몬이 든 약과 건강식품(석류 농축액, 태반 제품)은 피합니다.

일상생활은 언제부터

가벼운 집안일, 산책	퇴원하자마자
운전	피주머니를 빼고 팔이 자유로울 때(약 2~3주)
직장·일상 복귀(사무직)	2~4주
무거운 짐, 오래 서서 하는 일	6주 뒤, 의사와 상의
비행기 타고 먼 곳 가기	수술 4~6주 뒤, 추가 치료 일정에 맞추어

출처: 미국암학회(ACS) 암 생존자 신체활동 지침 · 서울대학교병원 「암 치료 후 직장으로 복귀하기」

6 수술 뒤에 받는 치료와 정기검진

수술로 보이는 암을 없앤 뒤에는 **남아 있을지 모르는 아주 작은 암세포를 없애는 치료**를 합니다. 어떤 치료를 받을지는 수술 뒤 조직검사 결과(몇 기인지, 어떤 종류인지)에 따라 정해지며, 모든 환자가 모든 치료를 받지는 않습니다.

치료	누가 받나요	얼마나	흔한 불편
방사선	부분절제를 한 거의 모든 분, 전절제 뒤 림프절 전이가 있던 분	3~6주, 월~금 통원 (한 번 10~15분)	피부 붉어짐·건조, 피로
항암주사	림프절 전이, 삼중음성형, HER2형, 암이 큰 경우	3~6개월, 2~3주마다	머리카락 빠짐, 울렁거림, 백혈구 감소
표적치료	HER2형	1년, 3주마다 주사	심장 기능 확인(심장초음파)
호르몬 약	호르몬 반응형(10명 중 7명)	5~10년 매일 한 알	얼굴 달아오름, 관절통, 뼈 약해짐

호르몬 약은 재발을 거의 절반으로 줄이는 아주 중요한 치료입니다. 불편해도 스스로 끊지 말고 의사와 상의해 약을 바꾸거나 조절하세요.

- 폐경 전이면 '타목시펜', 폐경 후면 '아로마타제 억제제'라는 약을 주로 씁니다. 이름은 어렵지만 모두 하루 한 알 먹는 약입니다.
- 항암 때 빠진 머리카락은 치료가 끝나고 2~3개월 뒤부터 다시 자랍니다. 가발은 치료 시작 전에 미리 준비하면 마음이 편합니다.
- 방사선치료를 받은 부위는 1년 동안 직사광선을 피합니다.

출처: 한국유방암학회 진료권고안 · 국가암정보센터 유방암 치료 · 『유방암 환자를 위한 치료 안내서』 8판

정기검진은 이렇게

재발은 대부분 수술 뒤 5년 안에 생기므로, 처음 5년은 자주, 그 뒤로는 1년에 한 번 평생 검진합니다.

시기	얼마나 자주	무엇을
수술 뒤 1~3년	3~6개월마다	진찰, 피검사
수술 뒤 4~5년	6~12개월마다	진찰, 피검사
5년 뒤부터	1년마다	진찰
매년	1년마다	유방촬영·유방초음파(남은 유방과 반대쪽 유방)
호르몬 약 먹는 동안	1~2년마다	뼈 밀도 검사, 부인과 검진(타목시펜 복용 시)

이런 증상은 바로 알리세요

- 수술 부위, 반대쪽 유방, 겨드랑이, 쇄골 위에 새로 만져지는 멍울
- 2주 넘게 계속되는 뼈 통증, 기침, 숨참, 두통
- 이유 없이 살이 빠지거나 심하게 피곤함
- 호르몬 약을 먹는 중에 생리가 아닌 질 출혈

이런 증상이 있다고 모두 재발은 아닙니다. 하지만 **미루지 말고 확인하는 것**이 가장 안전합니다.

출처: 한국유방암학회 진료권고안 · 국가암정보센터 유방암 추적관찰

7 자주 묻는 질문

Q 수술을 빨리 하지 않으면 암이 퍼지나요?
유방암은 대체로 천천히 자랍니다. 진단 뒤 수술까지 4~8주는 검사와 준비에 필요한 정상적인 기간이고, 결과에 영향을 주지 않습니다.

Q 유방을 다 떼어내는 것이 더 안전한가요?
아닙니다. 부분절제+방사선치료와 전절제는 생존율이 같습니다.

Q 수술 뒤 통증은 얼마나 가나요?
직후 통증은 진통제로 조절되고 1~2주면 많이 줄어듭니다. 당기거나 저린 느낌은 몇 달 갈 수 있지만 점점 좋아집니다. 상처가 아물면(2~3주) 수술한 쪽으로 누워도 됩니다.

Q 항암주사를 맞으면 반드시 머리가 빠지나요?
약에 따라 다릅니다. 유방암에 많이 쓰는 항암제는 대부분 빠지지만 치료가 끝나면 다시 자랍니다. 두피를 차갑게 하는 방법으로 줄일 수 있는 경우도 있습니다.

Q 재발하면 끝인가요?
아닙니다. 같은 자리에 다시 생긴 경우는 다시 수술할 수 있고, 다른 장기로 퍼진 경우에도 호르몬 약과 표적치료로 오랫동안 건강하게 지내는 분이 많습니다.

Q 해외에 나가 오래 지내도 되나요?
수술과 추가 치료가 끝나고 의사가 허락하면 가능합니다. 호르몬 약은 넉넉히 처방받아 가져가고, 현지에서 1년마다 검진받을 병원을 미리 정해 둡니다. 팔 붓는 것을 막는 수칙은 어디서든 지킵니다.

Q 딸이나 자매도 검사를 받아야 하나요?
어머니나 자매가 유방암이면 위험이 약 2배 높아집니다. 환자가 진단받은 나이보다 10년 이른 나이부터, 늦어도 40세부터 매년 유방촬영을 권합니다.


Q 수술 뒤 임신이나 출산은 가능한가요?
가능합니다. 다만 항암과 호르몬 약을 쓰는 동안은 피해야 하므로, 계획이 있다면 치료 시작 전에 의사와 상의합니다.

출처: 한국유방암학회 환자 가이드 · 국가암정보센터 유방암 FAQ · 「우유TV」 · 『유방암 환자를 위한 치료 안내서』 8판

부 록

선한 목자

양시온 성화 작품 중 예수님과 어린 양 여덟 점



화가는 팔레스타인 광야의 목자가 하루를 보내는 순서대로 그렸습니다.
새벽에 이슬을 먹이고, 한낮에는 그늘에 데려가고,
물가를 찾고, 꽃을 찾고, 약한 양은 안아 올립니다.
치료의 시간 동안 한 장씩 넘겨 보시기 바랍니다.

그림 · 해설 양시온 | 『양시온 성화 작품 해설집 — 그림으로 만나는 예수님』 2부에서



01

새벽의 목자

예레미야애가 3:23
"이것들이 아침마다 새로우니"

광야에는 물이 없습니다. 양은 아침마다 풀에 맺힌 이슬을 먹고 하루의 수분을 채웁니다. 그래서 목자는 해가 뜨기 전에 양을 깨우고 앞서 갑니다. 양은 목자의 음성을 듣고 따라갑니다. 하루를 살아갈 힘은 아침에 채워야 합니다.

02

한낮의 그늘

시편 121:6
"낮의 해가 너를 상하게 하지 아니하며"

광야의 한낮은 40도까지 오릅니다. 털이 두터운 양은 더위를 이기지 못하고 탈진합니다. 그래서 목자는 낮이 되기 전에 그늘을 찾아 양을 데려가야 합니다. 시냇가 나무 그늘에서 양을 쉬게 하는 목자입니다.





03

쉴 만한 물가

시편 23:2
"쉴 만한 물가로 인도하시는도다"

광야에는 강이 없지만 그림 속에는 물이 흐릅니다. 양은 어디로 가는지 모르지만 목자는 물 있는 곳을 알고 있습니다. 관람객들이 이 그림 앞에서 "진짜 물인가요?" 하고 만져 봅니다. 예수님을 나의 목자로 삼으면 인생이 이렇게 고요하고 평안해집니다.



04

꽃밭의 양 떼

에스겔 34:14
"내가 좋은 꼴로 그들을 먹이고"

이 그림의 양들은 유난히 통통합니다. 풀만 먹은 양은 영양이 부족해서, 목자는 꽃밭을 찾아 양을 데려갑니다. 아침에 이슬을 먹이고, 낮에는 그늘에 데려가고, 물을 찾고, 꽃을 찾습니다. 목자의 하루는 이렇게 종일 바쁩니다.



05

안아 올린 양

이사야 40:11
"어린 양을 그 품에 안으시며"

혼자 먹지 못하는 약한 양이 있습니다. 목자는 그 양을 꽃밭에 둔 채 기다리지 않고 품에 안아 올립니다. 약한 양은 안아 주어야 합니다. 내 힘으로 먹지 못할 때 나를 안아 올리시는 목자입니다.



06

절벽의 양

누가복음 15:4
"그 잃은 것을 찾아낼 때까지 찾아다니지 아니하느냐"


양은 눈이 작아 시야가 1미터 남짓입니다. 앞이 낭떠러지인지 평지인지 모릅니다. 목자를 따르지 않고 따로 가다가 떨어지는 그 순간, 양을 찾아다니던 목자가 붙듭니다. 내 인생의 위기에 예수님이 나를 붙잡으셨던 그 기억을 그렸습니다.

07

품에서 잠든 어린 양

누가복음 15:5
"즐거워 어깨에 메고"

어린 양은 자꾸 어리광을 부립니다. 안아 달라고, 재워 달라고 합니다. 예수님 품에 안기면 양은 편히 잠이 듭니다. 예수님은 우리에게 이런 평안을 주시는 분입니다.





08

초원의 목자

요한복음 10:11
"선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와"

초원에서 양 떼와 함께 서 있는 예수님입니다. 선한 목자는 양을 위하여 목숨을 버립니다.

도움을 받을 수 있는 곳

국가암정보센터	암 정보 상담	1577-8899
한국유방건강재단	환우 모임, 유방암 교육	02-709-3900
중앙암생존자통합지지센터	치료 후 삶 지원	031-920-0190
치료 병원 유방암센터	담당 교수·전담 간호사	[외래 번호]

의료비 지원 — 진단 후 병원에서 **산정특례(암환자 등록)**를 신청하면 5년간 건강보험 본인부담금이 5%로 줄어듭니다. 담당 의사가 등록 신청서를 작성해 줍니다. 가입한 실손·암보험이 있으면 진단서와 수술확인서를 미리 받아 둡니다.

참고자료

유방암 전문의 50인, 『유방암 환자를 위한 치료 안내서』 8판, 영창출판사, 2022 · 유튜브 「우유TV: 우리 동네 유방외과」(유태경·명유진·한현호 교수) · 한국유방암학회(kbcs.or.kr) · 국가암정보센터(cancer.go.kr) · 한국유방건강재단(kbcf.or.kr)



"두려워하지 말라 내가 너와 함께 함이라
놀라지 말라 나는 네 하나님이 됨이라
내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와 주리라
참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라"

이사야 41:10

"내 은혜가 네게 족하도다
이는 내 능력이 약한 데서 온전하여짐이라"

고린도후서 12:9

이 안내서는 일반적인 건강 정보를 담고 있으며 담당 의료진의 진료를 대신하지 않습니다.
치료와 관련한 결정은 반드시 주치의와 상의하시기 바랍니다.