孤独症与发展障碍干预元分析
选题排名与母本使用方法

基于仓库中 33 篇英文元分析文献的整理 · 2026 年 10 月

内容	说明
一、选题排名（含检索截止时间）	32 个选题按选题价值排序，附检索截止时间、距今年数和母本适合度
二、以 0202 为母本的方法	社交技能团体干预：改做"学龄孤独症儿童 + 以中文文献为主"的本土化版本
三、以 0146 为母本的方法	写作干预：改为只纳入单一被试研究、效应量用 Tau-U
四、共同注意事项	撞题检查、数据提取、质量评价版本、常见硬伤

说明：选题价值是根据政策热度、本土化空间、读者面和新颖性做的主观判断；其中"新颖性"没有在知网核实。检索截止时间均来自各篇原文的方法部分，原文未写明的已注明。

一、选题排名（含检索截止时间）

"距今"按 2026 年 10 月计算，数字越大，可补充的新研究越多。选题价值为 5 星制，母本适合度为 3 星制。

排名	编号	选题	检索截止	距今	选题价值	母本适合度	主要理由
1	0343	融合环境中的孤独症干预	2017（纳入 1997–2017 年发表的研究）	约 9 年	★★★★★	★★	融合教育是政策核心方向，随班就读教师需求大
2	0355	本土 ABA 干预研究元分析（借思路，做"我国"版）	2023.07	约 3 年	★★★★★	★（只借思路）	只纳入中文研究，本土化最彻底；不需要母本留有更新空间
3	0598	技术（平板）干预的泛化与维持	2017.05（手工检索截止，数据库检索日期未写）	约 9 年	★★★★★	★★★	对应教育数字化；泛化和维持是国内干预实践的普遍短板
4	0005	自然情境发展行为干预（NDBI）	2018.01	约 9 年	★★★★	★★★	早期干预热点，ESDM、JASPER 等在国内推广快
5	0063	功能性沟通训练（FCT）与问题行为	2016（纳入 1985–2016 年发表的研究）	约 10 年	★★★★	★★★	问题行为是教师和家长最头疼的问题；国内 ABA 机构普遍在用
6	0064	非专业人员实施的干预	2018.12.31	约 8 年	★★★★	★★★	国内专业人员短缺，基层靠家长、普通教师实施
7	0328	照料者参与对沟通技能的影响	2018.11	约 8 年	★★★★	★★	家校社协同；母本已纳入中文文献，本土化路径现成
8	0069	校本干预与青少年问题行为	2020.09	约 6 年	★★★★	★★	培智学校高年级问题行为突出
9	0202	社交技能团体干预	2024.05.31	约 2 年	★★★★	★（英文更新版）/ ★★★（中文本土版）	国内团体干预实践普遍；母本几乎没纳入中国研究
10	WANG	情绪识别干预	2020.09.10	约 6 年	★★★★	★★★	可以接 AI 和技术干预热点；作者是中国学者，撞题风险高
11	0555	学前教育环境中促进入学准备的干预	2022.04.08	约 4 年	★★★	★★	对应幼小衔接政策；作者是北师大团队，已检索中文库，撞题风险高
12	0148	家长执行干预	2020.06.03	约 6 年	★★★	★★★	政策契合，但国内同类元分析多
13	0319	家长介导的游戏干预	2023（纳入 2000–2023 年发表的研究）	约 3 年	★★★	★	和家长干预主题重叠，母本太新
14	0329	嵌入兴趣的干预	2018.06	约 8 年	★★★	★★★	国内少见、新颖，课堂上马上能用
15	0147	就业技能干预	2015	约 11 年	★★★	★★	对应职业转衔政策；中文单一被试研究少
16	0187	培训教师和家长实施行为干预	原文未写（2016.08 投稿，推断不晚于 2016）	约 10 年	★★★	★	对应特教教师专业化；没有正式的调节检验
17	0483	平板语音生成设备（AAC）	2023.02	约 3 年	★★★	★	新颖，但中文研究很少，母本太新
18	0538	NDBI 结合 AAC	2022.12	约 4 年	★★★	★	新颖，但依赖英文研究

排名	编号	选题	检索截止	距今	选题价值	母本适合度	主要理由
19	0223	平板辅助数学教学	2022.11	约 4 年	★★★	★	对应培智生活数学；母本太新
20	0227	技术辅助的 STEM 干预	2021.12	约 5 年	★★★	★	作者是上海学者，撞题风险高
21	0146	智力与发展障碍学生的写作干预	2021.07	约 5 年	★★★	★（照原方法）/ ★★（改用 Tau-U，见第三部分）	对应培智语文，国内研究少
22	0380	孤独症学生的阅读理解教学	2020.03	约 6 年	★★★	★	随班就读语文有需求，理论框架偏专
23	0242	回应性干预与语言发展	2019.10.19	约 7 年	★★★	★★	和 NDBI、早期干预主题重叠
24	0190	聚焦式社交沟通干预	2018.07	约 8 年	★★★	★★	同上
25	0089	早期干预与社交沟通	2016.12	约 10 年	★★★	★★	主题宽，国内同类元分析多
26	0166	青少年社交技能干预	2018.12.31	约 8 年	★★★	★★	青少年阶段关注少，但中文研究少
27	0122	社交技能干预（情绪行为障碍和孤独症）	2018（纳入 1998–2018 年发表的研究）	约 8 年	★★	★★	"情绪行为障碍"在国内很少单独作为一类
28	0322 / 0204	Project AIM 综合早期干预	原文未写（纳入"1970 年至今"，2020/2021 年发表）	—	★★	★	太宽，个人无法复制
29	0080	FCT 后的强化程序稀疏	2018.06	约 8 年	★★	★★★	技术性强、主题窄
30	0167	多重强化程序	2019.07	约 7 年	★★	★★	同上
31	0348	基于条件的强化延迟	2020.11	约 6 年	★★	★	同上，统计方法难
32	0027	分解式操作教学（DTT）的实施忠实度	2019（纳入 1977–2019 年发表的研究）	约 7 年	★★	★	研究对象是实施人员，读者面窄

注：0146 的母本适合度在原排名中为 ★；按第三部分"只纳入单一被试、改用 Tau-U"的方案，可提到 ★★。

评分依据

维度	看什么
政策与热度	是否对应国内当前政策重点（融合教育、教育数字化、家校社协同、职业转衔等）和实践热点
本土化空间	国内是否有足够的中文实证研究可以纳入，能不能做出"中国证据"
读者面	《中国特殊教育》的读者主要是特教教师、康复人员和研究者，看他们是否关心、能不能直接用上
新颖性	国内是否还少有同主题的元分析（推测，未查知网）
母本适合度	更新空间（检索截止时间）、复制难度（纳入数量和统计方法）、框架完整度（质量工具和调节分析）

怎么看检索截止时间

- 2018 年及以前截止：更新空间大，最适合"在母本基础上补新研究"。选题 ★★★★ 以上又满足这一条的有：0343、0598、0005、0063、0064、0328。
- 2019–2021 年截止：还有一定空间，但要先估计这几年新增的研究够不够。
- 2022 年以后截止：基本没有更新空间，只适合借思路，像 0355 和 0202 那样改做中文本土版。
- 0187、0322/0204 原文没写检索日期，0598 只写了手工检索截止时间，使用前请到补充材料中确认。

二、以 0202 为母本的方法

选题方向：学龄孤独症儿童社交技能团体干预的元分析（以中文文献为主）

1. 母本基本信息

Afsharnejad, B., Whitehorne Smith, P., Bölte, S., Milbourn, B., & Girdler, S. (2026). A systematic review of implicit versus explicit social skills group programs in different settings for school-aged autistic children and adolescents. Journal of Autism and Developmental Disorders, 56, 1707–1724. https://doi.org/10.1007/s10803-024-06657-z

项目	内容
研究对象	6–18 岁孤独症儿童青少年的社交技能团体训练（2–3 名带领者带 4–8 名学生）
检索	Medline、CINAHL、Scopus、ProQuest、Web of Science；2013.1–2023.12，补检到 2024.5；只纳入英文文献
设计	只纳入 RCT，必须是团体形式
纳入数量	系统综述 65 篇，元分析 49 篇，205 个效应量，4554 名被试；中国研究仅 2 篇（Shum 2019，Zhang 2022）
质量评价	Kmet 标准质量评估量表（14 条，按百分比分级）
效应量	Hedges' g；研究内多个效应量按相关 0.5 合并（R 的 MAd 包）
发表偏倚	Egger 检验、漏斗图，用稳健贝叶斯元分析（RoBMA，JASP 软件）校正
结局分类	社会结局、行为/情绪问题、适应功能、孤独症特质、生理、感觉、幸福感，共 7 类
调节变量	教学策略（显性/隐性/混合）、场所（诊所/学校/休闲/家庭）、报告人、年龄段、样本量、对照组类型、研究质量、男性比例
主要结果	未校正 g = 0.49；校正发表偏倚后降到 0.04，不显著；教师评几乎无效果；教学策略和场所都不显著

2. 为什么不做英文更新版

- 检索已到 2024 年 5 月，几乎没有可补的新研究。
- 49 篇加 RoBMA 校正和分报告人分析，一个人复制难度大。
- 青少年方向已有 Afsharnejad 等（2023）的同类元分析，只做青少年会撞题。

3. 推荐做法：学龄儿童 + 以中文文献为主

立题依据：

- 母本 65 项研究中只有 2 项在中国开展，且都以英文发表，没有检索中文数据库。
- 母本的年龄调节分析提示：只纳入儿童的研究效应显著高于混合年龄的研究，儿童阶段值得单独分析。
- 国内资源教室小组课、学校团体辅导、康复机构社交小组很普遍，一线读者面大。

母本中儿童研究的数量（根据补充材料 Online Resource 1 的年龄信息整理）：

分类	全部 65 项	其中在 OSF 效应量数据中
儿童（年龄上限 ≤12 岁）	26	17
儿童（年龄上限 13 岁）	3	3
儿童（只报告平均年龄，推断）	2	1
青少年（年龄下限 ≥11 岁）	17	12
跨儿童和青少年	16	9
不确定	1	0

儿童研究（≤12 岁，26 项）：Afsharnejad 2024、Andrews 2013、Arnardottir 2023、Baghdadli 2013、Beaumont 2021、Begeer 2015、Coman 2018、Costescu 2017、Greco 2020、Ibrahim 2021、Kasari 2016、Koning 2013、Lee 2023、Lopata 2015/2016/2019/2020/2021、Marino 2020、Rahimi Pordanjani 2021、Sansi 2020、Soorya 2015、Souza Santos 2018、Temkin 2022、Thomeer 2019、Zhang 2022。另有上限 13 岁的 Dekker 2019、Holopainen 2019、Waugh 2015，只报告均值的 LaGasse 2014、Shih 2016。注意 Lopata 2019 和 2020 样本重叠，母本只保留了 2019。
完整清单见仓库文件"0202_纳入研究年龄分类.csv"。

4. 操作步骤

步骤	做法	和母本的关系
① 检索	英文库沿用母本 5 个库；中文库加知网、万方、维普。检索词：孤独症/自闭症 + 社交技能/社会技能 + 团体/小组/团辅。英文从 2013 年起或不限年份	沿用并扩充
② 纳入标准	6–12 岁；有孤独症诊断；团体形式（2–8 人）；结局含社交技能；有对照组（RCT 或准实验）。单组前后测要么排除，要么单独分析，不能和对照组研究直接合并	放宽设计（母本只要 RCT），收窄年龄
③ 编码	沿用母本的教学策略（显性/隐性/混合）、场所、报告人、7 类结局；新增：文献语言（中/英）、研究设计（RCT/准实验）、是否有普通同伴参与（如整合游戏团体）、干预总时长	沿用并扩充
④ 质量评价	可沿用 Kmet 量表（适用于不同设计）；也可 RCT 用 Cochrane RoB 2、准实验用 ROBINS-I。两人独立评分并报告一致性	沿用或替换
⑤ 效应量	Hedges' g；同一研究多个效应量先在研究内合并（母本做法：相关取 0.5），或用三水平模型/稳健方差估计	沿用
⑥ 发表偏倚	漏斗图 + Egger 检验 + 剪补法；有条件的话加 RoBMA 校正，和母本结果对照	沿用（RoBMA 可选）
⑦ 调节分析	研究数 ≥10 时做亚组分析或元回归：教学策略、场所、报告人、文献语言、研究设计、干预时长	沿用并扩充
⑧ 讨论要点	校正发表偏倚后效应是否仍显著；家长、教师、研究者报告不一致的原因；中文研究和英文研究效应是否不同；显性和隐性策略哪个更适合国内学龄儿童	母本留下的问题

5. 可直接利用的材料

- 补充材料 Online Resource 1：65 项研究的项目介绍、质量、纳入标准、场所、剂量、结局和结果（期刊页面 Supplementary Information）。
- OSF（https://osf.io/f6sm4/）：效应量数据 Meta_all_ES.csv（41 个研究编号、184 个效应量，已编好学段、场所、教学策略、质量）和 R 脚本。注意它和论文报告的 49 项、205 个效应量对不上，以论文和补充材料为准。
- 仓库中的"0202_纳入研究年龄分类.csv"：65 项研究的国家、年龄范围、年龄分类。

6. 母本中不要照搬的地方

- 摘要写检索到 2023 年，正文写 2022 年再补检，前后不一致。
- 效应量分级写成"<0.2 为小，0.2–0.5 为中"，和通行的 Cohen 标准（0.2/0.5/0.8）不一致。
- 质量分级中"50–10% good"属于笔误。

三、以 0146 为母本的方法

选题方向：智力与发展障碍学生写作干预的单一被试元分析（效应量改用 Tau-U）

1. 母本基本信息

Rodgers, D. B., & Loveall, S. J. (2023). Writing interventions for students with intellectual and developmental disabilities: A meta-analysis. Remedial and Special Education, 44(3), 239–252. https://doi.org/10.1177/07419325221108896

项目	内容
纳入	52 项研究（40 项单一被试、12 项组间），96 个写作结局，424 名学生
检索	ERIC、PsycInfo、ProQuest 学位论文、Academic Search Premier + 手工检索 + 前后追溯；截止 2021 年 7 月；只纳入英文
质量评价	WWC 标准 4.1 版（2020），分完全符合、有条件符合、不符合三档
效应量	单一被试用 BC-SMD（跨个案标准化均差），组间用 Hedges' g，两者合并；用稳健方差估计处理多效应量（R：metafor + clubSandwich）
编码	干预归为 8 类（直接教学、单纯示范、同伴指导、写前准备、系统强化、反应提示、自我监控、策略教学）；结局归为 10 类
主要结果	写作干预效果显著；效果受干预类型和研究质量调节

2. 照原方法做的难点

- BC-SMD 门槛高：每个数据点都要从图上取出来；单一被试研究必须至少 3 名被试、测量指标相同；跨情境/跨行为多基线设计不能用（母本因此排除了 13 篇）。
- 合并方法复杂：单一被试与组间效应量合并，再用稳健方差估计，需要写 R 代码。
- 结局类别不适合中文：拼写、写作规范等类别对应英文写作；国内培智语文以写字、写句、看图写话为主。

3. 改造方案：只纳入单一被试，效应量用 Tau-U

这样改在方法上是成立的，仓库中 0063、0598、0223、0227、0483 等都用 Tau-U。好处是：Tau-U 没有"至少 3 名被试、测量相同"的限制，母本因 BC-SMD 排除的研究和只有 1–2 名被试的中文研究都可以纳入。但这样就属于"借用 0146 的框架"，不是严格意义上的更新版，文中要说明。

步骤	做法
① 检索	英文库沿用母本 4 个库并补充；中文库加知网、万方、维普。可不限年份（母本也不限），或以母本清单为基础补 2021 年 7 月以后的研究
② 纳入标准	智力障碍、孤独症等发展障碍学生；有写作教学干预；单一被试设计（多基线、倒返、变更标准等）；能从图中提取各阶段数据。不设被试人数下限
③ 质量评价	首选 Kratochwill 等（2013）的 WWC 单一被试设计标准；若引用 WWC 4.1 或 5.0，要写明"仅采用其设计标准"。可参考 0598 改编的 6 条：自变量系统操纵、收集 IOA、IOA 覆盖每阶段 ≥20% 数据点、IOA 达标（≥80% 或 Kappa ≥0.60）、≥3 次效应重复、每阶段最少数据点
④ 数据提取	用 WebPlotDigitizer 从图中取点；两人独立提取并报告一致性
⑤ 效应量	Tau-U（Parker et al., 2011）。事先规定基线趋势的处理规则（例如基线 Tau 达到某个阈值才做趋势校正）并在文中写明；也可改用基线校正 Tau（Tarlow, 2017）。建议同时报告视觉分析结果
⑥ 合并	先算每个 A-B 对比，再在研究内合并，最后按逆方差加权得到总效应
⑦ 调节分析	干预类型（沿用母本 8 类）、结局类别（改为中文：写字/书写、句子、写话/作文产出、写作质量、策略步骤）、障碍类型、学段、干预次数、研究质量、文献语言；用 Kruskal-Wallis 检验或加权 Q 检验

4. 质量评价工具和 Tau-U 的匹配

标准	单一被试效应量	和 Tau-U 是否匹配
Kratochwill 等 2010 / 2013	未规定统一效应量，常配合视觉分析和非重叠指标	匹配，最常见的组合
WWC 4.1 版（2020，0146 使用）	设计可比效应量（D-CES，与 BC-SMD 同类）	只用其设计标准时可以；用于效应量则不匹配
WWC 5.0 版（2022）	设计可比效应量；基线至少 6 个数据点才能评"完全符合"；增加 NAP ≤0.85 的偏倚风险检查	同上，审稿人可能追问

推荐写法：

> 研究质量参照 WWC 单一被试设计标准（Kratochwill et al., 2013）进行评定；效应量采用 Tau-U（Parker et al., 2011）计算。

WWC 5.0 的具体条目来自官方变更说明和二手文献，正式写入论文前请下载手册第六章核对原文。

5. 需要说明的地方

- 在方法部分说明为什么不用 BC-SMD：纳入研究被试少、设计多样，不满足 BC-SMD 的条件。
- Tau-U 有天花板效应（效应量容易集中在 0.9–1.0）和对基线趋势敏感的问题，要在局限部分说明。
- Tau-U 和母本的 BC-SMD 不能直接比较数值，讨论时只比较方向和调节变量的结论。
- 国内智力障碍学生写作干预的单一被试研究数量需要先在知网核实，数量不够时考虑扩大到"语文/读写干预"。

四、共同注意事项

- 先查知网：选定主题后检索"主题词 + 元分析"，确认近两三年没有同主题的中文元分析。
- 数据回到原始研究提取：母本的框架和纳入清单可以沿用，效应量数据要从原始研究重新提取，并在文中引用母本。
- 避免向松柏（2024）的三个硬伤：调节效应结果和讨论前后矛盾；同一样本的多个结局重复计入总样本量；RCT 和单组前后测的效应量直接合并。
- 质量评价工具写明版本，并严格按该版本的条目评定。
- 本文件局限：选题价值为主观判断；新颖性和撞题风险未在知网核实；部分研究的检索日期为推断。