

录像示范法与现场示范法对学前自闭症儿童社交沟通能力干预效果的比较研究*

李欢^{1**} 郭晓倩^{1,2} 彭燕¹

(1. 西南大学教育学部特殊教育学院, 重庆, 400715;

2. 西安翻译学院教育学院, 西安, 710105)

摘要 自闭症谱系障碍儿童的社交沟通障碍是其核心障碍之一,本研究旨在比较录像示范法与现场示范法在幼儿园游戏情境中对学前自闭症儿童社交沟通能力的干预效果。通过采用单一被试实验设计中的跨被试多基线设计结合交替处理设计,并在交替处理期中增加撤回期和最佳处理期,检验录像示范法和现场示范法对三名学前自闭症儿童社交沟通能力的有效性。研究结果表明,录像示范法与现场示范法均能够提升自闭症儿童社交沟通能力,但录像示范法的干预效果优于现场示范法,且录像示范法对学前自闭症儿童的社交沟通行为具有良好的维持效果。基于以上发现,对未来录像示范法的研究及实践提出相关建议。

关键词 录像示范法 现场示范法 自闭症 社交沟通障碍

分类号 G760

1 问题的提出

社交沟通障碍,是自闭症谱系障碍儿童的核心障碍之一^[1]。美国自闭症国家专业发展中心(National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders, NPDC)^[2]和国家孤独症中心(National Autism Center, NAC)^[3]发布的自闭症谱系障碍循证实践报告中均提出了一系列对自闭症儿童社交沟通障碍有效的干预方法,示范法(Modeling)便是其中之一。示范法来源于班杜拉(Albert Bandura)1977年提出的社会学习理论(Social Learning Theory),即人类大多数行为是通过观察学习所习得的,在观察学习的过程中,观察者是学习者,被观察者便是示范者,观察的行为便是即将学习的目标行为^[4]。示范法可分为录像示范(Video Modeling, VM)和现场示范(In-vivo Modeling)两种形式。早在几十年前就已有研究证明了现场示范法在自闭症儿童干预中的有效性。1981年,Egel等人采用该方式让自闭症儿童观察普通儿童的示范行为学习各种任务(颜色、形状、方位的学习和辨别),取得了较好的干预效果^[5];1983年,Charlop等人研究表明现场示范法有助于目标行为的维持与泛化^[6]。至今为止,现场示范法仍是自闭症儿童教学中使用最广泛的示范教学方式^[7]。上世纪90年代起,随着各类电子设备的普

及,在现场示范法的基础上,产生了使用录像设备对干预对象进行视觉支持的教学方法,即录像示范法^[8],该方法包括成人示范、同伴示范、自我示范、观点示范和录像提示等多种类型^[9]。录像示范法不仅可以用于提升自闭症儿童的社交沟通技能,还可用于干预自闭症儿童的认知能力、学业能力、适应能力、职业技能等等^[10]。作为一种省时省力的有效干预方法,近年来录像示范法却并未在实际教学中被广泛应用^[11]。

国际上有关两类示范教学法的有效性证据已经越来越多,但对两类示范法干预效果的比较研究数量却非常有限,且研究结果尚存争议。2000年,Charlop-Christy等学者研究发现,录像示范法在诊所环境中能够使学龄自闭症儿童更快地掌握各种技能^[12];2005年,Gena等学者研究发现,录像示范法和现场示范法在家庭的环境中对于学龄自闭症儿童的行为习得具有类似的干预效果^[13];2013年学者Wilson在学校环境中对学前自闭症儿童社交沟通障碍的干预研究发现,在部分被试身上现场示范法的干预效果更加明显^[14]。目前,国内还没有直接、系统地比较两种示范法对自闭症儿童干预效果的实证研究,因此本研究旨在通过单一被试实验设计,比较录像示范法与现场示范法对学前自闭症儿童社交沟通能力的干预效果,以期对未来自闭症儿童的教学和干预提供建议。

* 本文为2016年重庆市教育科学规划重点课题“循证视阈下自闭症谱系障碍儿童社交干预研究”(项目批准号:2016GX001)、2016年中央高校基本业务费专项资金资助重点项目“循证视阈下自闭症谱系障碍儿童的干预研究”(项目批准号:SWU1609119)、2018年中央高校基本业务费专项资金资助学生项目“录像示范法在自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍干预中的循证实践研究”(项目批准号:SWU1809432)的阶段性成果。

** 李欢,博士,副教授,研究方向:特殊教育基本理论,特殊儿童语言康复。E-mail:flora1112@126.com。

2 研究设计

2.1 实验对象

本研究选择学龄前自闭症儿童进行社交沟通障碍的干预研究,被试筛选标准为:①经三甲医院鉴定为自闭症;②能保持持续的出勤;③具有非口腔器质性缺损导致的社交沟通障碍;④喜欢看电视,能于电视机前持续观看 5 分钟以上;⑤未接受过类似研究的介入;⑥经由教师推荐,获家长知情同意。基于以上要求,通过一周的持续观察与教师的访谈推荐,初步筛选出就读于某融合幼儿园不同班级的 3 名研究对象参与本研究。被试 Z 年龄 5 岁 3 个月,不会主动与人交谈,常有无意义的回声式语言,且吐字含糊不清,语速过快;缺乏目光注视,常以动作代替口语表达需求;能够理解指令,并依照简单指令做动作。被试 M 年龄 5 岁 2 个月,经常重复他人的语言,且言语刻板,语调异常;在与他人沟通时较少出现面部表情的变化,也较少出现目光注

视;能够理解指令,并依照指令做简单动作。被试 Y 年龄 4 岁 6 个月,会仿说简单的词语,少有口语的沟通行为,声音小,语速快,吐字含糊不清;与他人沟通时少有目光注视与动作出现;能够理解简单指令,并在提示下做动作。

2.2 实验设计

本研究采用单一被试实验设计中的跨被试的多基线设计结合交替处理设计(Alternating Treatment Design, ATD)对 3 名学前自闭症儿童进行干预研究,以此比较录像示范法和现场示范法的干预效果。为了进一步探究最佳干预方法的干预效果,本研究设计在交替处理结束后加入了最佳处理期(Best Treatment Phase)^[14]。因此,本研究的流程分为基线期、交替处理期 1、撤回期、交替处理期 2、最佳处理期、维持期六个阶段。

2.2.1 因变量

表 1 社交沟通目标行为

序号	研究者沟通脚本		被试目标行为	
1	这是什么?	回应他人	口语 动作	这是积木(小鱼)。 手指积木
2	我们一起玩积木吧?	回应他人	口语 动作	好啊好啊! 手拿积木
3	你想玩哪个?	回应他人	口语 动作	我想(要)玩 xxx。 手指对应积木
4	你开心吗?	回应他人	口语 动作	我很开心! 点头,表情高兴
5	你拼好了吗?	回应他人	口语 动作	我拼好了。 拿起积木展示
6	请给我一块积木?	回应他人	口语 动作	给你积木。 把积木放在老师手里
7	好的,我帮你。	主动表达	口语 动作	老师请帮我一下。 把积木放到老师手
8	哇,真漂亮。	主动表达	口语 动作	看,我的 xxx! 拿起积木展示
9	给你积木。	主动表达	口语 动作	请给我一个积木。 伸手拿积木
10	好的,我们一起玩。	主动表达	口语 动作	我们一起玩积木吧! 手指积木

本研究的因变量为学前自闭症儿童的社交沟通技能,根据反应类型分为回应他人与主动表达两类,每项目标行为都涉及口语与动作两方面^[14]。社交沟通技能目标行为的设定以被试社交沟通能力的实际发展水平和日常交流需求为基础,确定示范教学开展的情境,并在此情境中设置适合于被试的社交沟通行为目标。笔者利用一周时间直接观察被试在幼儿园常规活动中

的社交沟通表现,并结合研究者在实验前对家长以及教师的访谈,选择了 3 名被试感兴趣的蒙台梭利拼图板游戏作为本研究的示范教学情境,并编写长度和复杂程度合适的沟通脚本(script)^[14],最终确定的 10 项目标行为如表 1 所示。

为避免目标行为呈现顺序带来的影响,本研究采用 1+2 的模式进行目标行为排序,即每次随机呈现一

项前一次干预目标行为与两项非前一次干预目标行为。例如首次干预时选择的目标行为序号为1、2、5,第二次干预时则呈现1、3、6,其中含一项与前一次干预示范内容相同的目标行为。

2.2.2 自变量

本研究中的自变量为以录像示范法与现场示范法为核心的干预策略,以下从干预情境、示范类型与示范者、干预流程等几方面进行详细介绍。

首先,本研究选择了蒙台梭利拼图板游戏作为干预情境。在前期对被试的观察以及对家长、教师的访谈中得知,三名被试均对颜色鲜艳的操作类材料感兴趣,因此本研究选用蒙氏拼图积木作为本实验的干预情境,符合儿童的认知特点,且易于引发儿童的沟通行为。本研究的实验环境为经过布置、无杂物堆放、与园内活动区隔离的一间教室。教室内固定位置放有一张桌子、几把叠放的椅子、用于记录数据的三脚架与录像设备,桌子旁放置每次干预时要使用的蒙氏拼图积木,如图1所示。




图1 实验场景布置图

本研究所采用的示范类型为成人示范,示范者为特殊教育专业研究生,有丰富的特殊教育一线教学经验,熟悉自闭症儿童的行为表现,能够保证长期出勤,因此现场示范与录像示范法中均以该研究生作为示范者,保证示范者的统一性。

示范教学实施流程中现场示范法与录像示范法除了示范类型不同,其余流程基本一致,具体如图2所示。①现场示范法:首先,带领幼儿进入干预环境,具体做法为于固定的时间到被试所在的教室中与幼儿打招呼,并带领幼儿一起进入布置好的个训室;其次,告知幼儿当天的活动任务,向幼儿展示活动材料与强化物;然后,进行干预活动,即向被试现场示范在进行积木活动时产生的社交行为并在活动中引导模仿。每次干预时随机示范三组目标行为(如表1所示),每一组社交沟通行为脚本由示范者与研究者现场示范两次,随后再现游戏场景,创造相似的社交机会与幼儿进行

两次社交行为的模仿练习,若被试未在规定时间内表现出对应的目标行为,研究者应给予一定的口头或动作提示。随后,在脱离示范的情况下,再现社交情境并收集目标行为数据。为了避免幼儿机械地背诵目标行为,在第一次收集完三个行为目标的数据之后,再将三个行为顺序随机打乱,按不同顺序再现三个社交情境,收集三个目标行为各两次以获取更加稳定的评估数据,即一共收集三项行为数据各三次。在干预过程中合理使用强化策略,在观看示范行为阶段,幼儿表现出对示范行为的积极关注时则给予强化物,增强被试对示范教学的关注,在练习模仿时不给予任何强化,即本研究中只强化对示范教学的关注,不强化模仿行为。

②录像示范法:除示范法类型不同外,干预情境、干预程序、强化原则等与现场示范法保持一致。在与现场示范相同的场景中观看研究者与示范者在相同情境下拍摄的目标行为视频。每次随机抽选三组目标行为视频,由研究者播放示范视频,每段视频连续播放两次,视频播放媒介为笔记本电脑,视频播放完之后同样再现游戏情境,立即提供被试两次练习的机会,若被试未表现出相应的社交行为,由示范者提示(口头或动作辅助)被试在具体情境中表现观察到的目标行为。




图2 示范教学实施流程图

2.3 研究工具

2.3.1 评估工具

本研究使用自编的《目标行为评量表》对被试目标行为的达成情况进行评分。被试独立表现出完整的目标行为记作3分,提示下完整表达言语行为记作2分,独立表达不完整言语行为记作1分,独立表现动作记作1分,研究者动作辅助下表现动作不计分,错误回应或者无回应不计分,故一项目标行为包含语言和动作,最高共计4分,每次干预3个行为,每项行为记录3次,即每个干预期数据点满分为36分。为确保干预的实施过程与预定的干预计划保持一致,避免研究者在干预实施过程所产生的实验误差,本研究自编《干预忠诚度检核表》对所实施干预程序的忠诚度进行检核。为了发现干预对象感兴趣的物品与活动,本研究采用了改编自十方教育中心的《强化物调查表》^[8]。

2.3.2 活动材料

本研究采用8套色彩鲜艳的蒙氏拼图积木作为教学材料,拼图难度不一、块数不同、形状多元、主题各异,每次随机选择4套作为教学材料。

2.3.3 录像资料

依据表1中的目标行为,本研究共有10段录像资料,每段录像仅包含一个目标行为,具体内容为目标行为脚本中的情景对话,对话人物为实验者与示范者,录像地点与现场示范一致,为日常干预所在的个训教室。示范视频由片头(目标行为名称)、字幕(对话内容)和目标行为示范三部分组成,时间为15秒到20秒。

2.4 研究信效度分析

2.4.1 评分者一致性

本研究采用点对点一致性比率的方法来计算评分者一致性,通过评分者间一致性的次数除以一致加上不一致次数的值,乘以100%进行计算^[9]。评分者为本研究第二作者,对每一次数据点进行评分;研究助理为参与研究的示范者,熟悉评分标准以及目标行为表现,采用与评分者相同的评分标准,随机抽取干预各阶段30%的数据点进行一致性系数的计算,得出被试Z的平均评分者一致性系数为93.6%,被试M的平均评分者一致性系数为95%,被试Y的平均评分者一致性系数为97.1%,总体信度平均值为94.8%,达到了2014年美国公布的《自闭症谱系障碍儿童、青少年及成人循证实践报告》中要求的92%的评分者一致性标准^[9]。

2.4.2 干预忠诚度

为了检验干预过程的忠诚度,笔者在实验结束后随机抽取每名被试各阶段干预次数30%的干预视频进行忠诚度检核。由研究助理观看录像,根据自制《干预忠诚度检验表》检验干预操作过程是否严格按照干预流程设计进行。被试Z的干预忠诚度得分为96.36%,被试M的干预忠诚度得分约为94.54%,被试Y的干预忠诚度得分为96.36%,三名被试的干预

忠诚度平均分约为95.75%,达到了《自闭症谱系障碍儿童、青少年及成人循证实践报告》中要求的80%的标准。

2.4.3 社会效度

经过对被试的主班教师和家长的访谈,了解到家长与老师均对示范法的干预效果持肯定态度,认为示范法适用于自闭症儿童社交沟通能力的干预,且教师能够观察到被试在干预后社交沟通行为的增加,情绪行为问题的减少,专注力也有一定提升。在两种示范法中,教师的态度更倾向于录像示范法,认为其便于操作,也更符合自闭症儿童的视觉学习特点,几位教师均表示在日常的教学中会采用录像示范教学的方式对自闭症儿童进行干预教学。

3 研究实施

依据美国教育部有效教育策略资料中心(What Works Clearinghouse, WWC)颁布的《单一被试实验设计技术资料》(SINGLE-CASE DESIGN TECHNICAL DOCUMENTATION),单一被试实验设计各阶段的数据点应至少3-5个,其中3个数据点为最基本要求(with reservation),5个数据点符合标准^[1]。本研究各阶段的实验次数≥数据点数量,考虑到控制实验操作的非干预性程序,减少被试工作量,故各阶段数据点均为3-5个,远低于干预次数。被试Z在基线期数据非常平稳,故收集3个数据点后即进入了交替处理期1;此外,在撤回期考虑到伦理问题,为避免长时间让被试处于无干预措施的情境中,故每名被试只收集连续3天的数据点;交替处理期2是交替处理期1的延续,3个数据点即可;最佳处理期与维持期数据点也满足要求。

3.1 基线期(A)

此阶段为基线观察期,即对三名被试在拼图游戏中的社交沟通行为进行干预前的数据收集。被试Z的基线期为3日,其在3次基线期数据中表现非常平稳,之后进入干预期;被试M的基线期为12日,共进行5次基线期数据的收集;被试Y的基线期为25日,在此期间共进行5次基线期数据的收集。在每名被试的基线期阶段不做任何形式的干预,并保持环境控制与干预环境的一致,使用摄像设备记录被试的行为表现。

3.2 交替处理期1(B)

此阶段为录像示范(VM)和现场示范(VIVO)的首个交替处理阶段,采用交替处理的实验设计对被试进行目标行为的教学示范,即每天采用一种示范教学法,并对每种干预方法各收集5个数据点。值得注意的是,为排除顺序效应的影响,笔者将两种干预方法的先后顺序随机化,即被试Z与被试M在此阶段的教学方式呈现顺序为录像示范——现场示范,被试Y在此阶段的教学方式呈现顺序为现场示范——录像示范。

3.3 撤回期(A)

此阶段为撤销干预期,即在此阶段不对被试做任何形式的干预,用以观察被试在此阶段的社交沟通行为表现,目的是明确两种示范教学方法的干预效果。在此阶段对每名被试收集3个数据点,并采用与干预期相同的评分标准对其目标行为表现进行评估。

3.4 交替处理期2(B)

此阶段对被试继续进行现场示范与录像示范的交替处理,实验控制与实验流程与B阶段一致,每种干预方法各收集3个数据点,进一步明确两种干预方法的干预效果,并于干预后对目标行为达成进行评估,通

过视觉分析折线图确定最佳干预方法。

3.5 最佳处理期(C)

在此阶段采用B阶段显示出最佳干预效果的示范方法进行干预,即明确最佳干预方法的干预效果。除干预方法外,其余变量与B阶段保持一致,对每名被试进行4次数据点的采集。

3.6 维持期(G)

此阶段为干预的最后一个阶段,在干预撤销后对被试进行目标社交沟通行为的持续评估,对每名被试进行3次的数据采集,测量方式与基线期相同。




图3 干预效果总体目视分析图

4 研究结果

图3显示了录像示范法和现场示范法干预效果的总体得分。总体上看,三名被试的目标行为得分在两个交替处理期以及最佳处理期均有明显上升趋势;在交替处理期B和B',录像示范法与现场示范法相比,上

升趋势更加明显;在撤回期,三名被试的社交沟通能力得分均有明显回落;在维持期,三名被试均表现良好,得分较高。

被试Z在基线期的社交沟通能力得分平均值为2.33,得分水平较低,水平稳定性*和趋向稳定性**均为100%,可以进入干预期。进入交替处理期后在

* 水平稳定性:指各个资料点数值的变化范围,如果某一个阶段80%及以下的资料点落在该阶段平均值的20%的波动范围内,则可视其为水平稳定的资料。水平稳定性等于该阶段平均值上下20%范围内的资料点数除以总资料点数。

** 趋向稳定性:指阶段内资料点趋势线变化的稳定性,当某一个阶段80%及以上资料点落在趋势线上下20%的范围内则可视其为趋向稳定。趋向稳定性等于落在趋势线上下20%范围内资料点除以阶段内资料点总数。

录像示范法与现场示范法干预期间均表现出明显的上升趋势。交替处理 B 阶段,被试 Z 在现场示范与录像示范阶段的平均得分分别为 9.40 和 6.64,表现出较高水平。该阶段内录像示范法干预期间与基线期的数据点重叠率为 0,现场示范法与基线期阶段的数据重叠率为 20%,现场示范法的干预立即效果、干预效果稳定性与录像示范法相比均有一定差距。进入撤回期后被试 Z 的得分表现出明显回落趋势,表明撤回干预方法后,被试的社交沟通行为表现退步,且显示出稳定的回落趋势。出于研究伦理考虑,此处仅撤回三次干预。交替处理 B 阶段,录像示范法与现场示范法同样表现出明显上升趋势,且与基线期的重叠率均为 0,录像示范法与现场示范法干预期间的资料点平均值分别 20.33 和 14.33。但可以看出采用录像示范法干预期间目标行为得分明显高于录像示范法,上升趋势增加更为明显。因此,被试 Z 的最佳处理期采用录像示范法对被试进行干预,该阶段数据点依然表现出明显的上升趋势,平均值为 23,且被试 Z 的趋向稳定性为 100%,说明此阶段被试 Z 目标行为水平得分为明显的增加趋势。值得一提的是在被试 Z 在维持期的数据点未出现明显回落,表现出良好的维持效果。

被试 M 在基线期的社交沟通能力得分平均值为 2.40,得分水平较低,5 个数据点的趋向稳定性为 80%,可以进入干预期。交替处理 B 阶段,被试 M 在现场示范与录像示范阶段的平均值分别为 7.60 和 5.60,与基线期的数据点重叠率分别为 0 和 20%,即两类示范干预均有明显效果,但录像示范法的干预立即效果、干预效果稳定性更佳。在撤回阶段,被试 M 的资料点表现为明显的下降趋势,趋向稳定性为 100%,表明撤回干预介入后,被试的社交沟通行为目标得分下降明显。交替处理 B 阶段,录像示范法与现场示范法均表现出明显上升趋势,资料点平均值分别 11.67 和 9.67,且录像示范法干预期间目标行为整体水平明显高于现场示范法,上升趋势增加更为明显而快速。因此,最佳处理期同样采用录像示范法对被试 M 进行干预,数据点依然表现出明显的上升趋势,平均值高达 20.5,且被试 M 的趋向稳定性为 100%,说明此阶段被试 M 目标行为水平得分为明显的增加趋势。进入维持期后被试 M 仍表现出较高水平的行为表现,说明录像示范法具有良好的维持效果。

被试 Y 社交沟通能力得分平均值为 1.20,三名被试中得分最低,5 个数据点的水平稳定性与趋向稳定性均为 80%,可以进入干预期。交替处理期 B 阶段中,录像示范法与现场示范法的干预资料点都呈现上升趋势,被试 Y 在两种干预方法中表现的社交沟通行为资料点目标行为得分平均值分别为 5 和 3,数据点与基线期重叠率分别为 0 和 40%,表示在此阶段录像

示范法干预效果更为显著。进入撤回期后被试 Y 的资料点表现出明显的回落趋势,下降的趋向稳定性为 100%。交替处理期 B 阶段,录像示范法与现场示范法干预期间目标行为得分平均值为 13 和 8,与基线期的重叠率分别为 0 和 33%,说明录像示范法对被试 Y 的干预效果更好。因此,被试 Y 的最佳处理期也采用录像示范法进行干预,该阶段被试 Y 资料点表现出上升趋势,目标行为得分平均值为 13.25,达到干预阶段平均值中的最高值。维持期被试 Y 的资料点仍表现出较高水平,表明录像示范法对被试 Y 的社交沟通能力具有稳定的维持效果。

5 讨论与建议

5.1 结论与讨论

本研究采用录像示范法和现场示范法对重庆市某融合幼儿园三名学前自闭症儿童进行社交沟通行为的干预研究,研究表明录像示范法与现场示范法均能够提升自闭症儿童社交沟通能力,但录像示范法的干预效果优于现场示范法,且录像示范法对学前自闭症儿童的社交沟通行为具有良好的维持效果。这一研究结果与 Gena 和 Charlop - Christy 等学者的研究结果基本一致^[2-23]。

研究表明录像示范法符合自闭症谱系障碍儿童善用视觉学习的特征^[24],在实际的干预训练中可以移除不相关的刺激,促使干预对象把焦点集中在视频中呈现的有意义的线索或行为目标中^[25]。在本研究中,三名被试在录像示范教学过程中,均表现出比现场示范更高的专注度,因此呈现的教学效果更佳。同时,教师可通过录像以相对固定的方式来呈现和教导行为目标,有助于自闭症儿童行为目标或者技能的模仿、习得与泛化^[26]。此外,录像制作完成后,教师可以将教学任务分配给家长或者其他相关人员,课程教学能以标准化的形式继续进行^[27],从而巩固干预效果。制作好的录像还可以在其他自闭症儿童的教学过程中反复使用,使更多孩子受益^[28]。在完成了本实验数据收集之后,笔者将录像资料赠送给被试家长和班主任,班主任将其用于其他自闭症儿童的教学过程中,也取得了良好的效果。

在本研究中,为了保障研究的可操作程度,虽然采取了游戏情境对自闭症儿童的社交沟通障碍进行干预,但整体干预过程结构化程度较高。有研究指出,高控制环境下对自闭症儿童进行干预时没有考虑其行为发生的自然环境特征,干预过度结构化,容易导致被试习得的目标行为过于依赖实验场景的线索以及干预者的指导,难以维持与泛化^[29]。因此,应进一步探索录像示范法在自闭症领域中的适用情境,如在家庭、机构或者社区等情境中进行干预研究,为自闭症谱系障碍

者提供更完善的环境支持,协助其更好地适应社会。

5.2 研究建议

5.2.1 深入探讨更多录像示范法类型

本研究中仅采用了一种成人示范模式,在未来研究和实践中可以进一步探索不同示范者的干预效果,如自我录像示范与同伴录像示范,这几种方法均为录像示范法中常用的人像录像示范形式(Figure Video Modeling)。国内学者牟晓宇通过自我录像和他人录像两种示范法对自闭症儿童课堂扰乱行为进行干预,发现自我录像示范法效果优于他人录像示范法,这也是目前我国唯一一项有关自闭症儿童自我录像示范法的干预研究^[6]。由于自闭症儿童心理理论的缺陷,在理解和考虑他人想法时存在困难,因此在观察他人良好行为示范时可能受到影响,反而可能对自己的录像示范更感兴趣,该方法对我国自闭症儿童的干预效果有待进一步探索。此外,非人像录像示范(如视点示范)以及动画示范(animated video modeling)也是国际上新兴的录像示范教学类型^[6]。如Mason等学者对十余项视点录像示范的干预性实证研究进行元分析,发现该方法对自闭症儿童的生活技能、社交技能以及游戏技能均有良好的干预效果^[6]。因此,在未来的研究中,我们也可以尝试采用不同的录像示范法,以及多种录像示范法相结合的方式本土化的实践研究。

5.2.2 扩展录像示范法的干预内容

国际研究表明,录像示范法不仅能够改善自闭症儿童的社交沟通行为,还可用于干预自闭症儿童的认知能力、学业能力、适应能力、运动能力、行为、共同注意力、社会能力、游戏、职业技能,等等^[6],其干预效果也得到了肯定。但目前我国有关录像示范法在自闭症领域中的实证研究仅5项,干预内容限于沟通能力^[6]、行为问题^[6]、生活自理技能^[6]和社交技能^[6],针对自闭症儿童的学业能力、情绪管理等内容还有待探索。教师也可在日常教学或常规培养中采用录像示范的方式,对自闭症儿童进行多方面的教学及干预。

5.2.3 合理运用综合化的录像示范干预方式

综合干预是针对传统单一、隔离、割裂的训练方法的不足提出来的,它强调儿童发展的整体性、干预团队的综合性、干预环境的开放性以及儿童的主体性,能促进自闭症儿童整体水平的发展,被证明是一种有效的干预方法^[6]。录像示范法作为一种示范教学模式,符合自闭症儿童视觉学习的特征和喜好,有助于提升教学效果。但是单一的示范教学在实际使用中很难有效改善自闭症的社交沟通问题,因此本研究中以综合干预为理念,以录像示范法为主要的干预方法,并在实验设计中加入强化策略、教师辅助、社交脚本以及游戏情境的设置,对自闭症儿童的社交沟通障碍取得了良好

的干预效果。Mason等学者对14篇有关自闭症儿童观点录像示范法的干预研究进行meta分析发现,所有研究都并非采用了单独的录像示范法进行干预实验,其中10项研究采用了综合化的干预计划(如,角色扮演、纠错程序、强化、辅助等),其余4篇研究也结合了强化物或者口头表扬等干预强化方式^[6]。由此可见,在使用录像示范法进行教育干预时,应依据自闭症儿童的不同特征,选择多种干预方法与之结合,以提高干预效率。

5.2.4 尝试扩展录像示范法在特殊教育领域的干预对象

本研究主要聚焦于学龄前自闭症儿童的社交沟通能力,但国内外大量研究表明,录像示范法对学龄自闭症儿童以及自闭症成人的干预训练同样有效。例如,国内牟晓宇、吴静等学者将其用于学龄期自闭症儿童的问题行为^[6]、社交互动^[6]的干预,国外Mechling、Bereznak等学者将其用于自闭症成人的生活技能的训练^[6],均取得了较好的干预效果。

此外,国际研究中还尝试将录像示范法用于智力障碍、情绪障碍、学习障碍等特殊儿童的行为管理、课堂教学、生活技能等干预训练中。如Graves等学者将录像提示(video prompting)用于中重度智力障碍青少年的生活技能学习中^[6];Hitchcock等学者认为录像示范法的适用对象类型包括特殊学生和高危疑似学习障碍学生^[6];Losinski等学者通过元分析,梳理了12项有关录像示范法干预情绪行为障碍学生问题行为的实证研究,均呈现出较高的干预效应量^[6]。然而,国内还鲜有研究将录像示范法用于自闭症以外的特殊学生的干预训练中。因此,在未来的研究中,国内研究者可以尝试从横向和纵向两方面扩展录像示范法在特殊教育领域的服务范围,即可运用录像示范法对不同障碍类型的特殊学生或不同年龄层的特殊学生进行干预研究或教学实践。

参考文献

- 1 America Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders(5th ed). Washington, DC: American Psychiatric Publishing, 2013. 50-51
- 2 10-20-33 National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders. Evidence-Based Practices for Children, Youth, and Young Adults with Autism Spectrum Disorder. <http://autismpdc.fpg.unc.edu/sites/autismpdc.fpg.unc.edu/files/2014-EBP-Report.pdf>, 2014-1-1/2018-1-1
- 3 9 National Autism Center. National standards Project-Phase2. <http://www.nationalautismcenter.org/national-standards-project>, 2015-1-1/2018-1-1

- 4 Bandura A. Social Learning Theory. New Jersey: Prentice – Hall, 1977. 22
- 5 Egel A L, Richman G S, Koegel R L. Normal peer models and autistic children's learning. Journal of Applied Behavior Analysis, 1981, 14(1) : 3 – 12
- 6 Charlop M H, Schreibman L, Tryon A S. Learning through observation: The effects of peer modeling on acquisition and generalization in autistic child. Journal of Abnormal Child Psychology, 1983 , 11 (3) : 355
- 7 Ergenekon Y, Tekin – Iftar E, Kapan A, et al. Comparison of Video and Live Modeling in Teaching Response Chains to Children with Autism. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 2014, 49(2) : 200 – 213
- 8 11 14 Wilson K P. Teaching Social – Communication Skills to Preschoolers with Autism: Efficacy of Video Versus In Vivo Modeling in the Classroom. Journal of Autism & Developmental Disorders, 2013, 43 (8) : 1819 – 1831
- 12 23 Charlop – Christy M H, Le L, Freeman K A. A comparison of video modeling with in vivo modeling for teaching children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2000, 30(6) : 537 – 555
- 13 22 Gena A, Couloura S, Kymissis E. Modifying the affective behavior of preschoolers with autism using in – vivo or video modeling and reinforcement contingencies. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2005, 35(5) : 545 – 556
- 15 (美) 罗伯特·奥尼尔(Robert O'Neill) . 教育和社区环境中的单一被试设计. 胡晓毅译. 北京: 华夏出版社, 2015. 150
- 16 陈小娟, 张婷. 特殊儿童语言与言语治疗. 南京: 南京师范大学出版社, 2015. 294 – 297
- 17 Ganz J B. Using Visual Script Interventions to Address Communication Skills. Teaching Exceptional Children, 2007, 40 (2) : 54 – 58
- 18 张文京. 弱智儿童个别化教育与教学. 重庆: 重庆出版社, 2005. 80
- 19 Tawney J W, Gast D L. Single subject research in special education. Columbus: Merrill Publishing Company, 1984. 55
- 21 Kratochwill T R, Hitchcock J, Horner R H. Single – case designs technical documentation. [http://ies.ed.gov/ncee/wwc – scd. pdf](http://ies.ed.gov/ncee/wwc-scd.pdf), 2011 – 11 – 1/2 – 18 – 1 – 1
- 24 McCoy K, Hermansen E. Video Modeling for Individuals with Autism: A Review of Model Types and Effects. Education & Treatment of Children, 2007, 30(4) : 183 – 213
- 25 LeBlanc L A, Coates A M, Daneshvar S, et al. Using video modeling and reinforcement to teach perspective – taking skills to children with autism. Journal of Applied Behavior Analysis, 2003, 36(2) : 253 – 257
- 26 38 翁盛, 魏寿洪. 录像示范法在自闭症儿童社交技能训练中的应用. 中国特殊教育, 2015, (9) : 25 – 32 + 57
- 27 Ayres K M, Langone J. Intervention and Instruction with Video for Students with Autism: A review of the Literature. Education and Training in Developmental Disabilities, 2005, 40(2) : 183 – 196
- 28 Hine J F, Wolery M. Using Point – of – View Video Modeling to Teach Play to Preschoolers With Autism. Topics in Early Childhood Special Education, 2006, 26(2) : 83 – 93
- 29 Singh N N, Lancioni G E, Singh A D A, et al. Adolescents with Asperger syndrome can use a mindfulness – based strategy to control their aggressive behavior. Research in Autism Spectrum Disorders, 2010, 5(3) : 1103 – 1109
- 30 35 41 牟晓宇. 录像示范法对自闭症儿童扰乱行为干预研究. 硕士论文. 上海: 华东师范大学特殊教育系, 2012
- 31 王慧婷. 影片示范教育于教导患有自闭症学生的介绍与应用. 特殊教育季刊. 2013, 126: 9 – 16
- 32 40 Mason R A, Davis H S, Boles M B, et al. Efficacy of point – of – view modeling: a meta – analysis. Remedial and Special Education, 2013, 34(6) : 333 – 345
- 34 张锐. 录像示范对自闭症沟通能力的干预研究. 硕士论文. 上海: 上海师范大学, 2010
- 36 康红云. 视频示范教学对自闭症儿童生活自理技能学习成效之研究. 硕士论文. 重庆师范大学, 2013
- 37 42 吴静. 录像示范法应用于自闭症儿童社会互动行为的干预有效性研究. 硕士论文. 上海: 华东师范大学, 2014
- 39 邓猛, 赵梅菊, 高柏兰. 自闭症儿童主动口语沟通行为综合干预的个案研究. 香港特殊教育论坛, 2011, (7) : 11 – 18
- 43 Mechling L C, Collins T S. Comparison of the effects of video models with and without verbal cueing on task completion by young adults with moderate intellectual disability. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 2012, 47(2) : 223 – 235
- 44 Graves T B, Collins B C, Schuster J W, et al. Using Video Prompting to Teach Cooking Skills to Sec-

- ondary Students with Moderate Disabilities. Education and Training in Developmental Disabilities, 2005, 40(1): 34 – 46
- 45 Hitchcock C H, Dowrick P W, Prater M A. Video self – modeling intervention in school – based settings: A review. Remedial and Special Education, 2003, 24(1): 35 – 45 + 56
- 46 Losinski M, Wiseman N, White S A, et al. A Meta – Analysis of Video – Modeling Based Interventions for Reduction of Challenging Behaviors for Students with EBD. The Journal of Special Education, 2016, 49(4): 243 – 252

A Comparative Study of the Effects of Interventions in Autistic Preschoolers' Social Communication Skills by Video Modeling and In-Vivo Modeling

LI Huan¹ GUO Xiaoqian^{1,2} PENG Yan¹

(1. Department of Special Education, School of Education, Southwest University, Chongqing, 400715;

2. School of Education, Xi'an Fanyi University, Xi'an, 710105)

Abstract Social communication disorder is one of the core deficits for children with autism spectrum disorders (ASD). The present study aims to compare the effect of video modeling with that of in-vivo modeling on autistic preschoolers' social communication skills in the context of kindergarten games. Based on a multiple-baseline design across subjects combined with an alternating treatments design plus a return to baseline conditions, the authors assessed the effects of video modeling and in-vivo modeling on 3 autistic preschoolers' social communication skills. The results show that both video modeling and in-vivo modeling could improve the autistic preschoolers' social communication skills, but video modeling demonstrated a better and lasting effect. Based on this, the authors offered suggestions for the future study and practice of video modeling

Key words video modeling in-vivo modeling autism social communication disorder

(责任编辑: 冯雅静)