

FACULTAD DE INGENIERÍA
UACH

naturam subiectit aliis

Materia:
Estadística

Alumnos:

Alumno 1: Ezequiel Adolfo Herrera Hernández

Matrícula: 385717

Alumno 2: Payan Licon Jorge Fernando

Matrícula: 385433

Catedrático: LOPEZ SANTILLAN JESUS ROBERTO

Fecha: 26 de mayo de 2026

Chihuahua, Chih. México

REPORTE EJECUTIVO — ENSAYO CLÍNICO FASE II

La regresión lineal confirma que la dosis impacta directamente la respuesta inmune: cada microgramo adicional aporta **3.33 UI/mL** de anticuerpos ($r = 0{,}764$, $p < 0{,}001$). Para la dosis estándar de **50 µg**, se proyectan **229.8 UI/mL** (IC 95 %: 216.2–243.5). **Se recomienda estandarizar en 50 µg.**

El ANOVA demuestra diferencias significativas entre adyuvantes ($F = 13{,}73$, $p < 0{,}001$): Fórmula A: 204.4 UI/mL Fórmula B: **295.9 UI/mL** Fórmula C: 193.5 UI/mL. **La Fórmula B supera a sus competidoras en más del 45 % y debe ser la elegida para producción masiva.**

Decisión: producción con 50 µg + Fórmula B. Los datos no dejan margen de duda.