



屏基醫療財團法人屏東基督教醫院

腹膜透析個案返家加藥注意事項

編號	ND 內-071
製訂日期	2013.07
一修日期	2022.03

一.加藥的原因：

1.原因：

(1)引流的透析液中有纖維蛋白、血樣透析液，透析液混濁（腹膜炎）時。

(2)糖尿病人從腹腔內給予胰島素治療時。

2.加藥時機：於『沖洗』排氣步驟之後，『注入』新鮮透析液之前，以利作加藥的技術（將病人端輸液管夾夾住）。

二.準備用物：(圖一)

1.透析液一包

2.指定的藥物（如：肝素、胰島素、抗生素）

3.無菌注射針筒空針、針頭數隻

4.中頭棉棒數枝

5.酒精性優碘溶液 1 瓶



(圖一)



(圖二)

三.步驟(圖二、圖三)

1.以酒精棉片清潔桌面

2.準備必須用品，將所有用品放在乾淨桌面

3.戴口罩，洗手

4.消毒藥瓶口步驟：

(a)先將酒精性優碘溶液之瓶口打開。



(圖三)

(b)取中頭棉棒沾濕酒精性優碘溶液。

(c)將沾濕酒精性優碘溶液的中頭棉棒，由內往外順時針方向消毒藥瓶口，包括邊緣並靜待消毒液乾燥(約 2 分鐘)。

(d)以備好的空針抽取藥物，抽取前需檢查及核對藥品名稱及有效期限。(空針針頭抽取藥物後，針頭不回套，立即丟入針頭收集瓶中，未立即丟入針頭收集瓶中；請將針套置於桌面上，單手回套避免針扎)。



(圖四)

5.更換空針上之針頭：

(a)不同的藥物分別由不同的空針抽取。

(b)藥品注入藥袋時必須更換針頭，避免感染。(圖四)

6.消毒透析液加藥口——取中頭棉棒沾濕酒精性優碘溶液後，由內往外順時針方向消毒透析液加藥口，包括邊緣並靜待消毒液乾燥(約 2 分鐘)。

7.將藥品小心地由加藥口注入透析袋內，並注意不要讓任何物品碰到針頭，並小心注意勿戳破透析袋(若有戳破須重新更換一袋)。

8.混合藥品：當藥品注入透析袋後，把透析液袋倒放並用手壓擠加藥口後，上下搖動透析液，使注入的藥物充分均勻混合。(圖五)



(圖五)

9.進行『透析液注入』步驟。

※諮詢電話：08-7368686 轉 5021.5022



屏基關心您 祝您早日康復