



# 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院

## 動脈血管栓塞治療術須知

編號	ND 內-112
製訂日期	2020.10

### 一、治療目的：

1. 可用來控制出血，如肝動脈破裂之出血或子宮頸癌之大出血，血管瘤之大小出血。
2. 可用來改善解除腫瘤所帶來的疼痛及全身症狀。
3. 將栓塞治療藥物直接注入供應腫瘤的肝動脈血管，阻斷腫瘤血液及營養供給而使其壞死的治療方法。
4. 可用來局限癌細胞的範圍，減少擴散。

### 二、治療前準備：

1. 醫師會向您及家屬說明治療目的及過程，確認您是否對顯影劑過敏。
2. 填寫檢查同意書及說明書。
3. 抗凝血製劑 (warfarin) 需於檢查前 5 天停用，長期服用抗血小板製劑者應於檢查前一週停用，或依臨床主治醫師之指示。
4. 檢查前，若從鼠蹊部穿刺，護理師會為您做會陰部皮膚準備，從手部穿刺就不需皮膚準備。
5. 空腹：若有降血壓藥物請當日按時服用，糖尿病藥物則進食後再服用  
※上午治療者—前一天午夜 12 時之後不可吃任何東西，包含水及食物。  
※下午治療者—當天早餐請於上午 7 時前吃完，之後，就不可吃任何東西，包含水及食物。
6. 換檢查服，並將身上金屬飾品包括項鍊、手錶、含鋼絲胸罩等脫掉。
7. 治療前請先上廁所，視需要使用尿套或紙尿褲；護理師會為您打點滴。

### 三、治療過程中要注意些什麼？

1. 治療過程中會注射止痛性麻醉劑、顯影劑等。如果您有藥物過敏、高血壓、心臟病、肝炎、腎臟病或對碘過敏及甲狀腺功能不良、肺機能不全等病史者，請先告知檢查室的醫護人員。
2. 注射顯影劑時，會有輕微的灼熱感，屬於正常反應；如果有極度不適，如噁心、嘔吐、呼吸困難等，請立即告訴醫護人員。
3. 治療過程中需配合醫師、放射師指示吸氣、閉氣以利照像。
4. 治療過程中如有疼痛不適請告訴醫師。

### 三、治療後注意事項：

1. 護理師會密切監測您的血壓等生命徵象。
2. 為避免穿刺部位出血，接受鼠蹊部穿刺檢查後應臥床休息 8 小時，並以砂袋加壓穿刺部位 2 小時，穿刺部位應保持平直，同側腳不可彎曲；進食、飲水、大小便均需有他人協助；若穿刺部位有濕粘或麻木冰冷的感覺時，應立即通知醫護人員。
3. 絕對禁止抬頭動作，因腹部用力會引起傷口出血，穿刺部位的肢體要伸直，避免用力或抬高而導致傷口出血。
4. 穿刺部位在**手部**者應使用止血加壓帶 2 小時後方可鬆開，穿刺的手臂住院期間禁止測量血壓或治療，避免那隻手出力。不需平躺 8 小時，可以下床活動。
5. 傷口紗布處若有滲血情形，請立即告知護理師處理。
6. 治療當天最好以擦澡代替淋浴，傷口不可沾濕。隔日即可移除傷口紗布。
7. 栓塞後，有些人會出現發燒、寒顫、腹痛、噁心、嘔吐、食慾不振等現象，經醫師診視及藥物治療後症狀可緩解，有任何不適情形請立即反應。
8. 除非醫師指示限制飲水，否則應多喝水，幫助顯影劑排出。

屏基關心您      祝您早日康復

