



## 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 經皮腎造口術護理注意事項

編號	ND 內-020
製訂日期	2003.07
六修日期	2019.11

### 壹、什麼是經皮腎造口術？

藉著超音波和 X 光的透視引導下，由後腰經皮膚穿刺，將引流管的一端放入腎臟，主要用於腎盂積水的診斷與治療。

### 貳、目的：

- 一、把發生阻塞的泌尿道改道引流，疏通滯留的尿液，防止腎功能惡化。
- 二、可提供以後手術時，藉著這個造口移除腎臟的結石。
- 三、可經由此造口灌注顯影劑來執行影像學檢查，以瞭解上泌尿道受損或阻塞的情形，及經由造口進行化學藥水灌洗來溶解結石。

### 參、檢查前的準備：

- 一、填寫同意書及說明書。
- 二、檢查前必須先禁食 4-6 小時(包括水和食物)，以免檢查時引起嘔吐不適。

### 肆、檢查的進行：

- 一、檢查前請先排空膀胱，檢查時請採俯臥或側臥姿勢。
- 二、醫護人員會先給您注射止痛劑，以減輕疼痛，再利用超音波掃瞄，在後腰部合適的位置穿刺，放入引流管，並把引流管接上引流袋，檢查進行中如果感到不適，請隨時告知檢查人員。

### 伍、檢查後注意事項：

- 一、術後 6-8 小時，若無不舒服的情形，可以在家屬陪同下採漸進式下床。
- 二、如果沒有嘔吐、不舒服的情形即可開始進食。
- 三、護理人員會觀察您的傷口滲液量、性質及生命徵象。
- 四、在活動或是翻身時，請注意勿拉扯或扭曲到引流管，以防滑脫、阻塞；若引流量突然減少時，可能是引流管阻塞或滑脫，請立即告訴醫護人員。
- 五、下床時，可使用別針或夾子等將引流管固定在衣角，或掛在帶輪架上，請注意不可高過傷口的位置，以免逆流。
- 六、檢查後會有暫時性淡紅色血尿，會逐漸回復正常，若有量多鮮紅色血尿，請告知醫護人員。
- 七、若無禁忌請大量喝水，每天至少 2500cc 以促進排尿，預防泌尿道感染。
- 八、保持傷口清潔、乾燥，以避免感染，洗澡後或傷口滲濕告知護理人員立即換藥。

※諮詢電話：08-7368686 轉\_\_\_\_\_



屏基關心您 祝您早日康復