

小兒構音異常

構音異常就是一般常說的「臭乳呆」，在說話時會口齒不清，或發音不正確。

構音異常的原因

造成構音異常的原因有很多，常見如下：

1. 身體器官因素：唇顎裂、嘴唇、舌頭和牙齒等構造有缺陷
2. 發展因素：發展遲緩而影響構音器官，及語言表達
3. 其他因素：聽力障礙、環境因素(錯誤學習)、心理因素

構音異常類型

省略音：省略掉應該發的音，例如：「飛機」說成「ㄟ一」。

替代音：用另一語音替代標準音，例如：「貴」說成「對」。

贅加音：加入不該存在的語音，例如：「要」說成「料」。

扭曲音：與原本語音差異大，無法歸類。

兒童構音發展

- 3 歲：
精熟 韻母一、ㄨ、ㄣ、ㄚ、ㄛ、ㄜ、ㄝ
聲母：ㄅ、ㄆ、ㄇ、ㄈ、ㄌ、ㄋ、ㄍ、ㄎ、ㄗ、ㄘ、ㄙ
- 4-5 歲：精熟ㄟ、ㄨ、ㄣ、ㄚ、ㄛ、ㄜ、ㄝ、ㄞ、ㄟ、ㄠ、ㄡ
- 6 歲後：精熟ㄟ、ㄨ、ㄣ、ㄚ、ㄛ、ㄜ、ㄝ、ㄞ、ㄟ、ㄠ、ㄡ

四歲前的孩童，語音還在發展階段，一般來說，兩三歲的孩子說話不清楚是正常的，家長不必過度擔心，若三歲半之後仍很不清楚，則建議帶到醫院做評估。在評估前可以陪伴作口腔運動遊戲，如：吹泡泡、舔果醬、嘸嘴巴等，並在兒童發音錯誤時示範正確的音，但建議多鼓勵並不要過度糾正，避免孩子因此不敢開口。