

民眾常問的藥物問題QA

文／藥師 陳慧娟

藥物諮詢服務常會遇到家有幼童的媽媽或奶奶詢問藥粉可否與藥水併用、藥袋中有不同的退燒藥粉、糖漿及栓劑要怎麼用；或偶有醫生在開立藥物給孕婦服用時，會詢問藥師確定藥物對胎兒的安全性；老年人多為慢性病用藥患者，習慣性領完藥後會直接到諮詢室請藥師在藥袋上重新書寫放大字體的藥名及用法用量、心細的老人家會再詢問可否與其他醫院或醫生的藥物併用；流感流行期呢，詢問流感吸入劑使用方法，這時身為醫療人員為防止傳染擴大會同時衛教如何預防傳染給家人的衛生常識。

面對此種常見的用藥諮詢問題，彙整回覆9種用藥指導問題，提供民眾用藥基本常識。

問1 藥粉混和藥水或藥水混合藥水服用？

答1 如欲方便服用，請於服用前混合，但不要太早預先混合。

混合後的缺點，多種藥水混合後，易有味道不佳，影響孩童服用的意願甚至沒喝完因劑量不足而使療效降低；藥粉混合藥水，不易溶解，而有藥粉殘留。

問2 請問我11:15分剛吃退燒藥粉，可以11:30再喝退燒藥水嗎？

答2 兩種退燒藥不可同時或時間相近服用，可能有副作用發生。

建議用物理方式先幫助排汗(溫水擦身體、補充液體、衣服勿穿太多或太厚)，因藥粉吃下需經過一段時間(慢的話約2~3小時)才会有藥效，若持續高燒不退，再服用退燒藥水。

問3 請問飯前及飯後的藥物如何服用？

答3 正確服用時間是吃飯前及飯後半小時

問4 醫生診斷是B型流感，但開立Tamiflu藥袋上寫的是A型流感，有沒有開錯？

答4 Tamiflu可以同時用於治療、預防A型及B型流感的口服藥物問

問5 請問smectapowder的止瀉藥物如何服用？

答5 每袋內藥品可與50ml水混勻或與半流質如：肉湯、果汁、菜泥、嬰兒食品混勻後服用

問6 詢問用於口腔的藥膏該如何使用？

答6 口腔內發炎、粘膜破損部位，先擦乾再塗藥膏，否則藥物易脫落

問7 諾快寧(Augmentin)口服懸液用粉劑泡製及保存

答7 首先冷開水加到環之下方，然後搖晃均勻，配製完成的懸浮液應為60毫升。每次服用前應再次搖晃瓶身。配製的溶液應冷藏(2-8℃)，保存期限為7天。

問8 Persantin是否有保護腎臟作用？

答8 目前機轉不是很清楚，臨床上用於初期腎病的微蛋白尿，具有抗發炎及抗氧化的作用，改善蛋白尿。

問9 請問骨力強(Aclasta)多久施打一次？

答9 骨力強(Aclasta)經由一年一次的靜脈注射治療骨質疏鬆，輸注時間不可少於15分，建議使用前補充至少兩杯的水。因不經腸胃道，無吸收上的限制，但由於經腎臟代謝，故嚴重腎功能不良不建議使用、有口腔疾病或近期將進行牙科手術者需由醫師評估使用。

