



屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 小兒包皮手術後注意事項

編號	ND 兒-021
製訂日期	2010.06
二修日期	2019.06

一、進食時間

1. 確認病人清醒後，可先讓病人喝半杯開水，如無嘔吐、咳嗽、噎水等反應，即可如平常般進食。
2. 喝半杯開水時，如有嘔吐、咳嗽、噎水等反應，需再等一小時後再嘗試喝開水，直到無上述不適反應發生，才可進食。

二、藥物使用

1. 病人傷口疼痛，哭鬧不安時，可依醫師處方服用止痛藥物。

三、傷口照顧

1. 全身麻醉手術後，當天兒童體力並未完全恢復，勿讓兒童獨自活動。
2. 返家後，傷口有持續出血，發高燒($\geq 38.5^{\circ}\text{C}$)、膿狀分泌物，患部紅腫厲害等情況，須立即回急診處理，若輕微發燒($< 38.5^{\circ}\text{C}$)傷口無任何異常狀況，只要多喝開水及依醫囑服用退燒藥即可。
3. 手術後傷口會貼上透氣膠膜，以擦澡方式清潔身體，一週以後才可照常淋浴，平時需保持乾燥。
4. 傷口處按醫師指示塗抹藥膏，於門診檢查時，醫師會將膠膜撕除。

四、注意事項

1. 術後陰莖會腫脹，此為一般手術反應，不必驚慌，一星期後可逐漸恢復正常。
2. 術後活動不必限制，但宜著寬鬆之褲衫，以免傷口過度摩擦。
3. 手術後2週最好多休息，不要玩需要跨坐的玩具(木馬、腳踏車、翹翹板等)，兒童可以上學但最好2週內不要上體育課並避免執行跳馬、跨欄等動作。

※諮詢電話：08-7368686 轉

屏基關心您 祝您早日康復

