



屏基醫療財團法人屏東基督教醫院
肝臟腫瘤無線射頻熱消融術(RFA)
檢查治療須知

編號	ND 內-111
製訂日期	2020.10

一、治療目的:在電腦斷層或超音波導引下，將治療探針穿過皮膚，插入腫瘤組織中，然後接上電源，當交流電經過組織時，會造成組織中的分子沿著電流的方向相互磨擦，因而產生熱，這些熱再經由傳導作用於腫瘤細胞，讓腫瘤組織因熱凝固而失去活性，進而達到腫瘤組織凋亡的治療目的。

二、治療前準備:

1. 醫師會向您及家屬說明治療目的及過程。
2. 填寫「肝腫瘤無線射頻熱消融術說明書與同意書」、及「無線射頻熱消融治療針」同意書。
3. 照會麻醉科執行「自費神經阻斷術」，減少檢查過程中疼痛感。
4. 抽血檢驗凝血功能及確認血小板值。
5. 抗凝血製劑 (warfarin)需於檢查前 5 天停用，長期服用抗血小板製劑者應於檢查前一週停用，或依臨床主治醫師之指示。
6. 空腹：若有降血壓藥物請當日按時服用，糖尿病藥物則進食後再服用
※上午治療者—前一天午夜 12 時之後不可吃任何東西，包含水及食物。
※下午治療者—當天早餐請於上午 7 時前吃完，之後，就不可吃任何東西，包含水及食物。
7. 換檢查服，並將身上金屬飾品包括項鍊、手錶、含鋼絲胸罩等脫掉。
8. 治療前請先上廁所，視需要使用尿套或紙尿褲；護理師會為您打點滴。

三、治療後注意事項:

1. 護理師會密切監測您的血壓等生命徵象；若發生嚴重頭暈、心跳加快、腹痛、呼吸急促或其它不適之症狀時，請立即告知護理人員。
2. 會以枕頭或砂袋加壓傷口，請遵從醫囑以躺臥姿勢壓迫穿刺傷口處2小時，之後改為平躺6小時，需要絕對臥床休息，以減少腹內出血的危險性。
3. 臥床期間，若想解尿或解便，請您在床上使用尿壺、便盆，切勿下床，以免腹內出血。

4. 一星期內避免劇烈運動。
5. 檢查結束若無其他限制即可吃東西。
6. 護理師會觀察您的傷口狀況，並於24小時之後，會協助您傷口換藥。

四、出院後注意事項

1. 保持傷口乾燥。
2. 若傷口周圍出現疼痛、紅腫、灼熱感或體溫上升，表示有可能發炎，應立即就醫。
3. 生活作息規律，充足的睡眠與休息並有適度的活動，避免過度勞累。
4. 適當的飲食，三餐定時定量，勿暴飲暴食或食用太油膩的食物(如肥肉、油炸食物)。
5. 依照醫師指示按時服藥並定期回門診複診。
6. 如腹部疼痛厲害或持續發燒、發冷，須立即就診。

屏基關心您 祝您早日康復

