



編號	ND 內-56
製訂日期	2009.06
三修日期	2018.03

一、為什麼要裝「人工血管」？

需要執行化學治療時，肢體上的血管除了可能會變硬，若不慎也可能會造成化學藥物的外滲或外漏，使局部血管以及週邊組織壞死。而「人工血管」則可大幅的降低化學治療時外滲或外漏的危險性。

二、「人工血管」如何使用？

(一) 住院期間

醫護人員會使用特製的角針，插入「人工血管」中間鼓起的軟橡皮，這時就像打針一樣會感到些許的刺痛。等到角針打入後，再以生理食鹽水或抗凝劑沖洗人工血管，來確保管路的暢通。之後每5天護理人員就會消毒注射部位，並更換透明敷料，每7天重新更換一次角針。請避免弄溼敷料(如圖一)。



圖一 人工血管置入處通常位於左前胸或右前胸

(二) 出院後與完成治療後

為避免人工血管有阻塞、凝血的情形發生，故必須每個月回門診掛號沖洗人工血管。

三、「人工血管」日常注意事項

1. 人工血管手術後，傷口約4-5 公分，術後三天以紗布覆蓋每日換藥，依醫師指示傷口是否拆線。
2. **出院返家**傷口未癒合時，每天使用沒有刺激性的優碘藥水消毒並用無菌紗布覆蓋傷口，並暫時避免弄溼傷口。
3. 注意傷口有無紅、腫、熱、痛或分泌物及體溫的變化等情形，若有以上情形則表示可能有感染的現象，此時應立即回到醫院給醫師視診。
4. 裝置「人工血管」的手臂勿過度的活動，如：避免360 度的旋轉手臂與擴胸動作或提過重的物品避免人工血管移位，除此以外，一般的日常活動並不受影響。

※ 諮詢電話：08-7368686 轉 5730

屏基關心您 祝您早日康復

