

# 离散数学

## 第九章: 二部图, 欧拉图, 哈密顿图

卢杨

厦门大学信息学院计算机科学系


[luyang@xmu.edu.cn](mailto:luyang@xmu.edu.cn)



## 9.1 二部图


# 任务分配问题

- 今有5个王者玩家:  $a, b, c, d, e$ ; 5个游戏角色位置: 上单, 打野, 中单, 射手, 辅助.
  - 玩家 $a$ 是大神, 啥都会;
  - 玩家 $b$ 只会打野和中单;
  - 玩家 $c$ 只会上单和中单;
  - 玩家 $d$ 只会中单和射手;
  - 玩家 $e$ 是妹子, 只会辅助.
- 问如何分配玩家, 才能使每人都用自己擅长的位置, 且每个位置都有人玩?
- 只要以 $V = \{a, b, c, d, e, \text{上单}, \text{打野}, \text{中单}, \text{射手}, \text{辅助}\}$ 为顶点集, 若某人会玩某位置, 就在某人与某位置之间连边, 得边集 $E$ , 构成无向图 $G = \langle V, E \rangle$ .



# 任务分配问题

- 由图显而易见
  - 让妹子 $e$ 去玩辅助;
  - $b, c, d$ 分别玩打野, 中单, 射手;
  - 大神 $a$ 挑剩下的, 玩上单.
- 在此图中, 玩家之间彼此不相邻, 角色位置之间也彼此不相邻.
- 像这样的图, 称它为二部图. 下面给出它的严格定义. 在本节我们只讨论无向图.




# 二部图

## 定义 9.1


若能将无向图  $G = \langle V, E \rangle$  的顶点集划分成两个不相交的子集  $V_1$  和  $V_2$  ( $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ ), 使得  $G$  中任何一条边的两个端点都一个属于  $V_1$ , 另一个属于  $V_2$ , 则称  $G$  为**二部图**, 记为  $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$ ,  $V_1, V_2$  称为**互补顶点子集**.

又若  $V_1$  中任一顶点与  $V_2$  中任一顶点均有且仅有一条边相关联, 则称  $G$  为**完全二部图**. 若  $|V_1| = r, |V_2| = s$ , 则记完全二部图为  $K_{r,s}$ .

- 完全二部图的顶点数为  $n = r + s$ , 边数为  $m = rs$ .
- 零图是二部图.



$K_{2,3}$



$K_{3,3}$



# 二部图

## 定理 9.1

一个无向图  $G = \langle V, E \rangle$  是二部图当且仅当  $G$  中无奇数长度的回路。

### 证明 必要性

- 若  $G$  中无回路, 自然也没有奇数长度的回路, 结论显然成立.
- 若  $G$  中有回路, 设  $C = v_1 v_2 \dots v_{l-1} v_l v_1$  为  $G$  中任意一个回路, 不妨设  $v_1 \in V_1$ , 与  $v_1$  相邻的顶点  $v_2$  和  $v_l$  都属于  $V_2$ , 与  $v_2$  相邻的顶点  $v_1$  和  $v_3$  都属于  $V_1$ , 以此类推:

$v_3, v_5, \dots, v_{l-1}$  均属于  $V_1$ ,

$v_2, v_4, \dots, v_l$  均属于  $V_2$ .

于是  $l$  为偶数, 且回路  $C$  中的顶点数  $l$  等于其长度, 因而  $C$  是长度为偶数的回路.

- 由于  $C$  的任意性, 所以结论成立.



# 二部图

## 证明 充分性

- 若 $G$ 是零图, 结论显然成立. 不妨设 $G$ 是连通图, 否则可对它的每个连通分支进行讨论.
- 要证明 $G$ 是二部图, 需要在 $G$ 中找到两个互补顶点子集.

- 设 $v_0$ 为 $G$ 中任意一个顶点, 令 $V_1$ 与 $V_2$ 为与 $v_0$ 的距离是偶数和奇数的顶点集合:

$$V_1 = \{v \mid v \in V(G) \wedge d(v_0, v) \text{ 为偶数} \},$$

$$V_2 = \{v \mid v \in V(G) \wedge d(v_0, v) \text{ 为奇数} \},$$

易知 $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ 且 $V_1 \cup V_2 = V(G)$ .







- 然后证明 $G$ 中的任何一条边的两个端点一个属于 $V_1$ , 一个属于 $V_2$ , 即 $V_1$ 中任二顶点不相邻,  $V_2$ 中的任二顶点也不相邻.
- 假设存在 $v_i, v_j \in V_1$  ( $V_2$ 同理可证), 且 $v_i$ 与 $v_j$ 相邻, 则有边 $e = (v_i, v_j) \in E$ .
- 设 $v_0$ 到 $v_i$ 和 $v_j$ 的短程线分别为 $\Gamma_1$ 和 $\Gamma_2$ , 则 $\Gamma_1$ 和 $\Gamma_2$ 的长度均为偶数.
- 于是 $\Gamma_1 \cup e \cup \Gamma_2$ 是 $G$ 中长度为奇数的回路, 这与已知矛盾, 所以 $V_1$ 中任二顶点不相邻,  $V_2$ 中的任二顶点也不相邻,  $G$ 是二部图.



# 二部图

例 在以下图中, 哪些是二部图?


解 (1)和(6)不是二部图, 因为它们中均含有奇数长的回路. 其余的都是二部图.





# 二部图

- 在画图时,通常将 $V_1$ 放在图的上方, $V_2$ 放在图的下方:



# 匹配

- 在二部图中, 均可将 $V_1$ 和 $V_2$ 看成性质不同事物的集合.
- 比如 $V_1$ 看成员工的集合,  $V_2$ 看成是任务的集合.
- $V_1$ 中顶点 $v_i$ 与 $V_2$ 中顶点 $u_j$ 相邻当且仅当 $v_i$ 能承担任务 $u_j$ .
- 从二部图上容易看出满足某种要求的任务的分配方案, 这就是二部图的匹配问题.

## 定义 9.2

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ ,  $M \subseteq E$ , 若 $M$ 中的任意两条边均不相邻, 则称 $M$ 为 $G$ 中的一个**匹配**. 若在 $M$ 中再加进任意一条边后不再是匹配, 则称 $M$ 为 $G$ 中的**极大匹配**. 称 $G$ 中边数最多的匹配为**最大匹配**, 其边数称为**边独立数**或**匹配数**, 记作 $\beta_1(G)$ , 或简记为 $\beta_1$ .

设 $M$ 为 $G$ 中的一个匹配, 与 $M$ 中的边关联的顶点称为 $M$ 的**饱和点**, 否则称为 $M$ 的**非饱和点**. 若 $G$ 中所有顶点都是 $M$ 的饱和点, 则称 $M$ 为 $G$ 中的**完美匹配**.




# 匹配

例 该图中 $E_1 = \{e_3, e_5\}$ ,  $E_2 = \{e_1, e_3, e_6\}$ ,  $E_3 = \{e_2, e_4\}$ 均为 $G$ 中的匹配.

其中 $E_1, E_2$ 都是极大匹配,  $E_2$ 又是最大匹配, 同时也是完美匹配, 其匹配数 $\beta_1 = 3$ .

而 $E_3$ 不是极大匹配, 更不是最大匹配.

- 最大匹配必是极大匹配, 但是反之不然.
- 完美匹配必是最大匹配, 但是反之不然.




# 完备匹配

## 定义 9.3


设  $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$  为二部图, 且  $|V_1| \leq |V_2|$ ,  $M$  为  $G$  中的一个匹配, 若  $|M| = |V_1|$ , 则称  $M$  为  $G$  中的**完备匹配**.

■ 当  $|V_1| = |V_2|$  时,  $G$  中的完备匹配是完美匹配.


**例** (1)中无完备匹配, (2)与(3)中都存在完备匹配, 而且(3)中的完备匹配也是完美匹配.



(1)



(2)



(3)



# 完备匹配


- 英国数学家Hall给出了二部图中存在完备匹配的充要条件, 这就是著名的Hall定理, 也称为Hall婚姻定理.

## 定理 9.2 (Hall定理)


设二部图  $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$  中  $|V_1| \leq |V_2|$ ,  $G$  中存在完备匹配当且仅当  $V_1$  中任意  $k$  个顶点至少与  $V_2$  中的  $k$  个顶点相邻.  $k = 1, 2, \dots, |V_1|$ .

- 其中的条件称为相异性条件.


例 (1) 中存在两个顶点只与  $V_2$  中的一个顶点相邻, 因而不存在完备匹配. 而(2), (3) 都满足相异性条件.



(1)



(2)



(3)



# 完备匹配

**例 9.1** 某中学有3个课外活动小组: 数学组, 计算机组和生物组. 今有赵, 钱, 孙, 李, 周5名学生. 已知:

- (1) 赵, 钱为数学组成员, 赵, 孙, 李为计算机组成员, 孙, 李, 周为生物组成员;
  - (2) 赵为数学组成员, 钱, 孙, 李为计算机组成员, 钱, 孙, 李, 周为生物组成员;
  - (3) 赵为数学组和计算机组成员, 钱, 孙, 李, 周为生物组成员.
- 问在以上3种情况下, 能否分别选出3名不兼职的组长?




# 完备匹配

**解** 用 $v_1, v_2, v_3$ 分别表示数学组, 计算机组和生物组. 用 $u_1, u_2, u_3, u_4, u_5$ 分别表示赵, 钱, 孙, 李, 周. 若 $u_i$ 是 $v_j$ 成员, 就在 $u_i$ 与 $v_j$ 之间连边. 每种情况都对应一个二部图. 每种情况下能否选出不兼职组长, 就看它们所对应的二部图中是否存在完备匹配.


(1) 满足相异性条件, 因而选出3位不兼职的组长, 而且有多种方案.

(2) 也满足相异性条件, 因而也能选出3位不兼职的组长, 且也有不同的方案, 不过数学组组长必由赵担任.


(3) 就不同, 它不满足相异性条件, 不存在完备匹配.



(1)



(2)



(3)



# 课堂练习

7名计算机系毕业生 $A, B, C, D, E, F, G$ 在寻找工作准备当码农迎接996福报, 某大厂公开招聘岗位有前端 $a$ , 运维 $c$ , 算法 $e$ , 后台 $p$ , 产品 $r$ , 设计 $s$ 和架构 $t$ , 每个学生申请的岗位如下:

$A: c, e;$        $B: a, c, p, s, t;$        $C: c, r;$        $D: c, e, r;$

$E: a, e, p, s;$        $F: e, r;$        $G: p, r, s, t.$

如果每个岗位只招一个人, 每个学生是否都能得到其所申请的岗位?






# 课堂练习

**解** 建立二部图模型 $G$ , 其中部集 $V_1 = \{A, B, C, D, E, F, G\}$ 为学生集合, 另一部集 $V_2 = \{a, c, e, p, r, s, t\}$ 为岗位集合, 若 $u$ 申请了岗位 $w$ , 则顶点 $u$ 邻接于顶点 $w$ .

答案是不可能. 由于 $A, C, D, F$ 仅仅申请了 $c, e, r$ 这3个岗位集合的子集, 不满足相异性条件.






## 9.2 欧拉图


# 哥尼斯堡七桥问题

- **哥尼斯堡城七桥问题**: 哥尼斯堡城中有一条横贯全市的普雷格尔河, 河中有两个岛屿, 两岸与岛屿由七座桥连接. 一个散步者怎样能不重复地走完七座桥?
- 欧拉把四块陆地设想为四个顶点, 分别用 $A, B, C, D$ 表示, 而将桥画成相应的边. 于是问题转化为该图中是否存在经过每条边一次且仅一次的回路.
- 欧拉经过研究, 终于找到解决这类问题的一个简便原则, 可以鉴别一个图 (包括多重图) 能否一笔画, 并对七桥问题给出了否定的结论.



# 哥尼斯堡七桥问题

- 七桥问题的发源地当时 (1736年) 是东普鲁士哥尼斯堡, 如今是俄罗斯加里宁格勒州.
- 非常遗憾, 在二战期间两座桥被炸毁. 如今只剩下五座桥.



# 欧拉图

## 定义 9.4

设 $G = \langle V, E \rangle$ 是连通图 (无向图和有向图),

- (1)  $G$ 中经过每条边一次并且仅一次的通路称为欧拉通路.
- (2)  $G$ 中经过每条边一次并且仅一次的回路称为欧拉回路.
- (3) 具有欧拉回路的图称为欧拉图.

平凡图为欧拉图.

- 只有欧拉通路没有欧拉回路的图不是欧拉图.
- 定义包含多重图在内, 即欧拉回路中允许平行边出现.
- 欧拉通路是经过所有边的简单通路, 欧拉回路是经过所有边的简单回路.
  - 简单通路和简单回路意味着可以经过相同的顶点.











# 欧拉图

例 以下哪些图有欧拉通路或者欧拉图呢？

- (1)和(4)既无欧拉图, 也无欧拉通路.
- (2)和(5)只有欧拉通路, 没有欧拉回路.
- (3)和(6)均存在欧拉回路, 所以只有它们才是欧拉图.



# 欧拉图

## 定理9.3

设 $G$ 为无向图,

- (1)  $G$ 是欧拉图当且仅当 $G$ 是连通的且不存在度数为奇数的顶点.
- (2)  $G$ 有欧拉通路, 但无欧拉回路, 当且仅当 $G$ 是连通的且恰好有两个顶点的度数是奇数.


- 定理的必要性是显然的.
  - 当 $L$ 是 $G$ 的一条欧拉回路时,  $L$ 每次经过一个顶点时都是一进一出, 顶点获得2度. 并且所有的顶点和边都在回路上, 因此所有顶点的度数都是2的倍数即偶数.
  - 当 $L$ 是 $G$ 的一条欧拉通路 (非欧拉回路) 时, 同理 $L$ 上除两个端点外的顶点的度数都是偶数, 而只有两个端点的度数是奇数.
- 现在再来看哥尼斯堡七桥问题, 4个顶点的度数都是奇数, 即不存在欧拉通路, 更不存在欧拉回路.




# 欧拉图

例 通过定理9.3来判断以下哪些图有欧拉通路和欧拉回路？


- (4)和(5)各有两个顶点的度数是奇数, 因而它们有欧拉通路, 无欧拉回路.
- (1)和(6)中度数为奇数的顶点个数都超过了2, 因此不存在欧拉通路和欧拉回路.
- (2)和(3)中所有顶点的度数都是偶数, 因此它们是欧拉图.




(1)




(2)




(3)



(4)



(5)



(6)





# 欧拉图

## 定理 9.4

设 $D$ 为有向图,

- (1)  $D$ 是欧拉图当且仅当 $D$ 是连通的且所有顶点的入度等于出度.
- (2)  $D$ 有欧拉通路, 但无欧拉回路, 当且仅当 $D$ 是连通的且一个顶点的入度比出度大1, 另一个顶点的入度比出度小1, 其余顶点的入度均等于出度.


定理的必要性与无向图类似, 是显然的.



# 欧拉图

例 通过定理9.4来判断以下哪些图有欧拉通路和欧拉回路?



- (1)中每个顶点的出度等于入度, 因此是欧拉图.
- (2)和(3)有一个出度2入度0的顶点, 因此它们都不存在欧拉通路.
- (4)中存在一个出度2入度1的顶点, 和一个入度3出度2的顶点; (6)中存在一个出度2入度1的顶点, 和一个入度2出度1的顶点. (4)和(6)的其他顶点出度和入度都相等, 因此它们存在欧拉通路.
- (5)不是连通图.



## 9.3 哈密顿图

# 周游世界问题

- 1859年爱尔兰数学家哈密顿设计了一个在正十二面体上的游戏: 周游世界问题.
- 他将20个顶点看作20个城市, 每一条棱看作一条公路, 要求从一个城市出发, 沿着公路经过每一个城市一次且仅一次, 最后回到出发的城市.
- 可以把正十二面体的一个面撕开, 平摊到平面上成为一个图, 问题就变成在该图中找一条经过每一个顶点恰好一次的回路, 这样的回路现在称作**哈密顿回路**.



# 哈密顿图

## 定义 9.5

设  $G = \langle V, E \rangle$  是连通图 (无向图和有向图),

- (1)  $G$  中经过每个顶点一次并且仅一次的通路称为哈密顿通路.
- (2)  $G$  中经过每个顶点一次并且仅一次的回路称为哈密顿回路.
- (3) 具有哈密顿回路的图称为哈密顿图.


- 欧拉回路和哈密顿回路的区别在于:
  - 欧拉回路经过所有的边一次, 哈密顿回路经过所有的顶点一次.
  - 欧拉回路是简单回路, 哈密顿回路是初级回路.
- 欧拉图和哈密顿图之间几乎没有什么联系, 有的图只是欧拉图, 有的图只是哈密顿图, 有的图既是欧拉图又是哈密顿图, 有的图则两者皆不是.




# 哈密顿图

例 以下哪些图有哈密顿通路和哈密顿回路？


- 只有(1)没有哈密顿回路，它只有哈密顿通路。
- 其余的图均有哈密顿回路。




(1)




(2)




(3)



(4)



(5)




(6)



# 哈密顿图

例 以下哪些图有哈密顿通路和哈密顿回路？

- 除了(5)以外, 都有哈密顿通路.
- (2), (3)和(6)只有哈密顿通路, 没有哈密顿回路.
- (1)和(4)有哈密顿回路, 它们是哈密顿图.



# 哈密顿图

- 虽然欧拉回路和哈密顿回路都是遍历图，定义看起来相似，但两者判定的**困难程度却天差地别**。
- 欧拉图已“彻底和漂亮”地解决了（给出了判定的充要条件）。到目前为止，还**没有找到**一个**简明可行的条件**作为一个图是否为哈密顿图的简单充要条件。确定图有哈密顿回路是非常困难的。
- 判断一个图是否是哈密顿图是一个NP完全问题。它是可解的，我们可以通过回溯算法来解决该问题。
- 目前，只能找到一些判断存在性的充分条件和必要条件。





# 哈密顿图

## 定理 9.5 (哈密顿图的必要条件)

设无向图  $G = \langle V, E \rangle$  是哈密顿图,  $V_1$  是  $V$  的任意非空真子集, 则

$$p(G - V_1) \leq |V_1|.$$

**证明** 因为  $G$  是哈密顿图, 所以  $G$  中存在哈密顿回路.

设  $C$  为  $G$  中任意一条哈密顿回路, 当  $V_1$  中顶点在  $C$  中均不相邻时,  $p(C - V_1) = |V_1|$  最大. 其余情况下均有  $p(C - V_1) < |V_1|$ , 所以有

$$p(C - V_1) \leq |V_1|.$$

而  $C - V_1$  是  $G - V_1$  的子图, 因此  $G - V_1$  的连通分支数不会超过  $C - V_1$  的连通分支数, 故

$$p(G - V_1) \leq p(C - V_1) \leq |V_1|.$$

该定理给出的条件是**必要的**. 因此对一个图来说, 如果不满足这个必要条件, 它一定不是哈密顿图. 但是满足这个条件的图不一定是哈密顿图.



# 哈密顿图

## 推论

有割点的图一定不是哈密顿图.

**证明** 当 $V_1 = \{v\}$ 为割点时,  $p(G - \{v\}) > |\{v\}| = 1$ , 与定理9.5的必要性矛盾.

## 推论

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 有哈密顿通路,  $V_1$ 是 $V$ 的任意非空真子集, 则

$$p(G - V_1) \leq |V_1| + 1.$$

**证明** 设 $P$ 是 $G$ 的一条哈密顿通路, 两个端点为 $u$ 和 $v$ . 在 $u$ 和 $v$ 之间加一条边 $e = (u, v)$ , 所得到的图记作 $G'$ , 显然 $G'$ 是哈密顿图.

由定理9.5可得


$$p(G - V_1) = p(G' - V_1 - e) \leq p(G' - V_1) + 1 \leq |V_1| + 1.$$




# 哈密顿图

例 以下哪些图有哈密顿通路和哈密顿回路？


- (1)中存在割点, 必然不是哈密顿图, 将两个割点的集合删去后, 得到4个连通分支, 所以也不存在哈密顿通路.
- (2)中删除这5个顶点的集合后得到6个连通分支, 所以也不是哈密顿图, 但是存在哈密顿通路.
- (3)中删除这3个顶点的集合后得到4个连通分支, 所以也不是哈密顿图, 但是存在哈密顿通路.



(1)



(2)



(3)



# 哈密顿图

## 定理 9.6 (哈密顿图的充分条件)

设 $G$ 是 $n(n \geq 3)$ 阶无向简单图, 若对于 $G$ 中任意不相邻的顶点 $u, v$ , 均有

$$d(u) + d(v) \geq n - 1,$$

则 $G$ 中存在哈密顿通路. 若

$$d(u) + d(v) \geq n,$$

则 $G$ 为哈密顿图.

**推论** 设 $G$ 是 $n(n \geq 3)$ 阶无向简单图,  $\delta(D) \geq n/2$ , 则 $G$ 为哈密顿图.


- 由推论可知, 对于完全图 $K_n$ , 当 $n \geq 3$ 时为哈密顿图; 完全二部图 $K_{r,s}$ , 当 $r = s \geq 2$ 时为哈密顿图.




# 哈密顿图

## 例

- (1) 满足定理9.5中的必要性条件“ $V_1$ 是 $V$ 的任意非空真子集, 则 $p(G - V_1) \leq |V_1|$ ”, 但不是哈密顿图.
- (2) 是哈密顿图, 但是不满足定理9.6的推论1中的充分性条件“对于 $G$ 中任意不相邻的顶点 $u, v$ , 均有 $d(u) + d(v) \geq n$ ”.



(1)



(2)




# 小结

- 判断二部图: 是否有奇数长度回路.
- 判断二部图的完备匹配: 是否满足相异性条件.
- 判断欧拉图: 判断是否存在度数为奇数的顶点.
- 判断哈密顿图:
  - 必要条件: 若 $p(G - V_1) > |V_1|$ , 一定不是;
  - 充分条件: 若 $d(u) + d(v) \geq n$ , 一定是.




# 课堂练习


以下哪些图是二部图, 欧拉图, 哈密顿图?



(1)



(2)




(3)




# 课堂练习

以下哪些图是二部图, 欧拉图, 哈密顿图?


- (1)(3)中存在奇数长度的回路, 因此不是二部图. (2)是二部图.
- (1)(3)连通且无顶点的度数是奇数, 因此都是欧拉图. (2)存在度数是奇数的顶点, 因此不是欧拉图.
- (2)(3)中都可以找到哈密顿回路, 因此他们是哈密顿图. (1)中存在删除2个顶点得到3个连通分支, 因此不是哈密顿图.



(1)



(2)



(3)





# 作业

本章作业和下章一起做



# 谢谢

## 有问题欢迎随时跟我讨论



**厦门大学信息学院**  
SCHOOL OF INFORMATICS XIAMEN UNIVERSITY



**厦门大学 计算机科学系**  
Computer Science Department of Xiamen University