

CYPROVITA

Syrup



Composition:

Each 5 ml CYPROVITA Syrup contains:

Cyproheptadine Hydrochloride	2.00 mg
Thiamine hydrochloride (Vitamin B1)	0.60 mg
Riboflavin (Vitamin B2)	0.75 mg
Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6)	0.60 mg
Nicotinamide (Vitamin B3)	5.00 mg
Ascorbic Acid (Vitamin C)	20.00 mg

Pharmacological Properties & Mechanism of Action:

Cyproheptadine Hydrochloride: is a serotonin and histamine antagonist, and has anticholinergic and sedative effects. Its anti-serotonergic effect on the appetite center in the hypothalamus may explain its ability to stimulate appetite.

B complex vitamins: Vitamin B1 plays an essential role in carbohydrate metabolism. Riboflavin is necessary to utilize the energy found in food. Vitamin B6 is mainly involved in the metabolism of amino acids. It is also involved in the metabolism of carbohydrates and fats, and is necessary for the formation of hemoglobin. Vitamin B3 participates in the stimulation of enzymes responsible for the proper respiratory activity of tissues.

Ascorbic acid (vitamin C): It is a cofactor in many vital processes in the body, such as folic acid metabolism, amino acid oxidation, and iron absorption and transport. It plays an important enabling T lymphocytes to perform their normal function.

Pharmacokinetics:

Cyproheptadine Hydrochloride: It is well absorbed from the gastrointestinal tract, is extensively metabolized in the liver, and approximately 40% of the dose is excreted in the urine.

B complex vitamins: Vitamin B1 is well absorbed from the digestive system and is widely distributed in most body tissues. Excess amounts are excreted in the urine in the form of thiamine or in the form of unchanged metabolites. Vitamin B2 is absorbed from the digestive system and bound to plasma proteins in the circulatory system. Although it is widely distributed, only a little of it is stored in the body. Excess amounts are excreted in the urine. Vitamin B3 is easily absorbed from the gastrointestinal tract

after oral administration and is widely distributed in the body's tissues. Small amounts are excreted unchanged in the urine. Vitamin B6 is absorbed from the gastrointestinal tract, converted to the active form pyridoxal phosphate, and excreted in the urine as 4-pyridoxic acid.

Ascorbic acid (vitamin C): Easily absorbed from the digestive system and widely distributed in body tissues. Excess amounts are quickly excreted in the urine.

Indications:

- CYPROVITA is indicated in symptomatic relief of hypersensitivity including urticaria, angioedema, rhinitis and conjunctivitis, and in pruritic skin disorders.

- Because CYPROVITA contains Cyproheptadine, vitamin B complex and vitamin C it is useful in conditions like loss of appetite.

- It may be used to treat vitamin B complex and vitamin C deficiency.

Contraindications:

- Hypersensitivity to the active substances or to any of the components of the product.

- CYPROVITA should not be used in newborn or premature infants.

Warning & Precautions:

CYPROVITA should be used with caution in:

-Patients with closed-angle glaucoma, urinary retention, prostatic hypertrophy, pyloroduodenal obstruction.

-Patients with epilepsy, severe cardiovascular disorders, liver disorders, hyperthyroidism.

-Patients with asthma.

Pregnancy & Lactation:

There is a lack of definitive evidence of safety of CYPROVITA in human pregnancy and lactation. So, its use should be avoided during pregnancy or lactation.

Driving & using machines:

CYPROVITA may cause drowsiness, dizziness, blurred vision, and cognitive and psychomotor impairment. You should not drive or use machines while using CYPROVITA.

Drugs Interactions:

- Antihistamines may enhance the sedative effects of CNS depressants such as: alcohol, barbiturates, hypnotics, opioid analgesics, anxiolytic sedatives and neuroleptics.

- MAOI may enhance the antimuscarinic effects of antihistamines.

- Pyridoxine may increase the peripheral metabolism of levodopa, thus reducing its therapeutic efficacy.

Side Effects:

The most common side effect is sedation. This effect may diminish after a few days of treatment.

Antimuscarinic effects such as: dry mouth, blurred vision, difficulty urinating, constipation. Rarely, hematological disorders including agranulocytosis, leukopenia, and hemolytic anemia have been reported. Central nervous system stimulation may occur, especially in children who suffer from irritability, restlessness, and tremors.

Dosage & Administration:

The daily dosage may be given as a single dose in the evening or in divided doses.

Hypersensitivity Reactions and Pruritis:

Children (2 to 6 years): The usual dose is 5 ml two or three times a day. A maximum of 4 times a day.

Children (7 to 14 years): The usual dose is 10 ml two or three times a day. A maximum of 4 times a day.

Adolescents and Adults: The usual dose is 10 ml three times a day.

Prevention of Hypovitaminosis and loss of appetite:

5 - 10 ml (1 or 2 teaspoonfuls) Provides the required number of vitamins to prevent vitamin deficiency.

Overdose:

Effects of cyproheptadine overdose may vary from CNS depression to stimulation, especially in children. Signs and symptoms resembling atropine effects as well as gastrointestinal symptoms may also occur.

Overdose can be fatal, especially in infants and children. CYPROVITA contains levels of vitamins that pose little risk of overdose. In the event of an overdose, vomiting should be induced if possible, and activated charcoal may be used.

Storage: Keep out of reach of children. Store below 30° C.

Packaging: Each CYPROVITA carton box contains amber glass bottle of 100 ml.

-A medication is a product which affects your health, and it's consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medication.
-The doctor and the pharmacist experts in medicine, it's benefits and risks.
-Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
KEEP THE MEDICINE OUT OF REACH OF CHILDREN
Council of Arab Health Ministers- Union of Arab Pharmacies

Reva Pharmaceutical Industry - Syria

سيروفيتا

شراب



التركيب: كل ٥ مل سيروفيتا شراب تحتوي على:

سيبروهيبتادين هيدروكلوريد	٢,٠٠ ملغ
ثيامين هيدروكلوريد (فيتامين ب ١)	٠,٦٠ ملغ
ريبوفلافين (فيتامين ب ٢)	٠,٧٥ ملغ
بيريدوكسين هيدروكلوريد (فيتامين ب ٦)	٠,٦٠ ملغ
نيكوتين أميد (فيتامين ب ٣)	٥,٠٠ ملغ
حمض الأسكوربيك (فيتامين سي)	٢٠,٠٠ ملغ

الخصائص الدوائية وآلية التأثير:

سيبروهيبتادين هيدروكلوريد: هو مضاد للسيروتونين والهيستامين، وله تأثيرات مضادة للكوئين ومهدئة. قد يفسر تأثيره المضاد للسيروتونين على مركز الشهية في منطقة ما تحت المهاد قدرته على تحفيز الشهية.

فيتامينات ب المركبة: فيتامين ب ١ يلعب دوراً أساسياً في استقلاب الكربوهيدرات. الريبوفلافين ضروري للاستفادة من الطاقة الموجودة في الغذاء. فيتامين ب ٦ يشارك بشكل رئيسي في استقلاب الأحماض الأمينية. كما أنه يشارك في استقلاب الكربوهيدرات والدهون، وهو ضروري لتكوين الهيمو غلوبين. فيتامين ب ٣ يشارك في تحفيز الإنزيمات المسؤولة عن النشاط التنفسي السليم للأنسجة. **حمض الأسكوربيك (فيتامين سي):** هو عامل مساعد في العديد من العمليات الحيوية في الجسم، مثل استقلاب حمض الفوليك، وأكسدة الأحماض الأمينية، وامتصاص ونقل الحديد. يلعب دوراً هاماً في تمكين الخلايا الليمفاوية الثانية من أداء وظيفتها الطبيعية.

الحرائك الدوائية:

سيبروهيبتادين هيدروكلوريد: يمتص بشكل جيد من القناة الهضمية ويخضع للاستقلاب على نطاق واسع في الكبد وي طرح حوالي ٤٠٪ من الجرعة في البول.

فيتامينات ب المركبة: يمتص فيتامين ب ١ بشكل جيد من الجهاز الهضمي ويتوزع على نطاق واسع في معظم أنسجة الجسم. تُطرح الكميات الزائدة عن حاجة الجسم في البول على شكل ثيامين أو على شكل مستقلبات غير متغيرة. يمتص فيتامين ب ٢ من الجهاز الهضمي ويرتبط ببروتينات البلازما في الدورة الدموية. على الرغم من توزيعه على نطاق واسع، إلا أنه لا يتم تخزين سوى القليل منه في الجسم، تُطرح الكميات الزائدة عن حاجة الجسم في البول. يمتص فيتامين ب ٣ بسهولة من الجهاز الهضمي بعد تناوله عن طريق الفم ويتم توزيعه على نطاق واسع في أنسجة الجسم، تُطرح كميات

صغيرة منه دون تغيير في البول. يمتص فيتامين ب ٦ من الجهاز الهضمي ويتحول إلى الشكل الفعال فوسفات البيريدوكسال وي طرح في البول على شكل حمض ٤-بيريدوكسيل.

حمض الأسكوربيك (فيتامين سي): يمتص بسهولة من الجهاز الهضمي ويتوزع على نطاق واسع في أنسجة الجسم. تُطرح الكميات الزائدة عن حاجة الجسم بسرعة في البول.

الاستقطابات:

- يُستعمل سيروفيتا في تخفيف أعراض فرط الحساسية بما في ذلك الشرى والوذمة الوعائية والتهاب الأنف والتهاب الملتحمة وفي اضطرابات الجلد الحكة.

- بسبب احتواء سيروفيتا على سيبروهيبتادين ومجموعة فيتامينات ب وفيتامين سي فهو مفيد في حالات فقدان الشهية.

- يمكن أن يستخدم لعلاج نقص فيتامينات ب وفيتامين سي.

مضادات الاستقطاب:

- فرط الحساسية للمواد الفعالة أو لأي من مكونات المستحضر.

- لا ينبغي استخدام سيروفيتا لدى الأطفال حديثي الولادة أو الخدج.

التحذيرات والاحتياطات: يجب استخدام سيروفيتا بحذر لدى:

- المرضى الذين يعانون من الزرق مغلق الزاوية، احتباس البول، تضخم البروستات، انسداد البواب الاثني عشري.

- مرضى الصرع، اضطرابات القلب والأوعية الدموية الشديدة، اضطرابات الكبد، فرط نشاط الغدة الدرقية.

- مرضى الربو.

الحمل والإرضاع:

لا يوجد دليل قاطع على سلامة سيروفيتا أثناء الحمل والإرضاع عند البشر. لذلك يجب تجنب استخدامه خلال الحمل أو الإرضاع.

القيادة واستخدام الآلات:

قد يسبب سيروفيتا النعاس، الدوخة، عدم وضوح الرؤية، الضعف الإدراكي والنفسي الحركي. يجب عدم القيادة واستخدام الآلات عند استعمال سيروفيتا.

التداخلات الدوائية:

- قد تعزز مضادات الهيستامين التأثيرات المهدئة لمثبطات الجهاز العصبي المركزي مثل: الكحول، الباربيتورات، المنومات، المسكنات الأفيونية، المهدئات المزيلة للقلق ومضادات الدهان.

- مثبطات مونو أمينو أوكسيداز قد تزيد من التأثيرات المضادة للمسكارين لمضادات الهيستامين.

- قد يزيد البيريدوكسين من الاستقلاب المحيطي لليفودوبا، مما يقلل من فعاليته العلاجية.

التأثيرات الجانبية:

التأثير الجانبي الأكثر شيوعاً هو التركيز. قد يتضائل هذا التأثير بعد بضعة أيام من العلاج.

التأثيرات المضادة للمسكارين مثل: جفاف الفم، تشوش الرؤية، صعوبة التبول، إمساك. نادراً ما تم الإبلاغ عن اضطرابات دموية تشمل ندرة المحببات، قلة الكريات البيض، فقر الدم الانحلالي. قد يحدث تحفيز للجهاز العصبي المركزي خاصة عند الأطفال الذين يعانون من التشنج والأرق والرعدة.

الجرعة والاستعمال:

يمكن إعطاء الجرعة اليومية كجرعة وحيدة مساءً أو مقسمة على جرعات.

تفاعلات فرط الحساسية والحكة:

الأطفال (٦-٢ سنوات): الجرعة المعتادة ٥ مل مرتين إلى ثلاث مرات يومياً. وكحد أقصى ٤ مرات يومياً.

الأطفال (١٤-٧ سنة): الجرعة المعتادة ١٠ مل مرتين إلى ثلاث مرات يومياً. وكحد أقصى ٤ مرات يومياً.

المراهقون والبالغون: الجرعة المعتادة ١٠ مل ثلاث مرات يومياً.

الوقاية من نقص الفيتامينات وفقدان الشهية:

١٠ - ٥ مل (١ - ٢ ملعقة صغيرة) تؤمن الكمية المطلوبة من الفيتامينات للوقاية من نقص الفيتامينات.

فرط الجرعة:

قد تختلف التأثيرات الناتجة عن الجرعة الزائدة من السيبروهيبتادين من تثبيط الجهاز العصبي المركزي إلى التحفيز خاصة عند الأطفال. قد تظهر أيضاً علامات وأعراض تشبه التأثيرات الأتروبية بالإضافة إلى أعراض معدية معوية.

قد تكون الجرعة الزائدة قاتلة خاصة عند الرضع والأطفال. يحتوي سيروفيتا على مستويات من الفيتامينات التي تشكل خطراً ضئيلاً عند تناول جرعة زائدة. في حال تناول جرعة زائدة، يجب تحريض القيء إن أمكن ذلك، كما يمكن استخدام الفحم الفعال.

شروط الحفظ: بحفظ بعيداً عن متناول أيدي الأطفال. يُحفظ في درجة حرارة أقل من ٣٠ درجة مئوية.

التعبئة: كل عبوة كرتونية سيروفيتا تحتوي على عبوة زجاجية عاتمة سعة ١٠٠ مل.