

Composition:

Capsules: Each Carbolize Capsule contains: Carbocisteine 375 mg.

Syrup: Each 5 ml Carbolize Syrup contains: Carbocisteine 250 mg.

Mechanism of Action:

Carbocisteine has been shown to affect the nature and amount of mucus that is secreted by the respiratory tract. It reduces goblet cell hyperplasia, therefore plays a role in the management of disorders characterized by abnormal mucus.

Pharmacokinetics:

Carbocisteine is rapidly absorbed from the GI tract. The time to peak plasma concentration is about 2 hours. Carbocisteine can penetrate into the lung tissue and respiratory mucus.

Carbocisteine metabolised by acetylation, de-carboxylation, and sulfoxidation. It is excreted via urine as unchanged drug and metabolites. The elimination half-life is approximately 1.87 hours.

Indications:

Carbocisteine is a mucolytic agent for the adjunctive therapy of respiratory tract disorders characterised by excessive and viscous mucus, including chronic obstructive airways disease.

Contraindications:

- Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients.
- In patients with active peptic ulceration.
- Children under two years of age.

Warnings & Precautions:

Caution is advised in the administration of Carbocisteine in individuals susceptible to gastroduodenal ulcers.

Pregnancy & Lactation:

Pregnancy: The use of Carbolize in pregnant women is not recommended, especially during the first trimester of pregnancy.

Lactation: It is unknown whether Carbocisteine and / or its metabolites are excreted in mother milk. Carbolize is not recommended for use during lactation.

Drug Interactions:

No drug interactions have been identified.

Side Effects:

Side effects are rare and include: Nausea, vomiting, diarrhea, epigastric discomfort, headache, dizziness, urinary incontinence and palpitations. Rarely, bullous dermatitis (e.g., Stevens-Johnson syndrome, erythema multiforme).

Driving & Using Machines:

Carbocisteine does not affect the ability to drive and use machines.

Dosage & Administration:

Adults: Two capsules three times a day reducing to one capsule four times a day, when a satisfactory response is obtained.

Children:

2 - 5 years: 1.25 - 2.5 ml, four times a day.

6 - 12 years: 5 ml, three times a day.

Carbocisteine is not indicated in children aged less than 2 years.

Overdose:

Symptoms: Gastrointestinal disturbance (gastralgias, nausea and vomiting) are the most likely symptoms of carbocisteine overdose.

Treatment: Supportive treatment. Do gastric lavage, and closely monitor the patient.

Storage:

Keep out of reach of children. Store below 25 °C.

Packaging:

Capsules: Each CARBOLIZE carton box contains 20 Capsules in two blister strips.

Syrup: Each CARBOLIZE carton box contains amber glass bottle of 100 ml.

لم يتم الإبلاغ عن وجود أي تداخلات دوائية.

التأثيرات الجانبية:

الأثار الجانبية نادرة وتشمل: العثيان، القيء، الإسهال، انزعاج شرسوفي، الصداع، دوخة، سلس البول وخفقان القلب. نادرأ التهاب الجلد الفقاعي (على سبيل المثال، متلازمة ستيفن جونسون، حمى متعدد الأشكال).

القيادة واستخدام الآلات:

لا يؤثر الكربوسيسيتين على القدرة على القيادة واستخدام الآلات.

الجرعة والاستعمال:

البالغون: كبسولتان ثلاث مرات في اليوم تخفض الجرعة إلى كبسولة واحدة أربع مرات في اليوم عند الحصول على الاستجابة اللازمة.

الأطفال:

٢-٥ سنوات: ١,٢٥ - ٢,٥ مل أربع مرات في اليوم.
٦-١٢ سنة: ٥ مل ثلاث مرات يوميا.
لا يستطب كاربوسيسيتين لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين.

فرط الجرعة:

الأعراض: إن اضطرابات الجهاز الهضمي (آلم المعدة والغثيان والقيء) هي الأعراض الأكثر احتمالية للجرعة الزائدة من الكاربوسيستين.

العلاج: المعالجة الداعمة. القيام بغسيل المعدة، ومراقبة المريض عن كثب.

الحفظ:

يحفظ بعيداً عن متناول أيدي الأطفال. يحفظ في درجة حرارة أقل من ٢٥°م.

التَّعَبُّة:

الكبسول: كل عبة كرتونية كاربولايز تحتوي على ٢٠ كبسولة ضمن شريطين بلايستر.

الشراب: كل عبوة كرتونية كاربولايز تحتوي على عبوة زجاجية عاتمة سعة ١٠٠ مل.



کاربویلاز

کبیسول & شراب

التركيب:

الكبسول: كل كبسولة كاربولايذ تحتوي على:

کاربوسیتئین ۳۷۵ ملغ.

الشراب: كل ٥ مل كاربولايذ شراب تحتوي على:

کاربوسیسٹین ۲۵۰ ملغ.

آلية التأثير:

لقد ثبت أن الكربوسيسنتين يؤثر على طبيعة وكمية المخاط الذي يفرزه الجهاز التنفسي. حيث إنه يقلل من تضخم الخلايا الكأسية، وبالتالي يلعب دوراً في معالجة الاضطرابات التي تتميز بإنتاج المخاط غير الطبيعي.

الحرائك الدوائية:

يتمتع الكاربوسيستين بسرعة من الجهاز الهضمي. يبلغ الوقت اللازم للوصول إلى ذروة التركيز البلازمي حوالي ساعتين. يمكن للكاربوسيستين أن يخترق أنسجة الرئة والطبقة المخاطية في الجهاز التنفسي. يتم استقلاب الكاربوسيستين عن طريق تفاعلات الأستلة ووزع الكربوكسيل وأكسدة السلفونيل. يتم إطراره عن طريق البول على شكل دواء غير متغير وكمستقلبات. يبلغ العمر النصفى للإطراح حوالي ١,٨٧ ساعة.

الاستطابات:

الكاربوسيسيتين هو عامل حال البلغم يستخدم كدواء
مساعد في معالجة اضطرابات الجهاز التنفسي التي
تتميز بوجود مخاط كثيف ولزج، بما في ذلك مرض
انسداد الشعب الهوائية المزمن.

مضادات الاستطباب:

- فرط الحساسية للمادة الفعالة أو لأي من السواغات.
- لدى المرضى الذين يعانون من تقرحات هضمية نشطة.
- الأطفال بعمر أقل من سنتين.

التحذيرات والاحتياطات:

ينصح بالحذر عند إعطاء الكاربوسيستئين للمرضى المعرضين للإصابة بالقرحة الهضمية.

الحمل والارضاع:

الحمل: لا ينصح باستخدام كاربولاييز لدى النساء الحوامل، وخاصة خلال الثلث الأول من الحمل.

الإرضاع: من غير المعروف ما إذا كان الكربوسيتين و / أو مستقبلاته تفرز في حليب الأم. لا يُنصح باستخدام كربولايز خلال الإرضاع.