

CLOPEX Film Coated Tablets



Composition:

Each CLOPEX Film Coated Tablet contains:

Clopidogrel (as bisulfate) 75mg.

Mechanism of Action:

CLOPEX (Clopidogrel) is a prodrug that is metabolized by CYP450 enzymes to the active thiol derivative. The active thiol derivative selectively and irreversibly binds to the adenosine diphosphate (ADP) P2Y₁₂ receptor on platelets. This prevents ADP from binding and activating the glycoprotein GPIIb/IIIa complex, which is necessary for platelet aggregation. This inhibition is irreversible and persists throughout the life of the platelet (7 to 10 days).

Pharmacokinetic:

After single or multiple oral doses of CLOPEX 75 mg/day, absorption is rapid and is at least 50% (dose-limited). Clopidogrel has a half-life of approximately 6 hours.

Clopidogrel is extensively metabolized by two main pathways: one mediated by esterases and leading to hydrolysis into an inactive derivative and one mediated by multiple cytochrome P450 enzymes system into an intermediary metabolite, 2-oxo-clopidogrel, that is subsequently hydrolyzed to the active thiol metabolite. Clopidogrel and its metabolites are excreted in urine (50%) and in feces.

Indications:

CLOPEX indicated for:

● Acute coronary syndrome:

- For patients with acute unstable coronary syndrome (ACS) [unstable angina (UA)/non-ST-elevation myocardial infarction (NSTEMI)], CLOPEX has been shown to reduce the rate of myocardial infarction (MI) and stroke.

- For patients with ST-elevation myocardial infarction (STEMI), CLOPEX has been shown to reduce the rate of MI and stroke.

● Recent MI, recent stroke, or established peripheral arterial disease. CLOPEX has been shown to reduce the rate of MI and stroke.

Contraindications:

CLOPEX tablets are contraindicated in the following cases:

- Hypersensitivity to Clopidogrel or any of the components of the Product.

- severe hepatic impairment.

- In patients with active pathological bleeding such as peptic ulcer or intracranial haemorrhage.

Warnings & Precautions:

CLOPEX should be used with caution in the following cases:

- The risk of bleeding (such as; stomach ulcers, serious injuries and surgery).

- Patients with recent transient ischemic attack (if it occurred within the last seven days).

- Take some medicines (see drug interactions).

- In the case of liver and kidney problems.

- In the event of an allergy or reaction to any drug used to treat your illness.

- Thrombocytopenic purpura, which includes fever and bruising under the skin, may appear as delicate red points, with or without severe extreme fatigue, confusion, or yellowing of the skin or eyes (jaundice).

Pregnancy & Lactation:

Pregnancy: Pregnancy category B. Use during pregnancy only if clearly needed.

Lactation: It is unknown whether CLOPEX is excreted in breast milk. As a precautionary measure, breast-feeding should not be continued during treatment with Clopidogrel.

Drug Interactions:

- Proton pump inhibitors: Concomitant use of omeprazole or esomeprazole (CYP2C19 inhibitors) should be avoided because they reduce the effectiveness of the antiplatelet agents of Clopidogrel.

- Warfarin or heparin, NSAIDs, SSRIs: administration Clopidogrel with these medicines increases the risk of gastrointestinal bleeding.

Side Effects:

Bleeding is the most reported adverse reaction. Other common side effects includes: Bruising, diarrhea, abdominal pain, dyspepsia. Uncommon side effects includes: thrombocytopenia, gastric ulcer and duodenal ulcer, vomiting, nausea, constipation, flatulence, rash and pruritus.

Driving & Using Machine:

CLOPEX is unlikely to affect the ability to drive or use machines.

Dosage & Administration:

Always take this medicine exactly as the doctor has prescribed it to you. CLOPEX can be used with or without food.

● Acute coronary syndrome:

- The starting dose of CLOPEX is 300 mg taken oral single dose and then continue at 75 mg once daily

- Initiating CLOPEX without a loading dose will delay establishment of an antiplatelet effect by several days.

● Recent MI, recent stroke, or established peripheral arterial disease: 75 mg once daily orally without a loading dose Clopidogrel should not be used in children because of efficacy concerns.

Overdose:

Platelet inhibition by CLOPEX is irreversible and will last for the life of the platelet. Overdose following clopidogrel administration may result in bleeding complications. A single oral dose of Clopidogrel at 1500 or 2000 mg/kg was lethal to mice and to rats and at 3000 mg/kg to baboons. Symptoms of acute toxicity were vomiting, difficult breathing, and gastrointestinal hemorrhage in animals.

Based on biological plausibility, platelet transfusion may restore clotting ability.

Storage:

Keep out of reach of children. Store below 30 °C.

Packaging:

Each CLOPEX carton box contains 20 Film Coated Tablets in two Alu/Alu strips.

*A medication is a product which affects your health, and it's consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medication.
- The doctor and the pharmacist experts in medicine, it's benefits and risks.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
KEEP THE MEDICATIONS OUT OF REACH OF CHILDREN
Council of Arab Health Ministers Union of Arab Pharmacists

Reva Pharmaceutical Industry - Syria



كلوبيكس مضغوطات ملبسة بالفيلم

التَّرْكِيِب:

كل مضغوطة كلوبيكس ملبسة بالفيلم تحتوي على:
كلوبيدو غريل (على شكل بيسلفات) ٧٥ ملغ.

آلية التأثير:

كلويكس هو طليعة دواء يتم استقلابه بواسطة إنزيمات CYP450 إلى مشتق الثيول النشط. يرتبط مشتق الثيول النشط بشكل انتقائي وغير عكوس بمسقبل غشوي لفسفات الأدينوزين (ADP) 10 ± 2 P2Y على الصفائح الدموية. هذا يمنع ADP من ربط وتفعيل معقد غليكوبروتين (GPIIb / IIIa)، وهو ضروري لتجميع الصفائح الدموية. هذا التنشيط غير عكوس ويستمر طوال عمر الصفائح الدموية (٧ إلى ١٠ أيام).

الحرائك الذوائية:

بعد إعطاء جرة عرّة مفردة أو جرّعات متعددة من كلوبيديس ٧٥ ملغ / يوم، يكون الاتصال سريعاً ولا يقل عن ٥٠ ٪ من الجرّة (محدود بالجرّة). يمتلك الكلوبيديو غريل عرّاً نصفياً يقارب ٦ ساعات. ويتم استقلاب الكلوبيديو غريل على نطاق واسع من خلال مسارين رئيسيين، إحداهما بواسطة إنزيمات الإستيراز مما يقود إلى حلمته ويتشكل مستقلبات غير فعالة والثاني بواسطة الحملة الإنزيمية سيكروتوك P450 إلى مستقلب وسيط 2- أوكسو كلوبيديو غريل، والذي يتحلّم بعد ذلك إلى مستقلبات النشيط. يُطرح الكلوبيديو غريل ومستقلباته في البول (٥٠ ٪) وفي البراز.

الاستطابات:

يَسْتَعْمَلُ كَلَوِيكْسَ فِي:

- متلازمة الشريان التاجي الحادة:
بالنسبة للمرضى الذين يعانون من متلازمة الشريان التاجي الحادة غير المستقرة (الذبحة الصدرية غير المستقرة / احتشاء عضلة القلب غير المصحوب بارتفاع ST، فقد ثبت أن كلوبيكس يقلل من معدل احتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية.
- بالنسبة للمرضى الذين يعانون من احتشاء عضلة القلب المصحوب بارتفاع ST، فقد ثبت أن كلوبيكس يقلل من معدل احتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية.
- احتشاء العضلة القلبية الحاد، أو السكتة الدماغية الحديثة، أو مرض الشرايين المحيطية المستقر. لقد ثبت أن كلوبيكس يقلل من معدل احتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية.

يُمنع استخدام مضغوطات كلويكس في الحالات التالية:

- فرط الحساسية للكلوبدين غريل أو لأي من مكونات المستحضر.
- القصور الكلوي الحاد.
- عند المرضى المصابين بنزيف مرضي نشط مثل القرحة الهضمية أو النزيف داخل القحف.
- التحذيرات والاحتياطات:**
- يجب استعمال كلوبيكس بحذر في الحالات التالية:
- خطر حدوث النزف (مثل: قرحة المعدة والإصابات الخطيرة والجراحة)
- المرضى المصابين مؤخراً بهجمة إقفارية عابرة (إذا حدثت خلال الأيام السبعة الأخيرة).
- تناول بعض الأدوية (انظر التداخلات الدوائية).
- حالة الأمراض الكلوية والكلى والكلى.

- في حال وجود حساسية أو رد فعل تجاه أي دواء تستخدمه.

- فرقرية نقص الصفائح والتي تتضمن حمى وكدمات تحت الجلد قد تظهر كنقاط حمراء دقيقة، مع أو بدون تعب شديد، أو تشوش، أو اصفرار الجلد، أو العينين (البرقان).

الحمل والإرضاع:

الحمل: التصنيف الحملى B. يستخدم أثناء الحمل عند الحاجة فقط.

الإرضاع: من غير المعروف ما إذا كان كلوبيكس يفرز في حليب الأم. كإجراء احترازي، لا ينبغي أن تستمر الرضاعة الطبيعية أثناء العلاج بالكلوبيدوغريل.

التداخلات الدوائية:

مبثبات مضخة البروتون: يجب تجنب الاستعمال المتزامن مع مضبّطات الأوميفرازول أو الإيزوميلافرازول (مبثبات CYP2C19) لأنهما يخفّضان من فعالية التأثير المضاد للصفائح للكلوبيدو غريل.

الأورافارين أو الهيبارين، مضادات التهاب غير الستيرويدية، مبثبات إعادة طيب السيروتونين: تتناول كلوبيدو غريل مع هذه الأدوية يزيد من خطر حدوث نزيف في الجهاز الهضمي.

التأثيرات الجانبية:

الفزيف هو أكثر التأثيرات الجانبية المبلغ عنها. تشمل الآثار الجانبية الشائعة الأخرى: كدمات، إسهالاً، ألماً بطنيًا، عسر هضم.

تشتمل الآثار الجانبية غير الشائعة: قلة الصفائح والقرحة المعدية الإتي شبرية والقيء والغثيان والإمساك، وانثقاق البطن، والطفح الجلدي، والحكة.

القيادة واستخدام الآلات:

من غير المحتمل أن يؤثر كلوبيكس على القدرة على القيادة أو استخدام الآلات.

الجرعة والاستعمال:

أحرص دائماً على تناول هذا الدواء تماماً كما وصفه لك الطبيب.
يمكن استخدام كلوبيكس مع أو بدون الطعام.

- متلازمة الشريان التاجي الحادة:
- جرعته البدء من كلوبيكس هي ٣٠٠ ملغ تؤخذ دفعة واحدة عن طريق الفم ثم تتم المتابعة بجرعة ٧٥ ملغ مرة واحدة يوميا.
- يؤدي استعمال كلوبيكس بدون جرعة تحميل إلى تأخير ظهور التأثير المضاد لتراكم الصفائح لعدة أيام.
- احتشاء عضلة القلب الحاد، أو السكتة الدماغية الحديثة، أو مرض الشرايين المحيطية المؤكدة: ٧٥ ملغ مرة واحدة يوميا دون جرعة تحميل.
- لا ينبغي استخدام الكلوبيدو غريل لدى الأطفال بسبب مخاوف تتعلق بالفعالية.

فرط الجرعة:

إن تثبيت الصفائح الدموية بواسطة كلويكس غير عكوس ويستمر لفترة عمر الصفائح الدموية. قد تؤدي الجرعة الزائدة بعد تناول عقار كلويديو غريل إلى المضاعفات التالية. إن جرعة قاتلة واحدة من كلويديو غريل بمقدار ١٥٠٠ أو ٢٠٠٠ ملغ/كغ قاتلة للفئران والجرذان وعند ٢٠٠٠ ملغ/كغ قاتلة لفردة البابون. تشمل أعراض السمية الحادة القيء وصعوبة التنفس ونزيف الجهاز الهضمي لدى الجوانات.

بناءً على الدلائل الحيوية، قد يؤدي نقل الصفائح الدموية إلى استعادة القدرة على التخثر.

الحفظ:

يحفظ بعيداً عن متناول أيدي الأطفال. يحفظ في درجة حرارة أقل من ٣٠°م.

التَّعْبَةُ:

كل عبوة كرتونية كلوبيكس تحتوي على ٢٠ مضغوبة ملبسة بالفيلم ضمن شريطين Alu/Alu.

الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستعمله خلافاً لتعليمات پزشك المختص
 يمنع بصفة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي
 الذي صرفها لك ، فالعقارب والصيدلي هما الخبيران في الدواء وينتفع وضروره
 لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية
 لا تترك الأدوية يمتلكون أيدي الأطفال
 مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدلة العرب

نفاذ شركة ريفيا للصناعات الدوائية - سوريا