

DENX

Film Coated Tablets



Revva Pharma

Composition:

Each DENX film coated tablet contains:

Flupentixol 0.5 mg (as flupentixol dihydrochloride 0.584 mg)

Melitracen 10 mg (as melitracen hydrochloride 11.25 mg)

Pharmacological Properties & Mechanism of Action: DENX is a combination of two compounds (flupentixol and melitracen) used to treat mild to moderate mental disorders. Flupentixol acts as a dopamine 1 and 2 receptor antagonist. Melitracen acts in similar way to other tricyclic antidepressants blocking the reuptake of serotonin and norepinephrine in presynaptic terminals.

Many studies have indicated that the combination of flupentixol and melitracen (DENX) was effective in improving anxiety, depression and gastrointestinal symptoms (like abdominal pain and diarrhea) in IBS patients.

Pharmacokinetic:

Maximum serum concentration is reached in about 4 hours after oral administration of both flupentixol and melitracen. Oral bioavailability is about 40% for flupentixol. The plasma protein binding for flupentixol and melitracen are 99% and 89%, respectively. Flupentixol is metabolized by three major pathways - sulphoxidation, side-chain dealkylation and conjugation with glucuronic acid. The metabolism of melitracen proceeds mainly by demethylation and hydroxylation. The excretion half-life of flupentixol is about 35 hours and that of melitracen is about 19 hours. Both compounds are excreted primarily in the feces and to some extent in the urine.

Indications:

DENX is indicated for the treatment of:

- Neurasthenia, Psychogenic depression, Depressive neuroses, Masked depression.

- Somatic disorders of psychogenic origin accompanied by anxiety and apathy (e.g. gastrointestinal disturbances, migraine, tension headaches, pelvic pain and ulcers).

- Depression accompanying menopause.

- Dysphoria and depression in alcoholics and drug addicts.

Contraindications:

- Hypersensitivity to the active substances or to any of the excipients.

- Circulatory collapse, depressed level of consciousness due to any cause (e.g., intoxication with alcohol, barbiturates, or opiates), coma, blood disorders, phaeochromocytoma.

- Recent myocardial infarction. Any degree of atriocentric block or disorders of cardiac rhythm and coronary artery insufficiency.

- Concomitant treatment with monoamine oxidase inhibitors.

- Severe depression that requires hospitalization or electroconvulsive therapy (ECT).

Warnings & Precautions:

- DENX should be used with caution in patients with organic brain syndrome, convulsion, urinary retention, hyperthyroidism and advanced hepatic or cardiovascular disease.

- DENX may modify insulin and glucose responses calling for adjustment of the antidiabetic therapy in diabetic patients.

- DENX may cause acute attacks glaucoma in some patients.

- DENX should be used with caution in patients treated selective serotonin reuptake inhibitors.

Pregnancy & Lactation:

Pregnancy: DENX should not be used during pregnancy unless the expected benefit to the patient outweighs the theoretical risk to the fetus.

Lactation: Breast-feeding can be continued during DENX therapy if considered of clinical importance, but observation of the infant is recommended, particularly in the first 4 weeks after giving birth.

Driving & using machines:

Patients may have poor general concentration and attention, so they should be warned about their ability to driving or using machines.

Drug Interactions:

- DENX enhances the effect of alcohol, barbiturates and other central nervous system depressants.

- Concomitant use of monoamine oxidase inhibitors may lead to serotonin syndrome.

- Melitracen increases the cardiovascular effects of sympathomimetics (such as adrenaline, noradrenaline, and phenylephrine).

- DENX reduces the effect of levodopa and increases the risk of cardiac side effects.

- DENX antagonizes the antihypertensive effects of clonidine and methylodopa.

- DENX preparation increases the anticholinergic effect.

- Concurrent use with lithium or subitramine may increase the risk of neurotoxicity.

Side Effects:

In the recommended doses side-effects are rare and include: restlessness, insomnia, hypomania reported, rarely dizziness, tremor, visual disturbances, headache, hyperprolactinaemia, and extrapyramidal symptoms.

Dosage & Administration:

Adults: Usually two tablets daily: morning and evening

In severe cases the morning dose may be increased to two tablets.

Elderly patients (> 65 years): one tablet in the morning.

Maintenance dose: one tablet in the morning.

In case of insomnia and severe restlessness additional treatment with sedative in the acute phase is recommended.

Children: DENX is not recommended for use in children and adolescents under 18 years of age due to lack of data on efficacy and safety.

Overdose:

Symptoms: Somnolence, irritability, agitation, hallucinations. anticholinergic effects, convulsions, pyrexia, depressed level of consciousness, coma, respiratory depression, arrhythmias, cardiac failure, hypotension, cardiogenic shock, metabolic acidosis, hypokalemia.

Treatment: Gastric lavage should be carried out as soon as possible and activated charcoal may be administered. Measures aimed at supporting the respiratory and cardiovascular systems should be instituted. Convulsions may be treated with diazepam and extrapyramidal symptoms with biperiden.

Storage:

Keep out of reach of children. Store below 30° C

Packaging:

Each DENX carton box contains 20 film coated tablets in two blister strips.

-A medication is a product which affects your health, and it's consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medication.
- The doctor and the pharmacist experts in medicine, it's benefits and risks.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
KEEP THE MEDICATIONS OUT OF REACH OF CHILDREN.
Council of Arab Health Ministers/ Union of Arab Pharmacies

Revva Pharmaceutical Industry - Syria

11/11/2023
29/01/2024

31/11/2023
2/11/2023
9/11/2023



دينكس مضغوطات مليسة بالفيلم

التركيب:

كل مضغوة دينكس مليسة بالفيلم تحتوي على:

فلونينكتسول ٠.٥ ملغ (على شكل فلونينكتسول دي هيدروكلوريد ٠.٥٨٤ ملغ)

ميليتراسين ١٠٠ ملغ (على شكل ميليتراسين هيدروكلوريد ١١.٢٥ ملغ)

الخصائص الدوائية وآلية التأثير:

دينكس هو عبارة عن مشاركة بين المركبين (فلونينكتسول وميليتراسين) تستخدم في علاج الاضطرابات النفسية الخفيفة إلى المتوسطة. يعمل فلونينكتسول كحاصر لمستقبلات الدوبامين ١ و ٢. يعمل ميليتراسين بطريقة مشابهة لمضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة الأخرى التي تمنع عودة التقاط السيروتونين والنورإبينفرين في نهايات ما قبل المشبكي.

أشارت العديد من الدراسات إلى أن الجمع بين فلونينكتسول وميليتراسين (دينكس) كان فعالاً في تحسين القلق والاكتئاب وأعراض الجهاز الهضمي (مثل آلام البطن والإسهال) لدى مرضى القولون العصبي.

الحراك الدوائية:

يتم الوصول إلى ذروة التركيزات المصلية لكل من الفلونينكتسول والميليتراسين في حوالي ٤ ساعات بعد تناولهما عن طريق الفم. يبلغ التوافر الحيوي للفلونينكتسول بعد الإطعام الفموي حوالي ٤٠٪. تصل نسبة الارتباط ببروتين البلازما لكل من الفلونينكتسول والميليتراسين إلى ٩٩٪ و ٨٩٪، على التوالي. يتم استقلاب الفلونينكتسول من خلال ثلاثة طرق رئيسية وهي: السلفدة، نزع الكلة للسلسلة الجانبية والاقتران مع حمض الغلوكورونيك. تتم عملية استقلاب الميليتراسين بشكل رئيسي عن طريق نزع الميثيل وإضافة هيدروكسيل. يبلغ العمر النصفى لإطراح الفلونينكتسول حوالي ٣ ساعات والميليتراسين حوالي ١٩ ساعة. يتم إطراح كلا المركبين بشكل أساسي في البراز وإلى حد ما في البول.

الاستقطابيات: يستلزم دينكس لعلاج:

- ألوهن العصبي، الاكتئاب النفسي، الاكتئاب العصبي، الاكتئاب المقنع.
- الاضطرابات الجسدية نفسية المنشأ المصحوبة بالقلق واللامبالاة (مثل اضطرابات الجهاز الهضمي، الصداع النصفي، الصداع التوترى، آلام الحوض والقرحات).
- الاكتئاب المرافق لسن اليأس.
- خلل النطق والاكتئاب لدى مدمني الكحول والمخدرات.

مضادات الاستقطاب:

- فرط الحساسية تجاه المادة الفعالة أو أي من السواغات.
- انتعاش الدورة الدموية، انخفاض مستوى الوعي لأي سبب (مثل التسمم بالكحول أو الباربيتورات أو المركبات الأفيونية، الغيبوبة، اضطرابات الدم، ورم القواتم.
- احتشاء عضلة القلب الحاد، أي درجة من الحصار الأذيني البطيني أو اضطرابات نظم القلب، وقصور الشريان التاجي.
- الاستعمال المتزامن مع مثبطات مونو أمينو أوكسيداز.
- الاكتئاب الشديد الذي يتطلب التدخل إلى المشفى أو العلاج بالصدمة الكهربائية (ECT).

التحذيرات والأحياطات:

- يجب توخي الحذر عند استخدام دينكس لدى المرضى الذين يعانون من متلازمة الدماغ العضوية، التشنجات، احتباس البول، فرط نشاط الغدة الدرقية وأمراض الكبد أو القلب والأوعية الدموية المتقدمة.
- قد يتسبب دينكس بتعديل الاستجابة تجاه الأنسولين والغلوكوز مما يستدعي تعديل العلاج المضاد للسكري لدى مرضى السكري.
- قد يتسبب دينكس بإصابة بنوبات حادة من الزرق مغلق الزاوية لدى بعض المرضى.
- يجب استخدام دينكس بحذر عند المرضى الذين يعانون من اضطرابات

عودة التقاط السيروتونين الانتقائية:

الحمل والإرضاع:

الحمل: لا ينبغي استعمال دينكس أثناء الحمل إلا إذا كانت الفائدة المرجوة تفوق المخاطر المتوقعة على الجنين.

الإرضاع: يمكن أن تستمر الرضاعة الطبيعية أثناء المعالجة بدينكس إذا كانت ذات أهمية من الناحية السريرية، ولكن بوصى بمراقبة الرضيع، خاصة في الأسابيع الأربعة الأولى بعد الولادة.

القيادة واستخدام الآلات:

قد يعاني المرضى من ضعف في التركيز والانتباه بشكل عام، لذلك يجب تحذيرهم بشأن قدرتهم على القيادة أو استخدام الآلات.

التداخلات الدوائية:

- يعزز دينكس تأثير الكحول والباربيتورات ومثبطات الجهاز العصبي المركزي الأخرى.
- يؤدي تناول مثبطات مونو أمينو أوكسيداز بشكل متزامن إلى الإصابة بمتلازمة السيروتونين.
- يزيد الميليتراسين من التأثيرات القلبية الوعائية لمقلدات السودي (مثل الأدرينالين والنورادرينالين والفينيل إيفرين).
- يقلل دينكس من تأثير الليثيوم ويزيد من مخاطر الآثار الجانبية القلبية.

- يعاكس دينكس التأثيرات الخافضة للضغط للكلوندين والميثيل دوبا.

- يزيد مستحضر دينكس من تأثير مضادات الكولين.

- الاستخدام المتزامن مع الليثيوم أو سيوبرام قد يزيد خطر السمية العصبية.

التأثيرات الجانبية:

الآثار الجانبية نادرة في الجرعات الموصى بها وتشمل: تملأ، أرقاً، هوساً خفيفاً، نادراً دوخة، رعاشاً، اضطرابات بصرية، صداعاً، فرط برولاكتين الدم، وأعراضاً خارج هرمية.

الجرعة والاستعمال:

البالغون: الجرعة الاعيادية مضغوة مرتين يومياً، صباحاً ومساءً. وفي الحالات الشديدة يمكن زيادة الجرعة الصباحية إلى مضغوتين.

المرضى كبار السن (> ٦٥ سنة): مضغوة واحدة صباحاً.

جرعة الصيانة: مضغوة واحدة صباحاً.

في حالة الأرق والقلق الشديد بوصى بمعالجة إضافية بالمهدئات في المرحلة الحادة.

الأطفال: لا ينصح باستخدام دينكس لدى الأطفال والمراهقين بعمر أقل من ١٨ عاماً بسبب نقص البيانات المتعلقة بالفعالية والسلامة.

فرط الجرعة:

الأعراض: نعاس، تهيج، إثارة، هلوسة، تأثيرات مضادة للكلولين، تشنجات، حمى، انخفاض مستوى الوعي، غيبوبة، تثبيط تنفسي، عدم انتظام ضربات القلب، فشل قلبي، انخفاض ضغط الدم، صدمة قلبية، حمض استقلابي، نقص بوتاسيوم الدم.

المعالجة: يجب إجراء غسل للمعدة بأسرع ما يمكن وإعطاء الفحم الفعال. يجب اتخاذ تدابير لدعم الجهاز التنفسي والجهاز القلبي الوعائي. يمكن معالجة التشنجات بالديازيبام والأعراض خارج الهرمية ببيبيريدين.

شروط الحفظ:

يحفظ بعيداً عن متناول أيدي الأطفال. يحفظ في درجة حرارة أقل من ٣٠ درجة مئوية.

التعبئة:

كل عبوة كروتونية من دينكس تحوي ٢٠ مضغوة مليسة بالفيلم ضمن شريطين بليستر.

الواء مستحضر على شكل مضغوة، خلافاً للحلويات بحجم حبات السكر
أضرب مضغوة دينكس بطريقة الاستعمال الموصى بها عليها (تعليمات الطبيب)
التي صرفها، لا تقطعها (العصايب هذا الحظر في الدواء وبهذه ضرره
تذكر: لا تأكله بدون وصفة طبية
اتركه للأدوية مثل حقن اليد أو الأمثل
مجلس وزراء الصحة العرب واتخذ التعليمات العرب
اتحاد شركة ريفيا للصناعات الدوائية - سوريا