

METROZOL

Film Coated Tablets - Oral Suspension



Composition:

Tablets:

Each METROZOL 250 film coated tablet contains Metronidazole 250 mg.

Each METROZOL 500 film coated tablet contains Metronidazole 500 mg.

Oral suspension:

Each 5 ml METROZOL oral suspension contains Metronidazole 125 mg as benzoate.

Mechanism of Action:

The nitrate group in Metronidazole acts as an electron acceptor, forming cytochrome reference complexes that bind with proteins and DNA, causing cell death.

Pharmacokinetics:

After oral administration, Metronidazole is fully and rapidly absorbed, distributed well into body tissues and fluids, accumulates in patients with impaired hepatic function. Metronidazole and its metabolites are excreted through the kidneys.

Indications:

METROZOL has antiprotozoal action and is effective against *T. vaginalis*, *Entamoeba histolytica*, *Giardia intestinalis* and anaerobic bacteria, non-specific vaginitis and anaerobically-infected ulcers and pressure sores.

Contraindication:

METROZOL should not be given to patients who are hypersensitive to Metronidazole, its derivatives, or any of the ingredients in the product.

Warning & Precautions:

Regular clinical and laboratory monitoring are advised if administration of METROZOL for more than 10 days is considered. It should not be used in patients with blood dyscrasia. Caution is advised in patients with active disease of the central nervous system other than brain abscess and in patients with hepatic encephalopathy. When given in conjunction with alcohol, METROZOL may provoke a disulphiram like effect.

Pregnancy & Lactation:

Pregnancy: Pregnancy Category B, adequate studies in pregnant women failed to detect risk to the fetus at any stage of pregnancy, so it should be used during pregnancy only if needed and under the supervision of a doctor.

Lactation: It is transmitted through breast milk to a nursing infant, and should not be administered unless under the supervision of a doctor.

Drug Interactions:

Metronidazole interacts with Lithium, anticoagulants (Warfarin), Alcohol where a disulphiram-like reaction occurs, immunosuppressants (Ciclosporin), Phenobarbital, Fluorouracil, Cimetidine.

Side Effects:

Gastrointestinal effects include: nausea, coated tongue, dry mouth, an un-

pleasant metallic or bitter taste, headache, redness or sensitivity of the skin, and less frequently: lightheadedness, depression, anxiety, dizziness, urethral pain, dark urine, and rarely: Leukopenia and peripheral neuropathies have also been seen in long-term treatment.

Dosage & Administration:

Indications	Duration of Treatment	Adult & Children Over 10 years	Children 7 – 10 years	Children 3 – 7 years	Children 1 – 3 years
Amebic dysentery	5 – 10 days	800 mg Tid	400 mg Tid	200 mg Qid	200 mg Tid
Asymptomatic Amebiasis	5 – 10 days	400 – 800 mg Tid	200 – 400 mg Tid	100 – 200 mg Qid	100 – 200 mg Tid
Hepatic & extraintestinal amebiasis	5 – 10 days	400 – 800 mg Tid	200 – 400 mg Tid	100 – 200 mg Tid	100 – 200 mg Tid
Giardiasis	3 days	2 g once daily	1 g once daily	600 mg once daily	500 mg once daily
Trichomoniasis consort treatments recommended	7 days	200 mg Tid	100 mg tid	-	-
Vincent's infection	3 days	200 mg Tid	100 mg Tid	100 mg Tid	50 mg Tid
Anerobic infection	7 days	400 mg Tid	7.5 mg / kg Body weight in divided dose	7.5 mg / kg Body weight in divided dose	7.5 mg / kg Body weight in divided dose
Non-specific vaginitis	7 days	400 mg Tid	7.5 mg / kg Body weight in divided dose	7.5 mg / kg Body weight in divided dose	7.5 mg / kg Body weight in divided dose
Leg ulcer and pressure sore	7 days	400 mg Tid	7.5 mg / kg Body weight in divided dose	7.5 mg / kg Body weight in divided dose	7.5 mg / kg Body weight in divided dose

Storage:

Store in a dry place at a temperature below 25° C and protect from light. Keep out of reach of children.

Packaging:

Tablets: Each METROZOL carton box (250-500) contains 20 Tablets in two blisters.

Oral suspension: Each METROZOL Oral Suspension carton box contains Amber Glass Bottle of 100 ml.

-A medication is a product which affects your health, and it's consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medication.
-The doctor and the pharmacist experts in medicine: it's benefits and risks.
-Do not repeat the same prescriptions without consulting your doctor.
KEEP THE MEDICAMENTS OUT OF REACH OF CHILDREN
Council of Arab Health Ministers, Union of Arab Pharmacies

Reva Pharmaceutical Industry - Syria

مضغوطات ملبسة بالفيلم - معلق فموي

المضغوطات:

كل مضغوطة ميتروزول ٥٠٠ ملبسة بالفيلم تحتوي على ميترونيدازول ٥٠٠ ملغ.

المعلق القموي:

کل ۵ مل میٹروزول معلق فموی تحوی علی میٹرونیڈازول ۱۲۵ ملغ علی شکل بنزوات.

آلية التأثير:

تتمارس مجموعة النترات الموجودة في الميثرونيدازول دور الأخذ للإلكترون مشكلة معقدات مرجعة

سامة للخلية إذ ترتبط بالبروتينات والـ DNA مسببة موت الخلية.

الحرانك الدوائية:

يُمتص الميترونيدازول بشكل كامل وسريع بعد إعطائه عن طريق الفم، يتوزع جيداً في نسيج الجسم وسوائله، يتراكم عند مرضى سوء الوظيفة الكبدية، يتم إخراج الميترونيدازول ومستقلباته عن طريق الكلية.

الاستطابات:

ميتروزلو يمتلك خواص مضادة للألوي، كما يمتلك فعالية ضد المشعرة المهلبية، والمتحول الزحاري، والجيارديا المعوية، كما له تأثير مضاد للجراثيم اللاهوائية، كحالات أخماج المهبّل اللانوعية والقرحة المسببة بالجراثيم اللاهوائية، وقرحة الفراش.

مضادات الاستطباب

لا يعطى ميتروزلول للمرضى الذين لديهم فرط حساسية للميترونيدازول أو أحد مشتقاته أو لأي من مكونات المستحضر.

التحذيرات و الاحتياطات:

يُتصحّح بآراء مراقبة سريرية ومخبرية منتظمة عند تناول ميتوزول لأكثر من ١٠ أيام. كما يجب عدم استخدامه لدى مرضى اضطراب الصيغة الدوائية. يُتصحّح بالحذر في المرضى الذين يعانون من أمراض نشطة في الجهاز العصبي المركزي عدا خراج الدماغ وفي المرضى الذين يعانون من اعتلال الدماغ الكبدى. عند تناول ميتوزول مع الكحول، قد يسبب تأثيراً مشابهاً لتأثير الديسليفرام.

الحمل و الارضاع:

الحمل: تصنيفه الحملي B، الدراسات الكافية في النساء الحوامل فشلت في اكتشاف الخطر على الجنين في أي من مراحل الحمل، لذلك يجب استخدامه أثناء الحمل فقط في حال الحاجة وبإشراف الطبيب.

الإرضاع: ينتقل عن طريق حليب الأم للطفل الرضيع، يجب عدم إعطائه إلا بإشراف الطبيب.

القداحلات الدوائية:

يتداخل الميترونيدازول مع الليثيوم، مضادات التخثر (الوارفارين)، الكحول حيث يحدث تفاعل شبيه بالديسوفلورام، مثبطات المناعة (سيكلوسبورين)، فنيباريتال، فلوروبروسيل، سيميتيدين.

التأثيرات الجانبية:

تأثيرات معدية معوية تتضمن: غثيان، اللسان المغلف، جفاف الفم، طعم غزير محبب معدني أو طعم مر، الصداع، احمرار أو تحسس الجلد، وبشكل أقل حدوثاً: النوار، الانتكاب، القلق، النوبة، ألم إبطي، بول غامق اللون، وبشكل نادر: ندرة الكريات البيض، كما شوهدت اعتلالات عصبية مميزة في المعالجة طويلة الأمد.

الجرعة والاستعمال:

جرعة الأطفال من سنة إلى ٣ سنوات	جرعة الأطفال من ٣ إلى ٧ سنوات	جرعة الأطفال من ٧ إلى ١٠ سنوات	جرعة البالغين والأطفال فوق ١٠ سنوات	مدة العلاج	الاستطباب
٢٠٠ ملغ ثلاث مرات يوميا	٢٠٠ ملغ أربع مرات يوميا	٤٠٠ ملغ ثلاث مرات يوميا	٨٠٠ ملغ ثلاث مرات يوميا	١٠-٥ أيام	الإسهال الزحاري
١٠٠-٢٠٠ ملغ ثلاث مرات يوميا	١٠٠-٢٠٠ ملغ أربع مرات يوميا	٢٠٠-٤٠٠ ملغ ثلاث مرات يوميا	٤٠٠-٨٠٠ ملغ ثلاث مرات يوميا	١٠-٥ أيام	الداء الأميبي اللاعرضي
١٠٠-٢٠٠ ملغ ثلاث مرات يوميا	١٠٠-٢٠٠ ملغ ثلاث مرات يوميا	٢٠٠-٤٠٠ ملغ ثلاث مرات يوميا	٤٠٠-٨٠٠ ملغ ثلاث مرات يوميا	١٠-٥ أيام	الداء الأميبي الكبدى أو خارج المعوي
٥٠٠ ملغ مرة واحدة يوميا	٦٠٠ ملغ مرة واحدة يوميا	١ مرة واحدة	٢ مرة واحدة يوميا	٣ أيام	داء الجيارديا
-	-	١٠٠ ملغ ثلاث مرات يوميا	٢٠٠ ملغ ثلاث مرات يوميا	٧ أيام	المشعرات المهبلية
٥٠ ملغ ثلاث مرات يوميا	١٠٠ ملغ ثلاث مرات يوميا	١٠٠ ملغ ثلاث مرات يوميا	٢٠٠ ملغ ثلاث مرات يوميا	٣ أيام	التهاب اللثة التقرحى الناخر الحاد
٧,٥ ملغ/كل كغ من وزن الجسم في جرعات مقسمة	٧,٥ ملغ/كل كغ من وزن الجسم في جرعات مقسمة	٧,٥ ملغ/كل كغ من وزن الجسم في جرعات مقسمة	٤٠ ملغ ثلاث مرات يوميا	٧ أيام	الأخماج اللاهوائية
٧,٥ ملغ/كل كغ من وزن الجسم في جرعات مقسمة	٧,٥ ملغ/كل كغ من وزن الجسم في جرعات مقسمة	٧,٥ ملغ/كل كغ من وزن الجسم في جرعات مقسمة	٤٠ ملغ ثلاث مرات يوميا	٧ أيام	أخماج المهيل اللاوعية
٧,٥ ملغ/كل كغ من وزن الجسم في جرعات مقسمة	٧,٥ ملغ/كل كغ من وزن الجسم في جرعات مقسمة	٧,٥ ملغ/كل كغ من وزن الجسم في جرعات مقسمة	٤٠ ملغ ثلاث مرات يوميا	٧ أيام	تقرحات الأرجل وتقرحات الفراش

شروط الحفظ:

بـحفظ في مكان جاف بدرجة حرارة أقل من ٢٥ درجة مئوية، بعيداً عن الضوء.

حفظ بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

التَّعْبَةُ:

المضغوطات: كل عبوة كرتونية ميترزول (٢٥٠ - ٥٠٠) تحتوي ٢٠ مضغوظة ملابس بالفيلم ضمن

شُرِيطِينَ بَلِيسْتَر.

المعلق الفموي: كل عبوة كرتونية ميتروزول معلق فموي تحتوي زجاجة عاتمة سعة ١٠٠ مل.

الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستعمله بحذق! خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر
 بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي
 التي صرفها لك ، فالطبيب والصيدلي هما الخبيران في الدواء وينبغيه وضروبه
 لاكثر من صرف الدواء بدون وصفة طبية
 لاتترك الأدوية بمقتول ايدي الاطفال
 مجتهد و زوايا الصحة العرب واتحاد الصيدليات العرب