

Meba Plus

Film Coated Tablets



Composition:

Each Meba Plus Film Coated Tablet contains:

Mebeverine hydrochloride 100 mg and Sulpiride 25 mg.

Pharmaceutical Group:

Anticholinergics, Selective Dopamine Receptor Blockers.

Pharmacological Properties & Mechanism of Action:

- Mebeverine is a musculotropic antispasmodic drug with a direct action on the smooth muscle of the gastrointestinal tract, without affecting normal gut motility. Mebeverine acts by stabilizing excitable membranes. Moreover, it has weak anti-muscarinic and anesthetic activity.

- Sulpiride is a member of the group of substituted benzamides. It is a selective antagonist of central dopamine (D_2 , D_3 and D_4) receptors. One of the unique characteristics of Sulpiride is its bimodal activity, as it has both antidepressant and neuroleptic properties.

Pharmacokinetics:

Mebeverine is rapidly and completely absorbed after oral administration. 75% of mebeverine binds to serum albumin. It is mainly metabolised by esterases enzymes, which split the ester bonds into veratric acid and mebeverine alcohol firstly. The main metabolite in plasma is demethylated carboxylic acid. The major route of excretion of the metabolites is via the urine (95%) and the peak rate of excretion usually occurs within two hours.

Peak Sulpiride serum levels are reached 3-6 hours after an oral dose. The plasma half-life in human is approximately 8 hours. Approximately 40% sulpiride is bound to plasma proteins. 95% of the compound is excreted in the urine and faeces as unchanged sulpiride. The elimination half-life is about 3-10 hours.

Indications:

Meba Plus is used for the treatment of the following diseases and symptoms:

- Irritable bowel syndrome.
- Cramps in the stomach.
- Gas and Bloating.
- Changes in bowel habits.
- Contraction related to small and large intestine.
- Pain related to small and large intestine.

Contraindications:

- Hypersensitivity to mebeverine or Sulpiride or to any of the excipients.
- Phaeochromocytoma and acute porphyria.
- Concomitant prolactin-dependent tumors e.g., pituitary gland prolactinomas and breast cancer.
- Severe renal and hepatic impairment.
- Concomitant use with levodopa or antiparkinsonian drugs.

Warnings & Precautions:

Meba Plus should be used with caution in the following situations:

- In elderly people, particularly if they have dementia, hyper-tension or risk factors for stroke.
- A history of blood clots since antipsychotic drugs can cause blood clots.
- Patients with glaucoma, absence of intestinal transit, congenital stenosis of the gastrointestinal tract, urinary retention, or prostatic hypertrophy.

- A history of breast cancer, due to the possible onset of hyperprolactinemia. Sulpiride may increase prolactin levels.
- Patients who have cardiac dysrhythmia, liver and kidney disease.

Pregnancy & Lactation:

Pregnancy: Meba Plus is not recommended during pregnancy and in women of childbearing potential not using effective contraception.

Lactation: You should not breast-feed during therapy with Meba Plus. You should consult the doctor about the best way to feed your baby if you are taking Meba Plus.

Drugs Interactions:

- Meba Plus may interact with each of the following medications: carbamazepine, diazepam, phenytoin, quinine, tramadol, valproate.
- Levodopa and anti-Parkinson medications: It is prohibited to give Meba Plus with these medications due to the presence of a mutual antagonism in effect between them and antipsychotics (such as Sulpiride).
- Alcohol: Enhances the sedative effects of neuroleptics (Sulpiride).
- Combination with the following medications could induce arrhythmia (torsades de pointes) or prolong the QT interval: β -blockers, some Ca channel blockers (e.g. diltiazem, verapamil); diuretics, stimulant laxatives, amphotericin B; Class IA antiarrhythmic drugs (e.g. quinidine, disopyramide); Class III antiarrhythmic drugs (e.g. amiodarone, sotalol); Pimozide, Haloperidol, Imipramine.
- Antacids or sucralate: The absorption of Sulpiride is decreased after co-administration.
- Lithium: Increased risk of extrapyramidal effects.
- Antihypertensive drugs: enhanced antihypertensive effect.

Side Effects:

Meba Plus may cause some of the following side effects, although they do not always occur: Exanthema, Face edema, Allergic reactions, Angioedema, Sleepiness, Lack of energy, Weight gain, Constipation, Difficulty sleeping, Feeling confused, Blocked nose, Blurred vision, and Over excitement.

Driving & Using Machines:

This medicine can cause drowsiness. Caution should be exercised while driving or using machinery.

Dosage & Administration:

One tablet 3-4 times daily before meals.

Overdose:

Symptoms: Restlessness, decrease in consciousness, extrapyramidal symptoms, agitation, confusion, low blood pressure, coma.

Treatment: Follow symptomatic and supportive treatment procedures. Sulpiride may be partially removed by hemodialysis or treated with alkaline osmotic diuresis. May administer anti-parkinsonian drugs, if necessary. If severe extrapyramidal symptoms occur, anticholinergics should be administered.

Storage:

Keep out of reach of children. Store below 25° C.

Packaging:

Each Meba Plus carton box contains 20 film coated tablets in two blister strips.

-A medicament is a product which affects your health, and it's consumption contrary to instructions is dangerous for you.
-Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
-The doctor and the pharmacist experts in medicine, it's benefits and risks.
-Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
-KEEP THE MEDICAMENTS OUT OF REACH OF CHILDREN
Council of Arab Health Ministers, Union of Arab Pharmacies

Reva Pharmaceutical Industry - Syria



مضغوطات مليسة بالفيلم

ميبا بلس

التركيب:

كل مضغوة ميبا بلس مليسة بالفيلم تحتوي على:
مبيفيرين هيدروكلوريد ١٠٠ ملغ وسوليبريد ٢٥ ملغ.

الزمرة الدوائية:

المضادات الكولينية، حاصرات مستقبلات الدوبامين الانتقائية.

الخصائص الدوائية وآلية التأثير:

- المبيفيرين هو دواء مضاد للتشنج العضلي ذو تأثير مباشر على العضلات الملساء في الجهاز الهضمي، دون التأثير على حركة الأمعاء الطبيعية. يعمل عن طريق تثبيت الأغشية القابلة للإستثارة. علاوة على ذلك، فإن له نشاط ضعيف كمضاد للموسكارين ومخدر. - سوليبريد هو أحد أفراد مجموعة البنزاميدات المستبدلة. وهو حاصر ثنائي لمستقبلات الدوبامين المركزية (D_1 , D_2 , D_3). أحد خصائص سوليبريد الفريدة هو فعاليته ثنائية النسخ، حيث أنه يمتلك خصائص مضادة للاكتئاب ومضادة للذهان.

الحراك الدوائية:

يتم امتصاص المبيفيرين بسرعة وبشكل كامل بعد تناوله عن طريق الفم. يرتبط ٧٥٪ من المبيفيرين بالبلازما المصل. يتم استقلابه بشكل رئيسي عن طريق إنزيمات الإستيراز، التي تقسم روابط الإستر ليتشكل حمض الفيراتريك وحمول المبيفيرين بشكل مبدئي. المستقلب الرئيسي في البلازما هو حمض الكربوكسيل مزروع الميثيل. يتم إخراج المستقلبات بشكل رئيسي عن طريق البول (٩٠٪) وعادة ما يحدث المعدل الأقصى للإخراج خلال ساعتين. تبلغ المستويات المصلية لـ سوليبريد ذروتها بعد ٦-٣ ساعات من تناول الجرعة الفوية. يبلغ العمر النصفى في البلازما لدى الإنسان حوالي ٨ ساعات. يرتبط ٤٠٪ تقريباً من سوليبريد ببروتينات البلازما. يطرأ ٩٥٪ من المركب في البول والبراز على شكل سوليبريد غير متغير. يبلغ العمر النصفى للإخراج حوالي ١٠-٣ ساعات.

الاستقطابيات:

يستخدم ميبا بلس في علاج الأمراض والأعراض التالية:

• متلازمة القولون المتفتح «القولون العصبي».

• تشنجات المعدة.

• تطبل البطن والغازات.

• تغيرات في عادات الأمعاء.

• الانقباضات المتعلقة بالأمعاء الدقيقة والغليظة.

• الألم المتعلق بالأمعاء الدقيقة والغليظة.

مضادات الاستقطاب:

• فرط الحساسية للمبيفيرين أو لسوليبريد أو لأي من المكونات.

• ورم القولون والبروفيريا الحادة.

• الإصابة بأورام مرافقة معتمدة على البرولاكتين مثل أورام الغدة

الخلفية البرولاكتينية وسرطان الثدي.

• القصور الكلوي والكبدى الشديد.

• الاستعمال المتزامن مع الفلوفوديا أو الأدوية المضادة لداء باركنسون.

التحذيرات والاحتياطات:

يجب استخدام ميبا بلس بحذر في الحالات التالية:

- عند كبار السن، خاصة إذا كانوا يعانون من الخرف أو ارتفاع

ضغط الدم أو عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

- تاريخ من الإصابة بجلططات دموية حيث إن الأدوية المضادة للذهان

يمكن أن تسبب جلطات دموية.

- المرضى الذين يعانون من الإصابة بالزرق أو غياب العيون

المعوي أو التضيق الخلقي في الجهاز الهضمي أو احتباس البول أو

تضخم البروستات.

- تاريخ من الإصابة بسلطان الثدي، بسبب احتمالية حدوث فرط

برولاكتين الدم. قد يزيد سوليبريد من مستويات البرولاكتين.
- لدى المرضى الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب، أمراض الكبد والكلى.

الحمل والإرضاع:

الحمل: لا ينصح باستخدام ميبا بلس أثناء الحمل أو لدى النساء في

سن الإنجاب واللاتي لا يستخدمن وسائل منع حمل فعالة.

الإرضاع: يجب عدم الإرضاع خلال فترة العلاج بـ ميبا بلس. يجب

استشارة الطبيب حول أفضل طريقة لإطعام طفلك إذا كنت تتناولين

ميبا بلس.

التداخلات الدوائية:

قد يتداخل ميبا بلس مع كل من الأدوية التالية: كاربامازيبين،

الديازيبام، الفينيتوين، الكينين، الترامادول، فالبروات.

الليفودوبا والأدوية المضادة للباركنسون: يمنع إعطاء ميبا بلس مع

هذه الأدوية بسبب وجود تضاد متبادل في التأثير بينها وبين مضادات

الذهان (مثل السوليبريد).

الكحول: يزيد من التأثيرات المهدنة لمضادات الذهان (السوليبريد).

قد يؤدي الإطعام المتزامن مع الأدوية التالية إلى حدوث اضطراب

نظم (torsades de pointes) أو إطالة فترة QT: حاصرات بيتا،

وبعض حاصرات قنوات الكالسيوم (مثل ديلتيازيم، فيراباميل)، مدرات

البول والمليينات المثبطة، والأفوتيريسين ب، والأدوية المضادة

لاضطراب النظم مع الفعالة الأولى IA (مثل كينيد، ديسوبيراميد)؛

والأدوية المضادة لاضطراب النظم مع الفعالة الثالثة (مثل أمودارون،

سوتالول)، والبيموزيد، والهالوبيريدول، والإيميرامين.

- مضادات الحموضة أو سوكر الفات: ينخفض امتصاص سوليبريد

بعد الإطعام المتزامن.

- الليثيوم: زيادة خطر حدوث التأثيرات خارج الهرمية.

- الأدوية الخافضة للضغط: ازدياد التأثير الخافض لضغط الدم.

التأثيرات الجانبية:

قد يسبب ميبا بلس ظهور بعض التأثيرات الجانبية التالية، مع العلم

أنها لا تحدث دائماً: طفح جلدي، وذمة في الوجه، تفاعلات حساسية،

وذمة وعائية، غثاس، نقص الطاقة، زيادة الوزن، الإمساك، صعوبة

في النوم، الشعور بالارتباك، انسداد الأنف، عدم وضوح الرؤية،

والإفراط في الإثارة.

القيادة واستخدام الآلات:

هذا الدواء يمكن أن يسبب النعاس. يجب توخي الحذر أثناء القيادة أو

استخدام الآلات.

الجرعة والاستعمال:

مضغوة واحدة ٤-٣ مرات يومياً قبل الطعام.

فرط الجرعة:

الأعراض: تملل، انخفاض في الوعي، أعراض خارج هرمية،

هياج، ارتباك، انخفاض ضغط الدم، غيبوبة.

العلاج: اتباع إجراءات المعالجة العصبية والداعمة. يمكن إزالة

السوليبريد جزئياً عن طريق غسيل الكلى أو يعالج بإدراج البول

باستخدام المدرات المتناضحية القوية. قد تعطى الأدوية المضادة لداء

باركنسون، إذا لزم الأمر. في حال حدوث أعراض خارج هرمية

شديدة، يجب إعطاء المضادات الكولينية.

الحفظ:

يحفظ بعيداً عن متناول أيدي الأطفال. يحفظ في درجة حرارة أقل من

٢٥ درجة مئوية.

التعبئة:

كل عبوة كروتونية ميبا بلس تحتوي على ٢٠ مضغوة مليسة بالفيلم

ضمن شريطين بلاستيكيين.

دواء مستحضر بولار مي حصة، وإستشارة خلال التفاعلات مع هذا المنتج
الخطية وسعة التفاعل، طريقة الإستعمال الموصى بها، تعليمات تعليمات التعليمات
التي يجب أن تكون، أو تعليمات تعليمات ما قبل الإطعام أو الدواء وبطريقة وصورة
تكرر صرف الدواء بمرور الوقت
التي لا ينبغي تناول أي الأطفال
محظوظة أو الصيغة القوية، وإستشارة الطبيب
إنتاج شركة ربط للتفاعلات الدوائية - سوريا