

New Cold RELIEF

Syrup - Capsules



Composition:

Syrup: Each 5 ml of New Cold RELIEF syrup contains: Chlorpheniramine (as maleate) 2.5 mg and Phenylephrine (as hydrochloride) 5 mg.

Capsules: Each New Cold RELIEF Capsule contains: Chlorpheniramine Maleate 8 mg and Phenylephrine hydrochloride 20 mg as sustained release pellets.

Pharmacological Properties & Mechanism Of Action:

Chlorpheniramine Maleate: is a H_1 -Histamine receptors antagonist that reduces the effects of natural chemical histamine in the body. Histamine can cause some symptoms such as sneezing, itching, watery eyes, and runny nose.

Phenylephrine Hydrochloride: is a postsynaptic α -adrenergic receptor agonist, it has a decongestant effect by constricting blood vessels to reduce edema and swelling in the nose which helps breathing easier.

Pharmacokinetics:

Chlorpheniramine Maleate: Chlorpheniramine is well absorbed from the gastrointestinal tract after oral administration. Effects appear within 30 minutes, peak within 1 to 2 hours and last 4 to 6 hours. The half-life in plasma is estimated to be between 12 to 15 hours. About 22% of an oral dose is excreted unchanged in the urine.

Phenylephrine Hydrochloride: is absorbed irregularly from the gastrointestinal tract, is metabolized in the intestine and liver, and is almost completely excreted in the urine. After oral administration, maximum plasma concentrations are seen Achieved in 1 - 2 hours. The average plasma half-life is 2 to 3 hours.

Indications:

New Cold RELIEF is used to relieve symptoms caused by the common cold, allergic rhinitis, or other upper respiratory tract allergies, such as runny nose, nasal and sinus congestion, sneezing, watery eyes, itchy nose or throat.

Contraindications:

New Cold RELIEF is contraindicated in the following cases:

- Hypersensitivity to any of the components of the product.

- Patients who suffer from liver disease, glaucoma, thyroid disease, diabetes mellitus, heart diseases, enlarged prostate, and high blood pressure.

Warnings & Precautions:

- Patients with breathing problems such as bronchitis,

emphysema, asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) should be consulted with a doctor before taking New Cold RELIEF.

- New Cold RELIEF syrup should not be used to make a child drowsy.

- Avoid using New Cold RELIEF in patients, who are taking monoamine oxidase inhibitors (MAOI).

Pregnancy & Lactation:

You should not use New Cold RELIEF during pregnancy and lactation without consulting a doctor.

Drug Interactions:

- Concurrent use of New Cold RELIEF (phenylephrine) and monoamine oxidase inhibitors may cause an increase in blood pressure.

- Concurrent use of New Cold RELIEF and hypnotics or anxiolytics may cause an increase in sedative effects.

- New Cold RELIEF (phenylephrine) may reduce the efficacy of beta-blocking drugs and antihypertensive drugs.

Side Effects:

The most common side effects are drowsiness, headache, dry mouth and nose, constipation, dizziness, sleep disturbances, nervousness, high blood pressure and irregular heartbeat.

Driving & Using Machines:

It is advised to avoid driving and using dangerous machinery while taking New Cold RELIEF due to its sedative effects.

Dosage & Administration:

Capsules:

- Children over 12 years of age: one capsule every 12 hours.

Syrup:

Usual dose in children:

- Children aged 12 years and over: 10 ml every 4 hours.

- Children 6-11 years old: 5 ml every 4 hours.

- Maximum dose: 6 doses per 24 hours.

Storage:

Keep out of the reach of children. Store below 25° C.

Packaging:

Syrup: Each New Cold RELIEF carton box contains amber glass bottle of 100 ml.

Capsules: Each New Cold RELIEF carton box contains 20 Capsules in two blister strips.

-A medication is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medication.
-The doctor and the pharmacist experts in medicine, it's benefits and risks.
-Do not report the same prescription without consulting your doctor.
KEEP THE MEDICAMENTS OUT OF REACH OF CHILDREN
Council of Arab Health Ministers- Union of Arab Pharmacies

Reva Pharmaceutical Industry - Syria



ريفا فارما

نيو كولد ريليف

شراب - كبسول

التركيب:

الشراب: كل ٥ مل نيو كولد ريليف شراب تحتوي على:
كلورفينيرامين (على شكل مالات) ٢,٥ ملغ وفينيل إفرين
(على شكل هيدروكلوريد) ٥ ملغ.

الكبسول: كل كبسولة نيو كولد ريليف تحتوي على:

كلورفينيرامين مالات ٨ ملغ وفينيل إفرين هيدروكلوريد ٢٠ ملغ على شكل حبيبات مذبذبة التحرر.

الخصائص الدوائية وآلية التأثير:

كلورفينيرامين مالات: هو أحد حاصرات مستقبلات الهيستامين H_1 الذي يقلل من تأثيرات الهيستامين الكيميائي الطبيعي في الجسم. يمكن أن يسبب الهيستامين بعض الأعراض مثل العطاس والحكة ودماع العين وسيلان الأنف. **فينيل إفرين هيدروكلوريد:** شاد مستقبلات α_1 الأدرينالية ما بعد المشبك، يمتلك تأثير مزيل للاحتقان من خلال انقباض الأوعية الدموية لتقليل الوذمة والتورم في الأنف مما يساعد على التنفس بسهولة أكبر.

الحرائك الدوائية:

كلورفينيرامين مالات: يمتص الكلورفينيرامين بشكل جيد من القناة الهضمية بعد تناوله عن طريق الفم. تظهر التأثيرات خلال ٣٠ دقيقة، وتبلغ ذروتها خلال ساعة إلى ساعتين وتستمر من ٤ إلى ٦ ساعات. ويقدر العمر النصف في البلازما بين ١٢ إلى ١٥ ساعة. يطرح حوالي ٢٢٪ من الجرعة الفموية دون تغيير في البول.

فينيل إفرين هيدروكلوريد: يمتص بشكل غير منتظم من القناة الهضمية ويخضع للاستقلاب في الأمعاء والكبد، ويُطرح في البول بشكل شبه كامل. بعد تناوله عن طريق الفم، يتم الوصول إلى ذروة التركيز البلازمي خلال ١ - ٢ ساعة. يبلغ متوسط العمر النصف في البلازما من ٣ إلى ٣ ساعات.

الاستطبابات:

يستخدم نيو كولد ريليف للتخفيف من الأعراض الناجمة عن نزلات البرد أو التهاب الأنف التحسسي أو غيرها من حساسية الجهاز التنفسي العلوي، مثل سيلان الأنف، احتقان الأنف والجيوب الأنفية، العطاس، دماغ العين، حكة الأنف أو الحلق.

مضادات الاستطباب:

يُعتبر نيو كولد ريليف مضاد استطباب في الحالات التالية:
- فرط الحساسية تجاه أي من مكونات المستحضر.
- المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد، الزرق مغلق، الزاوية، أمراض الغدة الدرقية، داء السكري، أمراض القلب، تضخم البروستات، وارتفاع ضغط الدم.

التحذيرات والاحتياطات:

- يجب استشارة الطبيب قبل تناول نيو كولد ريليف للمرضى الذين يعانون من مشاكل في التنفس مثل التهاب الشعب الهوائية، انتفاخ الرئة، الربو ومرضى الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

- يجب عدم استخدام شراب نيو كولد ريليف لجعل الطفل يشعر بالنعاس.
- تجنب استعمال نيو كولد ريليف لدى المرضى الذين يتناولون مثبطات أحادي أكسيد الأمين (MAOI).

الحمل والإرضاع:

يجب عدم استخدام نيو كولد ريليف خلال فترة الحمل والإرضاع دون استشارة الطبيب.
التداخلات الدوائية:

- الاستخدام المتزامن لـ نيو كولد ريليف (فينيل إفرين) ومثبطات مونو أمينو أوكسيداز قد يسبب ارتفاع في ضغط الدم.
- الاستخدام المتزامن لـ نيو كولد ريليف مع المنومات أو مزيلات القلق قد يسبب زيادة في التأثيرات المهدئة.
- قد يقلل نيو كولد ريليف (فينيل إفرين) من فعالية أدوية حاصرات بيتا والأدوية الخافضة لضغط الدم.

التأثيرات الجانبية:

التأثيرات الجانبية الأكثر شيوعاً هي النعاس، الصداع، جفاف الفم والأنف، الإمساك، الدوخة، اضطرابات النوم، العصبية، ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب.

القيادة واستخدام الآلات:

يُنصح بتجنب القيادة واستخدام الآلات الخطرة خلال فترة تناول نيو كولد ريليف بسبب تأثيراته المهدئة.

الجرعة والاستعمال:

الكبسول:

- الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ١٢ سنة: كبسولة واحدة كل ١٢ ساعة.

الشراب:

الجرعة المعتادة لدى الأطفال:

- الأطفال بعمر ١٢ سنة فما فوق: ١٠ مل كل ٤ ساعات.
- الأطفال بعمر ٦-١١ سنة: ٥ مل كل ٤ ساعات.
- الجرعة القصوى: ٦ جرعات خلال ٢٤ ساعة.

الحفظ:

يحفظ بعيداً عن متناول أيدي الأطفال. يحفظ في درجة حرارة أقل من ٢٥ درجة مئوية.

التعبئة:

الشراب: كل عبوة كرتونية نيو كولد ريليف تحتوي على عبوة زجاجية عاتمة سعة ١٠٠ مل.

الكبسول: كل عبوة كرتونية نيو كولد ريليف تحتوي على ٢٠ كبسولة ضمن شريطين بليستر.

الدواء مستحضر بوتر على صمغك واستعماله خلافاً لتعليمات بعرضك للخطر
اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي
الذي صرفها لك . فالطبيب والصيدلي هما الخبيران في الدواء وبنفعه وضرره.
لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية .
لا تكرر الأدوية بمقتول أيدي الأطفال .
مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدلة العرب .

إنتاج شركة ريفا للصناعات الدوائية - سوريا