

REVAGRIP CHILD

Syrup



Composition:

Each 5 ml of REVAGRIP CHILD syrup contains:

Paracetamol	160 mg.
Chlorpheniramine Maleate	1 mg.
Dextromethorphan Hydrobromide	5 mg.
Phenylephrine Hydrochloride	2.5 mg.

Pharmacological Properties & Mechanism of Action:

REVAGRIP CHILD consists of a unique drug combination that combines:

Paracetamol: is an effective analgesic and antipyretic agent. It works by inhibiting the synthesis of prostaglandins in the central nervous system.

Chlorpheniramine Maleate: is a H_1 -Histamine receptors antagonist that reduces the effects of natural chemical histamine in the body. Histamine can cause some symptoms such as sneezing, itching, watery eyes, and runny nose.

Dextromethorphan Hydrobromide: is a cough suppressant that acts centrally on the cough center in the medulla.

Phenylephrine Hydrochloride: is a postsynaptic α_1 adrenergic receptor agonist, it has a decongestant effect by constricting blood vessels to reduce edema and swelling in the nose which helps breathing easier.

Pharmacokinetics:

Paracetamol: is well absorbed from the gastrointestinal tract. It reaches its highest concentration in plasma after about 30 to 60 minutes of oral administration and spreads through most tissues of the body. It is metabolized mainly in the liver and excreted in the urine in the form of sulfate and glucuronide conjugates. Less than 5% of paracetamol is excreted in an unchanged form.

Chlorpheniramine Maleate: Orally administered chlorpheniramine maleate is well absorbed, has a plasma half-life of about 2-4 hours, is metabolized mainly in the liver and excreted in the urine.

Dextromethorphan Hydrobromide: is well absorbed from the gastrointestinal tract. It undergoes rapid and extensive first-pass metabolism in the liver after oral administration. Dextrophan, which also has antitussive action, is the main metabolite. In some individuals metabolism proceeds more slowly and unchanged dextromethorphan in the blood and urine.

Phenylephrine Hydrochloride: is absorbed irregularly from the gastrointestinal tract, is metabolized in the intestine and liver, and is almost completely excreted in the urine. After oral administration, maximum plasma concentrations are seen Achieved in 1 - 2 hours. The average plasma half-life is 2 to 3 hours.

Indications:

REVAGRIP CHILD syrup is used to relieve cough, fever, headache, mild pains, runny nose, sneezing, stuffy nose, itchy nose or throat, nasal and sinus congestion and sore throat (pharyngitis) due to the common cold or the flu.

Contraindications:

REVAGRIP CHILD is contraindicated in case:

- Hypersensitivity to any components of the product.
- In children under 4 years of age.
- Patients with breathing problems such as bronchitis, persistent or chronic cough as in asthma, chronic obstructive pulmonary disease (COPD).

Warnings & Precautions:

- Avoid the use of REVAGRIP CHILD syrup in children taking monoamine oxidase inhibitors (MAOIs).
- Liver damage may occur if the child takes more than 5 doses in 24 hours, which is the maximum daily dose, caution must be exercised when combined with other medicines containing paracetamol.
- Use with caution in children who suffer from glaucoma, thyroid disease, diabetes, high blood pressure, heart disease, and liver disease.
- If the pain increases or lasts for more than 5 days, you should consult a doctor.
- Avoid using REVAGRIP CHILD syrup to make the child sleepy.

Pregnancy & Lactation:

Pregnancy: Pregnancy category C. Use only if the potential benefits outweigh the potential risks to the fetus.

Lactation: A doctor should be consulted before using it in a nursing mother.

Drug Interactions:

A doctor should be consulted if the child is taking a sedative, Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs), tranquilizers drug or warfarin.

Side Effects:

The most common side effects are drowsiness, dry mouth, dizziness, excitability, increased blood pressure, reflex arrhythmias, headache, anxiety, tremor, and gastrointestinal disturbances.

Driving & Using Machines:

REVAGRIP CHILD may cause drowsiness, dizziness, so patients should be advised to avoid driving a car or operating machinery while taking this medicine.

Dosage & Administration:

Weight (Kg)	Age (years)	Dose (ml)
Under 16	Children under 4 years old	do not use
16-21	Children 4 to under 6 years of age	do not use REVAGRIP CHILD Syrup unless directed by a doctor
22-43	Children 6 to under 12 years of age	10 ml

- If symptoms persist, the dose can be repeated every 4 hours.
- Do not give more than 5 doses in 24 hours without consulting a doctor.

Overdose:

Overdose can lead to health problems including liver damage. Patients should be referred to hospital urgently to get immediate medical attention.

Storage:

Keep out of reach of children. Store below 25° C.

Packaging:

Each REVAGRIP CHILD syrup carton box contains amber glass bottle of 100 ml.



رِفَاكَرِيبْ أَطْفَال

شَرَاب

التَركِيب:

كل ٥ مل ريفاكريب أطفال شراب تحتوي على:

باراسيتامول	١٦٠ ملغ.
كلورفينيرامين ماليات	١ ملغ.
ديكستروميثورفان هيدروبروميد	٥ ملغ.
فينيل إفرين هيدروكلوريد	٢,٥ ملغ.

الخصائص الدوائية وآلية التأثير:

يتكون ريفاكريب أطفال من مشاركة دوائية مميزة تجمع بين:
باراسيتامول: مسكن ألم فعال وخافض للحرارة يعمل عن طريق تثبيط اصطناع البروستاغلاندينات في الجهاز العصبي المركزي.
كلورفينيرامين ماليات: هو أحد حاصرات مستقبلات الهيستامين H_1 الذي يقلل من تأثيرات الهيستامين الكيميائي الطبيعي في الجسم. يمكن أن يسبب الهيستامين بعض الأعراض مثل العطاس والحكة ودماع العيون وسيلان الأنف.

ديكستروميثورفان هيدروبروميد: هو مثبط للسعال يعمل بشكل مركزي على مركز السعال في المخاخ.

فينيل إفرين هيدروكلوريد: شاد مستقبلات α_1 الأدرينالية ما بعد المشبك، يمتلك تأثير مزيل للاحتقان من خلال انقباض الأوعية الدموية لتقليل الوذمة والتورم في الأنف مما يساعد على التنفس بسهولة أكبر.

الحرائك الدوائية:

باراسيتامول: يُمتص الباراسيتامول بشكل جيد من القناة الهضمية. يصل إلى أعلى تركيز له في البلازما بعد حوالي ٣٠ - ٦٠ دقيقة من تناوله عن طريق الفم وينتشر إلى معظم أنسجة الجسم. يتم استقلابه بشكل رئيسي في الكبد ويُطرح في البول مرتبطاً بالغلوكلورونيك والكبريتات. يُطرح أقل من ٥٪ من الباراسيتامول بشكل غير متغير. كلورفينيرامين ماليات: يُمتص كلورفينيرامين ماليات بشكل جيد عند تناوله عن طريق الفم، يبلغ عمره النصف في البلازما حوالي ٢ - ٤ ساعات، يستقلب بشكل رئيسي في الكبد ويُطرح عن طريق البول. ديكستروميثورفان هيدروبروميد: يمتص ديكستروميثورفان بشكل جيد من القناة الهضمية. يخضع للاستقلاب عبر المرور الكبدية الأول بشكل سريع وواسع النطاق بعد تناوله عن طريق الفم. ديكستروميثورفان وهو المستقلب الرئيسي يمتلك أيضاً تأثير مضاد للسعال. لدى بعض الأفراد، يكون الاستقلاب أبطأ ويتواجد ديكستروميثورفان دون تغيير في الدم والبول.

فينيل إفرين هيدروكلوريد: يُمتص بشكل غير منظم من القناة الهضمية ويخضع للاستقلاب في الأمعاء والكبد، ويُطرح في البول بشكل شبه كامل. بعد تناوله عن طريق الفم، لوحظ أن التراكيز القصوى في البلازما تتحقق خلال ١ - ٢ ساعة. يبلغ متوسط العمر النصف في البلازما من ٢ إلى ٣ ساعات.

الاستطبابات:

يُستخدم شراب ريفاكريب أطفال للتخفيف من السعال، الحمى، الصداع، الآلام الخفيفة، سيلان الأنف، العطاس، انسداد الأنف، حكة في الأنف أو الحلق، احتقان الأنف والجيوب الأنفية والتهاب الحلق (التهاب البلعوم) بسبب نزلات البرد أو الأنفلونزا.

مضادات الاستطباب:

يُعتبر شراب ريفاكريب أطفال مضاد استطباب في حال:
- فرط الحساسية لأي من مكونات المستحضر.
- عند الأطفال بعمر أقل من ٤ سنوات.
- المرضى الذين يعانون من مشاكل في التنفس مثل التهاب الشعب الهوائية، السعال المستمر أو المزمن كما في الربو، الداء الانسدادي الرئوي المزمن (COPD).

التحذيرات والاحتياطات:

- تجنب استعمال شراب ريفاكريب أطفال لدى الأطفال الذين يتناولون مثبطات أحادي أوكسيد الأمين (MAOIs).
- قد تحدث أذية كبدية في حال تناول الطفل أكثر من ٥ جرعات خلال ٢٤ ساعة، وهي الحد الأقصى للجرعة اليومية، كما يجب توخي الحذر عند المشاركة مع أدوية أخرى تحتوي على الباراسيتامول.
- يستخدم بحذر لدى الأطفال الذين يعانون من الزرق مغلق الزاوية، أمراض الغدة الدرقية، السكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب والكبد.
- في حال زاد الألم أو استمر لأكثر من ٥ أيام يجب استشارة الطبيب.
- تجنب استخدام شراب ريفاكريب أطفال لجعل الطفل يشعر بالنعاس.

الحمل والإرضاع:

الحمل: التصنيف الحلمي C. لا يستخدم إلا في حال كانت الفوائد المرجوة تفوق المخاطر المحتملة على الجنين.

الإرضاع: يجب استشارة الطبيب قبل استخدامه لدى الأم المرضع.

التداخلات الدوائية:

يجب استشارة الطبيب في حال كان الطفل يتناول أدوية مهدئة، مثبطات مونو أمينو أوكسيداز، أدوية نمومة أو الوارفارين.

التأثيرات الجانبية:

التأثيرات الجانبية الأكثر شيوعاً هي النعاس، جفاف الفم، دوخة، استئارة، ارتفاع ضغط الدم، عدم انتظام ضربات القلب الانعكاسي، صداع، قلق، رعاش واضطرابات الجهاز الهضمي.

القيادة واستخدام الآلات:

قد يتسبب ريفاكريب أطفال بحدوث النعاس، الدوخة، لذلك يجب نصح المرضى بتجنب قيادة السيارة أو تشغيل الآلات خلال تناول هذا الدواء.

الجرعة والاستعمال:

الوزن (كغ)	العمر (بالسنوات)	الجرعة (مل)
أقل من ١٦	الأطفال بعمر أقل من ٤ سنوات	لا يستخدم
١٦ - ٢١	الأطفال بعمر ٤ إلى أقل من ٦ سنوات	لا يستخدم شراب ريفاكريب أطفال دون استشارة الطبيب
٢٢ - ٤٣	الأطفال بعمر ٦ إلى أقل من ١٢ سنة	١٠ مل

- في حال استمرار الأعراض، يمكن تكرار الجرعة كل ٤ ساعات.
- لا تُعطي أكثر من ٥ جرعات خلال ٢٤ ساعة دون استشارة الطبيب.

فرط الجرعة:

يمكن أن يؤدي تناول الجرعة الزائدة إلى حدوث مشاكل صحية بما في ذلك تلف الكبد. يجب إحالة المرضى إلى المشفى بشكل عاجل للحصول على رعاية طبية فورية.

شروط الحفظ:

يحفظ بعيداً عن متناول أيدي الأطفال. يحفظ في درجة حرارة أقل من ٢٥ درجة مئوية.

التعبئة:

كل عبوة كرتونية ريفاكريب أطفال شراب تحتوي على عبوة زجاجية عاتمة سعة ١٠٠ مل.