

REVAGRIP COMPLETE Capsules



Composition:

Each REVAGRIP COMPLETE Capsule contains:

Paracetamol 500 mg.

Guaifenesin 100 mg.

Phenylephrine hydrochloride 6.1mg.

Pharmacological Properties & Mechanism of Action:

REVAGRIP COMPLETE consists of a special combination of drugs that combine:

Paracetamol: An effective analgesic and antipyretic, it works by inhibiting the synthesis of prostaglandins in the central nervous system.

Guaifenesin: An expectorant that increases sputum volume and reduces its viscosity.

Phenylephrine hydrochloride: A postsynaptic alpha receptor agonist, it has a decongestant effect by constricting blood vessels to reduce edema and swelling in the nose which helps breathing easier.

Pharmacokinetics:

Paracetamol: Paracetamol is rapidly and almost completely absorbed from the gastrointestinal tract, reaching peak plasma concentrations approximately 20 minutes after oral administration, rapidly distributing widely in most tissues of the body, metabolized mainly through the first hepatic pass and excreted in the urine in the form of glucuronic and sulfate-related compounds.

Guaifenesin: Guaifenesin is absorbed from the gastrointestinal tract and excreted in the urine after undergoing metabolism.

Phenylephrine hydrochloride: Phenylephrine hydrochloride is irregularly absorbed from the gastrointestinal tract, undergoes first-pass metabolism in both the gut and liver, reducing its bio-availability when given orally, and is almost completely excreted in the urine.

Indications:

REVAGRIP COMPLETE Capsule is used to relieve symptoms associated with the common colds and influenza, including relief from congestion and pain from sinusitis, sore throat and headache. REVAGRIP COMPLETE also helps lower fever, reduce mucus viscosity and soothe chesty coughs.

Contraindications:

REVAGRIP COMPLETE Capsules are contraindicated in the following cases:

- Hypersensitivity to the active material or to any of the components of the product.

- Concomitant use with other sympathomimetic decongestants.
- People with closed angle glaucoma.
- People with severe coronary heart diseases, cardiovascular disorders, high blood pressure.
- People with hyperthyroidism.
- People with severe hepatic or renal insufficiency
- Patients are taking tricyclic antidepressants or beta-blockers, and patients taking, or have taken within the last two weeks, monoamine oxidase inhibitors (MAOIs).

Warnings & Precautions:

- Avoid concomitant use with other paracetamol-containing products to avoid paracetamol overdose.

- A doctor should be consulted before using REVAGRIP COMPLETE Capsules in patients with: Chronic cough or asthma, obstructive vascular diseases (such as Raynaud's phenomenon), diabetes mellitus, phenylketonuria, severe gastrointestinal disturbances.

- Avoid concomitant use with cough suppressants.

- People with an enlarged prostate should consult a doctor before using this medicine.

Pregnancy & Lactation:

Pregnancy: The safety of this medicine during pregnancy has not been established, so REVAGRIP COMPLETE Capsules should not be used during pregnancy without consulting a doctor.

Lactation: REVAGRIP COMPLETE Capsules should not be taken while breast-feeding without consulting your doctor.

Drug Interactions:

Paracetamol: The anticoagulant effect of warfarin and other coumarin derivatives may be enhanced by regular and prolonged use of paracetamol with an increased risk of bleeding. The hepatotoxicity of paracetamol may be increased when it is taken with alcohol. The rate of absorption of paracetamol may be increased when co administered with metoclopramide or domperidone, while the rate of absorption is decreased when co administered with colestyramine.

Caution is advised if paracetamol is administered concomitantly with flucloxacillin due to increased risk of high anion gap metabolic acidosis, especially in patients with risks factors.

Phenylephrine: Concomitant use with monoamine oxidase inhibitors, other sympathomimetic amines, beta-blockers, other antihypertensive drugs, tricyclic antidepressants, ergot alkaloids, digoxin and cardiac glycosides may lead to hypertension and increased risk of cardiovascular and irregular heartbeat.

Guaifenesin: No interactions with other drugs have been observed.

Side Effects:

- Allergic reactions such as a skin rash, sometimes itching, with swelling of the mouth or face.
- Recurring fever or infection.
- Nausea, weight loss, loss of appetite.
- Arrhythmia.
- Hypertension.
- Difficulty urinating.
- Stomach upsets.
- Insomnia
- Nervousness, tremors.

Driving & Using Machines:

REVAGRIP COMPLETE Capsules may cause dizziness, you should avoid driving a car or operating machines while taking this medicine.

Dosage & Administration:

- Adults, the elderly and children 16 years of age and over: 2 capsules every 4-6 hours as needed.

- Do not take more than 8 capsules (4 doses) in 24 hours.

- Do not give to children under 16 years of age without consulting a doctor.

- You should consult a doctor or pharmacist if symptoms persist for more than 3 days.

- The capsules should be swallowed whole with water.

Overdose:

Symptoms: Symptoms of paracetamol overdose in the first 24 hours are pallor, nausea, vomiting, anorexia, abdominal pain and liver damage. Effects of phenylephrine overdose include hypertension, cardiac arrhythmias, urinary retention, mydriasis, allergic reactions, closed-angle glaucoma and respiratory depression. Taking large doses of guaifenesin may cause nausea and vomiting.

Treatment: Patient should be referred to hospital urgently for immediate medical attention. Activated charcoal should be used if the overdose is taken within one hour. Treatment with N-acetylcysteine can be used within 24 hours of taking paracetamol.

Storage:

Keep out of reach of children. Store below 25 °C.

Packing:

Each REVAGRIP COMPLETE Capsules carton box contains 20 Capsules in two blister strips.

-A medication is a product which affects your health, and it's consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctors prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medication.
-The doctor and the pharmacist experts in medicine, it's benefits and risks.
-Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
KEEP THE MEDICINE'S OUT OF REACH OF CHILDREN
Council of Arab Health Ministers- Union of Arab Pharmacies

Reva Pharmaceutical Industry - Syria



ريفاكريب كومبلت كيسول

التركيب:

كل كيسولة ريفاكريب كومبلت تحتوي على:

باراسيتامول ٥٠٠ ملغ.

غوايفينيزين ١٠٠ ملغ.

فينيل إفرين هيدروكلوريد ٦,١ ملغ.

الخصائص الدوائية وآلية التأثير:

يتكون ريفاكريب كومبلت من مشاركة دوائية مميزة تجمع بين: باراسيتامول: مسكن الألم وفعال وخافض للحرارة، يعمل عن طريق تثبيط اصطناع البروستاغلاندينات في الجهاز العصبي المركزي. غوايفينيزين: مقلع يعمل على زيادة حجم البلغم وتقليل لزوجة. فينيل إفرين هيدروكلوريد: شاد مستقبلات ألفا ما بعد المشبك، يمتلك تأثيراً مزيلاً للاحتقان من خلال انقباض الأوعية الدموية لتقليل الوذمة والتورم في الأنف مما يساعد على التنفس بسهولة أكبر.

الحرائك الدوائية:

باراسيتامول: يُمتص الباراسيتامول بسرعة وبشكل شبه كامل من القناة الهضمية، يصل إلى ذروة التراكيز البلازمية بعد حوالي ٢٠ دقيقة من تناوله عن طريق الفم، يتوزع بسرعة على نطاق واسع في معظم أنسجة الجسم، يتم استقلابه بشكل رئيسي خلال المرور الكبدي الأول ويخرج في البول على شكل مركبات مرتبطة بالغلوكورونيك والكبريتات.

غوايفينيزين: يُمتص غوايفينيزين من الجهاز الهضمي ويُطرح في البول بعد خضوعه للاستقلاب.

فينيل إفرين هيدروكلوريد: يُمتص فينيل إفرين هيدروكلوريد بشكل غير منظم من القناة الهضمية، يخضع للاستقلاب خلال المرور الأول في كل من الأمعاء والكبد، مما يقلل من توافره الحيوي عند إعطائه فمويًا، ويُطرح في البول بشكل شبه كامل تقريباً.

الاستطبابات:

يُستخدم ريفاكريب كومبلت كيسول للتخفيف من الأعراض المصاحبة لنزلات البرد والإنفلونزا، بما في ذلك التخفيف من الاحتقان والألم الناتج عن التهاب الجيوب الأنفية، التهاب الحلق والصداع. كما يساعد ريفاكريب كومبلت أيضاً على خفض درجة الحرارة، تقليل لزوجة المخاط، تهدئة السعال الصدري.

مضادات استطباب:

يعتبر ريفاكريب كومبلت كيسول مضاد استطباب في الحالات التالية:

- فرط الحساسية تجاه المواد الفعالة أو لأي من مكونات المستحضر.
- الاستخدام المتزامن مع مضادات الاحتقان الودية الأخرى.
- الأشخاص الذين يعانون من الزرق مغلق الزاوية.
- الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب التاجية الشديدة، اضطرابات القلب والأوعية الدموية، ارتفاع ضغط الدم.

- الأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية.

- الأشخاص الذين يعانون من قصور كبدي أو كلوي شديد.

- المرضى الذين يتناولون مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة أو حاصرات بيتا، والمرضى الذين يتناولون أو أخذوا خلال الأسبوعين الأخيرين، مثبطات مونو أمينو أوكسيداز (MAOIs).

التحذيرات والاحتياطات:

- تجنب الاستخدام المتزامن مع المنتجات الأخرى الحاوية على الباراسيتامول لتجنب الجرعة الزائدة من الباراسيتامول.

- يجب استشارة الطبيب قبل استخدام ريفاكريب كومبلت كيسول لدى المرضى الذين يعانون من: السعال المزمن أو الربو، أمراض الأوعية الدموية الانسدادية (مثل ظاهرة رينود)، داء السكري، بيلة الفينيل كيتون، اضطرابات شديدة في المعدة والأمعاء.

- تجنب الاستخدام المتزامن مع الأدوية المثبطة للسعال.

- يجب استشارة الطبيب لدى الأشخاص الذين يعانون من تضخم البروستات قبل استخدام هذا الدواء.

الحمل والإرضاع:

الحمل: لم يتم إثبات سلامة هذا الدواء خلال الحمل، لذلك لا ينبغي استعمال ريفاكريب كومبلت كيسول خلال فترة الحمل دون استشارة الطبيب.

الإرضاع: لا ينبغي أن تؤخذ ريفاكريب كومبلت كيسول أثناء الرضاعة الطبيعية دون استشارة الطبيب.

التداخلات الدوائية:

الباراسيتامول: يمكن تعزيز التأثير المضاد للتخثر للوارفارين ومشتقات الكومارين الأخرى من خلال الاستخدام المنتظم والمستمر لفترات طويلة للباراسيتامول مع زيادة خطر النزف. يمكن أن تزداد السمية الكبدية للباراسيتامول عند تناوله مع الكحول.

يمكن زيادة معدل امتصاص الباراسيتامول عند تناوله بشكل متزامن مع ميتوكلوبراميد أو دومبيريدون، بينما يقل معدل الامتصاص عند تناوله بشكل متزامن مع كوليسيرامين.

يجب توخي الحذر عند استخدام الباراسيتامول بشكل متزامن مع فلوكلوكساسيلين لأن الاستخدام المتزامن مرتبط بالحمض الاستقلابي بفجوة الأنيون، خاصة في المرضى الذين يعانون من عوامل الخطر. الفينيل إفرين: قد يؤدي الاستخدام المتزامن مع مثبطات مونو أمينو أوكسيداز، الأمينات المحاكية للودي الأخرى، حاصرات بيتا، الأدوية الأخرى الخافضة لضغط الدم، مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة، قلويدات الإراغوت، الديجوكسين والغليكوزيدات القلبية، إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة المخاطر على القلب والأوعية الدموية وعدم انتظام ضربات القلب.

الغوايفينيزين: لا يُلاحظ حدوث أي تداخلات مع أدوية أخرى.

التأثيرات الجانبية:

- ردود فعل تحسسية مثل طفح جلدي، حكة في بعض الأحيان، مع تورم في الفم أو الوجه.

- تكرار الحمى أو العدوى.

- غثيان، فقدان الوزن، فقدان الشهية.

- عدم انتظام ضربات القلب.

- ارتفاع ضغط الدم.

- صعوبة في التبول.

- اضطرابات في المعدة.

- الأرق.

- العصبية، رعاش.

القيادة واستخدام الآلات:

قد يتسبب ريفاكريب كومبلت كيسول بحدوث الدوخة، يجب تجنب قيادة السيارة أو تشغيل الآلات خلال تناول هذا الدواء.

الجرعة والاستعمال:

- البالغون، كبار السن والأطفال بعمر ١٦ سنة وما فوق: كبسولتان كل ٦-٤ ساعات حسب الحاجة.

- لا تتناول أكثر من ٨ كبسولات (٤ جرعات) خلال ٢٤ ساعة.

- لا يُعطى للأطفال بعمر أقل من ١٦ سنة دون استشارة الطبيب.

- يجب استشارة الطبيب أو الصيدلاني في حال استمرت الأعراض لأكثر من ٣ أيام.

- يجب ابتلاع الكبسولات بشكل كامل مع الماء.

فرط الجرعة:

الأعراض: الأعراض الناتجة عن تناول جرعة زائدة من الباراسيتامول خلال ٢٤ ساعة الأولى هي الشحوب، الغثيان، القيء، فقدان الشهية وآلام في البطن وتلف الكبد. تشمل التأثيرات الناتجة عن تناول جرعة زائدة من فينيل إفرين على ارتفاع ضغط الدم، عدم انتظام ضربات القلب، احتباس البول، توسع الحقة، ردود فعل تحسسية، زرق مغلق الزاوية وتثبيط تنفسي. قد يتسبب تناول الجرعات الكبيرة من الغوايفينيزين إلى حدوث الغثيان والقيء.

العلاج: يجب إحالة المريض إلى المستشفى بشكل عاجل للحصول على عناية طبية فورية. ينبغي استعمال المعالجة بالفحم الفعال في حال تم تناول الجرعة الزائدة خلال ساعة واحدة. يمكن استخدام العلاج ن-استيل سيستيتين في غضون ٢٤ ساعة من تناول الباراسيتامول.

الحفظ:

يحفظ بعيداً عن متناول أيدي الأطفال. يحفظ في درجة حرارة أقل من ٢٥ م°.

التعبئة:

كل عبوة كرتونية ريفاكريب كومبلت كيسول تحتوي على ٢٠ كبسولة ضمن شريطين بليستر.

الدواء المستحضر بوزن على صيغته وأعماله خلال التعليمات بحرص الحظر
أنه يباع بصفة طبية، وهو مادة الاستعمال الممنوع. طبقاً لتعليمات الصيدلاني
التي صيغها: ك. فلفليد، الصيدلاني ما الفير أي الدواء يباع بصفة
تأثير صرف الدواء بدون وصفة طبية
تأثير الدوائية معقول لدى الأطفال.
مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدلة العرب
إنتاج شركة ريفا للصناعات الدوائية - سوريا